

## اثر تستوسترون اگزوزن و داروی Finasteride بر بی‌دردی ناشی از مورفین در موش‌های سوری نر با استفاده از تست فرمالین

سیما نصری<sup>۱\*</sup>، نامدار یوسف‌وند<sup>۲</sup>، سیمین خانی<sup>۱</sup>

(۱) گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

(۲) گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی کرمانشاه

تاریخ دریافت: ۸۹/۱/۱۸

تاریخ پذیرش: ۸۹/۱۰/۴

### چکیده

**مقدمه:** شدت حس درد در دو جنس نر و ماده متفاوت است. این اختلاف نشان می‌دهد که هورمون‌های جنسی ممکن است بر درد اثر داشته باشند. یکی از این متغیرها تاثیر احتمالی هورمون‌های با منشأ غیر گنادی بر درد است. هدف از این تحقیق اثر تستوسترون اگزوزن و فیناستراید (داروی ضد آندروژن) بر بی‌دردی ناشی از مورفین در موش سوری نر با استفاده از تست فرمالین بود.

**مواد و روش‌ها:** در پژوهش حاضر موش‌های سوری نر به ۶ گروه تقسیم شدند: نرمال سالین، تستوسترون، حلال تستوسترون، مورفین و یا داروی ضد آندروژن فیناستراید. از همه گروه‌ها تست فرمالین گرفته شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

**یافته‌های پژوهش:** بی‌دردی ناشی از مورفین در گروهی که تستوسترون (یا حلال تستوسترون) و مورفین دریافت کرده بودند در مقایسه با گروهی که فقط مورفین دریافت کرده بودند کاهش یافت ( $P < 0.01$ )، بی‌دردی گروهی که داروی فیناستراید و مورفین را دریافت کرده بودند در مقایسه با گروهی که فقط مورفین دریافت کرده اند، افزایش یافت بود ( $P < 0.05$ ).

**بحث و نتیجه‌گیری:** به نظر می‌رسد که هم تستوسترون اگزوزن و هم تستوسترون اندوژن اثر ضد درد مورفین را کاهش می‌دهند. از طرف دیگر داروی ضد آندروژن (فیناستراید) اثر ضد درد مورفین را افزایش می‌دهد که احتمالاً این اثر به این دلیل است که اثر تستوسترون اندوژن را از بین برده و در نتیجه اثر مقابله‌ای تستوسترون با مورفین را حذف کرده و یا این که خود دارو تا حدودی اثر ضد درد داشته است.

**واژه‌های کلیدی:** بی‌دردی، فیناستراید، مورفین، تستوسترون، موش نر

\*نویسنده مسئول: گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

Email: s\_nasri 2000@yahoo.com

## مقدمه

مواد اپیوئیدی مانند مورفین قادر به القای اثر ضد‌دردی از طریق تحریک گیرنده‌های اپیوئیدی هستند (۱،۲). اما گزارشات کلینیکی مبنی بر تفاوت دو جنس در سوء استفاده از مواد مخدر وجود دارد (۳،۴). به طوری که بعضی از محققین بر این عقیده‌اند که میزان بی‌دردی ایجاد شده توسط مورفین در بعضی از مدل‌های القای درد در حیوانات نر بیشتر از ماده‌ها است (۵،۶).

گزارشات متعددی مبنی بر دخالت هورمون‌های جنسی در روند درد وجود دارد (۷). مطالعات نشان داده است که غلظت اپیوئیدهای آندوژن مانند بتا آندورفین به وسیله استروئیدهای جنسی تعدیل می‌شود (۷). چندین تحقیق در رابطه با اثر هورمون‌های استرادیول و تستوسترون بر میزان درد صورت گرفته و نتایج متناقضی ارائه گردیده است (۸،۷).

گزارش جدیدی نیز تاکید دارد که شدت حس درد و پاسخ رفتاری به درد در دو جنس نر و ماده متفاوت است. این اختلاف اشاره به این دارد که هورمون‌های جنسی ممکن است بر سیستم حس درد اثر داشته باشند (۹).

همان‌طور که با ذکر این سوابق روشن شد، در خصوص تاثیر جنسیت و هورمون‌های جنسی بر واکنش به بی‌دردی حاصل از مورفین اختلاف نظر زیادی وجود دارد. لذا برای قضاوت درست‌تر باید جزئیات بیشتری از موضوع مورد مطالعه را بررسی نمود. در این راستا مطالعه حاضر بر آن بود تا با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف ابعاد بیشتری از موضوع را روشن کند. یکی از این متغیرها که از دید بسیاری از محققان دور مانده است، تاثیر احتمالی هورمون‌های با منشأ غیر گنادی و دخالت احتمالی آن‌ها بر پدیده‌های درد و بی‌دردی و یا اعتیاد است. برای بررسی این متغیر لازم است سایر منابع آندروژن‌های آندوژن (درونزا) مهار گردند. فیناستراید یک ترکیب سنتزی ۴-آزاستروئیدی است و به طور کاملاً اختصاصی و رقابتی، آنزیم درون سلولی ۵-آلفا ردوکتاز نوع II، عامل تبدیل تستوسترون به دی‌هیدروتستوسترون (DHT)، را مهار می‌کند. فیناستراید عمل این آنزیم را مهار کرده و بنا بر این از

تبدیل تستوسترون به DHT که فرم فعال و عملکردی تستوسترون می‌باشد، جلوگیری می‌کند و به این ترتیب موجب حذف آندروژن‌های با منشأ گنادی و غیر گنادی می‌شود (۱۰،۱۱).

از آن‌جا که مهم‌ترین هورمون استروئیدی در جنس نر تستوسترون می‌باشد، هدف از این تحقیق تعیین تاثیر متفاوت تستوسترون اگزوژن و داروی فیناستراید (Finasteride) بر بی‌دردی ناشی از مورفین در موش‌های سوری نر با استفاده از تست فرمالین بود.

## مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر از نوع تجربی بوده و از ۴۲ سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI در محدوده وزنی ۲۰-۳۰ گرم تهیه شده از انیستیتو پاستور ایران استفاده شد. حیوانات در قفس‌های استاندارد و در دمای ۲۲-۲۴ درجه سانتی‌گراد و با سیکل تاریکی و روشنایی ۱۲ ساعته نگهداری شدند و به آب و غذای کافی دسترسی داشتند که به ۶ گروه به صورت زیر تقسیم بندی شدند (در هر گروه ۷ سر موش مورد استفاده قرار گرفت).

گروه ۱- گروه شم: فقط نرمال سالیین دریافت کردند.

گروه ۲- گروه کنترل: فقط مورفین دریافت کردند.

گروه ۳- گروه تجربی ۱: فقط تستوسترون دریافت کردند.

گروه ۴- گروه تجربی ۲: تستوسترون و مورفین دریافت کردند.

گروه ۵- گروه تجربی ۳: داروی ضدآندروژن و مورفین دریافت کردند.

گروه ۶- گروه تجربی ۴: داروی ضدآندروژن و حلال تستوسترون و مورفین دریافت کردند.

گروه‌های دریافت کننده تستوسترون در روز آزمایش هر گروه بسته به نوع گروه بندی در ساعت ۸ صبح، تستوسترون (روغن کنجد) را به صورت درون صفاقی دریافت کردند (۱۲). تجویز دارو در گروه‌هایی که باید داروی فیناستراید دریافت می‌کردند، (۵ mg/kg/24h) به صورت گاوژا به مدت ۵ روز انجام می‌شد. بعد از ۵ ساعت طبق روش موسوی و همکاران (۱۳) بسته به گروه بندی تزریق زیر جلدی مورفین ۶ mg/kg یا سالیین انجام می‌شد و بلافاصله موش را درون دستگاه

برای مقایسه چند گروه و از آزمون آماری t-test برای مقایسه دو گروه با هم استفاده شد.

### یافته های پژوهش

مقایسه میزان درد در طول زمان ۶۰ دقیقه ای آزمون فرمالین در دو گروه ۱ و ۳ بدون حضور مورفین در نمودار ۱ نشان داده شده است. از مقایسه این دو گروه که یکی سالین (گروه ۱) و گروه دیگر تستوسترون (گروه ۳) دریافت کرده بودند، مشخص شد که این دو گروه در بیشتر زمان انجام آزمون تفاوت معنی داری با هم دارند. همان طور که در نمودار مشخص است تستوسترون اندکی آستانه درد تحت حاد و مزمن را بالا برده است.

مقایسه نمره درد در طول زمان ۳۰-۱۰ دقیقه ای (مرحله محیطی شدن درد) در آزمون فرمالین در گروه های ۱ و ۳ نشان گر این است که تستوسترون باعث افزایش واکنش به درد می شود. به نحوی که اختلاف معنی داری بین گروه دریافت کننده تستوسترون با کنترل مشاهده می شود. ( $P < 0.05$ ) (نمودار ۲)

میزان نمره درد در طول زمان ۶۰-۱۵ دقیقه (درد مزمن) در آزمون فرمالین در گروه های ۱ و ۳ مقایسه شد. هر چند تستوسترون باعث افزایش پاسخ به درد شده است، اما این مقایسه بیانگر اختلاف معنی دار گروه دریافت کننده تستوسترون با شاهد در این فاز از درد نیست. (نمودار ۳)

از مقایسه بین دو گروهی که یک گروه مورفین و گروه دیگر تستوسترون و مورفین دریافت کرده اند (گروه ۲ و گروه ۴) مشخص شد که تستوسترون اگزوزن باعث کاهش اثر بی دردی ناشی از مورفین در مراحل آغازین درد مزمن شده یعنی باعث افزایش پاسخ به درد مزمن در حضور مورفین شده است. ( $P < 0.05$ )

از مقایسه بین دو گروهی که یک گروه مورفین و گروه دیگر داروی ضد آندروژن و مورفین دریافت کرده بودند (گروه ۲ و گروه ۵) مشخص شد که داروی ضد آندروژن فیناستراید، تا حدودی مراحل ابتدایی درد مزمن را کاهش داده یا به عبارت دیگر بی دردی ناشی از

قرار داده و تست درد را انجام می دادیم و این عدد را به عنوان زمان مربوط به بی دردی در زمان صفر ثبت می کردیم. در گروه شاهد نرمال سالین و در گروه تجربی مورفین تزریق می شد و بلافاصله حیوان در جعبه شفاف دارای کف صاف و از جنس Plexiglass مخصوص تست فرمالین قرار می گرفت (برای انطباق با محیط حیوان از یک ربع قبل از تزریق در جعبه شفاف قرار می گرفت). این جعبه با ابعاد  $30 \times 30 \times 30$  است و به منظور مشاهده بهتر پنجه پا و حرکات حیوان، آینه ای با زاویه ۴۵ درجه زیر آن و روبروی مشاهده کننده قرار گرفته بود. پس از این زمان برای بررسی رفتار درد  $0.2 \text{ ml}$  (یا ۲۰ میکرو لیتر) فرمالین  $2/5$  درصد به زیر پوست کف پای راست حیوان به صورت زیر جلدی تزریق می شد. حیوان مجدداً به داخل جعبه مخصوص تست برگردانده می شد و بلافاصله مجموعه ای از رفتارهای القا شده با فرمالین را نشان می داد که به آن ها بر اساس روش دوسون و دنیس نمره ۰-۳ داده می شد (۱۴). در نهایت نمره درد به صورت ۱۲ بلوک ۵ دقیقه ای محاسبه می گردید و میانگین نمره درد در هر بلوک ۵ دقیقه ای طبق فرمول زیر محاسبه می شد (۱۴):

$$\text{PainScore} = \frac{OT_0 + 1T_1 + 2T_2 + 3T_3}{20}$$

در این فرمول  $T_0, T_1, T_2$  و  $T_3$  تعداد ۱۵ ثانیه هایی است، که حیوان در یک دوره ۵ دقیقه ای به ترتیب رفتارهای صفر، ۱، ۲ و ۳ را نشان داد: نمره صفر = پای حیوان به طور طبیعی بر زمین بود. نمره ۱ = پای حیوان مختصری بر زمین بود. نمره ۲ = پای حیوان بر زمین نیست و از آن جدا بود. نمره ۳ = حیوان پایش را گاز می گرفت یا می لیسید.

دقایق ۰-۵ و ۶۰-۱۵ به ترتیب به عنوان مراحل درد حاد، و درد مزمن در نظر گرفته شدند (۱۵). دقایق ۳۰-۱۰ نیز به عنوان مرحله محیطی شدن درد منظور شد. جهت بررسی و آنالیز آماری داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری one-way ANOVA و آزمون متعاقب آن Tukey


درد) در آزمون فرمالین در گروه‌های مختلف در حضور مورفین مشخص شد که در این مرحله از واکنش به درد گروه دریافت‌کننده تستوسترون و مورفین (گروه ۴) با گروه دریافت‌کننده داروی فیناستراید و مورفین (گروه ۵) اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد. ( $P < 0.05$ ) (نمودار ۵)

از مقایسه نمره درد (میزان واکنش به محرک دردزا) در طول زمان ۶۰-۱۵ دقیقه (درد مزمن) در آزمون فرمالین در گروه‌های مختلف در حضور مورفین مشخص شد که در این مرحله از واکنش به درد نیز گروه دریافت‌کننده تستوسترون و مورفین (گروه ۴) با گروه دریافت‌کننده داروی فیناستراید و مورفین (گروه ۵) اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد. ( $P < 0.05$ ) (نمودار ۶)

مورفین را در مراحل ابتدایی درد مزمن افزایش داده است. ( $P < 0.05$ )

از مقایسه بین دو گروهی که یک گروه داروی ضد آندروژن و مورفین و گروه دیگر داروی ضد آندروژن، حلال تستوسترون و مورفین دریافت کرده بودند (گروه ۵ و ۶) مشخص شد که حلال تستوسترون در حضور داروی فیناستراید هم باعث کاهش اثر بی‌دردی ناشی از مورفین در درد مزمن شده یا به عبارت دیگر پاسخ به درد مزمن ناشی از فرمالین را در حضور مورفین افزایش داده که در بعضی از زمان‌های ۵ دقیقه ای آخر تفاوت معنی‌دار شده است. ( $P < 0.05$ ) (نمودار ۴)

از مقایسه نمره درد (میزان واکنش به محرک دردزا) در طول زمان ۳۰-۱۰ دقیقه (مرحله محیطی شدن




نمودار ۱. مقایسه میزان درد در طول زمان ۶۰ دقیقه ای آزمون فرمالین در گروه‌های ۱ و ۳ (علامت \* اختلاف معنی‌دار گروه دریافت‌کننده تستوسترون با گروه کنترل بدون حضور مورفین را نشان می‌دهد ( $P < 0.05$ ))

G1=دریافت‌کننده سالین، G3=دریافت‌کننده تستوسترون


دوره نوزدهم، شماره دوم، تابستان ۹۰

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام




نمودار ۲. مقایسه نمره درد (میزان واکنش به محرک دردزا) در طول زمان ۳۰-۱۰ دقیقه (مرحله محیطی شدن درد) در آزمون فرمالین در گروه‌های ۱ و ۳.

علامت \* اختلاف معنی‌دار گروه دریافت کننده تستوسترون با گروه کنترل بدون حضور مرفین را نشان می‌دهد ( $p < 0.05$ )  
 G1 = دریافت کننده سالین، G3 = دریافت کننده تستوسترون




نمودار ۳. مقایسه نمره درد (میزان واکنش به محرک دردزا) در طول زمان ۶۰-۱۵ دقیقه (مرحله درد مزمن) در آزمون فرمالین در گروه‌های ۱ و ۳.


G1 = دریافت کننده سالین، G3 = دریافت کننده تستوسترون



نمودار ۴. مقایسه میزان نمره درد در طول زمان ۶۰ دقیقه ای آزمون فرمالین در گروه های مختلف در حضور مورفین (علامت \* اختلاف معنی دار گروه دریافت کننده تستوسترون و مورفین (G4) با دیگر گروه ها را نشان می دهد (  $P < 0.05$  ) =G2 دریافت کننده مورفین، G4= دریافت کننده تستوسترون و مورفین، G5= دریافت کننده داروی فیناستراید و مورفین، G6= دریافت کننده داروی فیناستراید و حلال تستوسترون و مورفین



نمودار ۵. مقایسه نمره درد (میزان واکنش به محرک درد) در طول زمان ۳۰-۱۰ دقیقه (مرحله محیطی شدن درد) در آزمون فرمالین در گروه های مختلف در حضور مورفین (علامت \* اختلاف معنی دار گروه دریافت کننده تستوسترون و مورفین (G4) با گروه دریافت کننده داروی فیناستراید و مورفین (G5) را نشان می دهد (  $P < 0.05$  ) =G2 دریافت کننده مورفین، G4= دریافت کننده تستوسترون و مورفین، G5= دریافت کننده داروی فیناستراید و مورفین، G6= دریافت کننده داروی فیناستراید و حلال تستوسترون و مورفین



نمودار ۶. مقایسه نمره درد (میزان واکنش به محرک در دوز) در طول زمان ۶۰ - ۱۵ دقیقه (مرحله درد مزمن) درآزمون فرمالین در گروه های مختلف در حضور مورفین  
 (علامت \* اختلاف معنی دار گروه دریافت کننده تستوسترون و مورفین (G4) با گروه دریافت کننده داروی فیناستراید و مورفین (G5) را نشان می دهد (  $P < 0.05$  )  
 G2=دریافت کننده مورفین، G4=دریافت کننده تستوسترون و مورفین، G5=دریافت کننده داروی فیناستراید و مورفین، G6=دریافت کننده داروی فیناستراید و حلال تستوسترون و مورفین

### بحث و نتیجه گیری

شود. از مقایسه بین دو گروه ۲ و ۵ مشخص شد که داروی ضد آندوژن فیناستراید تا حدودی مراحل ابتدایی درد مزمن را کاهش داده یا به عبارت دیگر بی دردی ناشی از مورفین را در مراحل ابتدایی درد مزمن افزایش دهد. از آن جایی که داروی فیناستراید باعث از بین رفتن تمام تستوسترون اندوژن فعال موجود در بدن می شود (چه تستوسترونی که از بیضه ترشح شود و چه از غدد فوق کلیه ترشح می شود) پس در نتیجه آن تستوسترونی را که با مورفین واکنش می دهد را از بین برده است و تستوسترونی وجود نداشته است که اثر ضد دردی مورفین را کاهش دهد و نهایتاً دارو باعث افزایش اثر ضد دردی مورفین شده است. از مقایسه بین دو گروه ۵ و ۶ مشخص شد که حلال تستوسترون در حضور داروی فیناستراید هم باعث کاهش اثر بی دردی ناشی از مورفین در ابتدای درد مزمن شده یا به عبارت دیگر پاسخ به درد مزمن ناشی از فرمالین را در حضور مورفین افزایش داده است (اما با توجه به نمودارها این کاهش بی دردی در مقایسه با تستوسترون کمتر است که احتمالاً هم به خاطر دارو و هم به خاطر اثر کمتر حلال نسبت به خود تستوسترون است) و این بدین

از آن جا که شدت درد در دو جنس نر و ماده متفاوت می باشد، (۸). هدف از این تحقیق تعیین تاثیر متفاوت تستوسترون آگزوژن و داروی ضد آندروژن Finasteride بر بی دردی ناشی از مورفین در موش های سوری نر بود. در تحقیق حاضر برای بررسی اثرات تستوسترون و دارو بر میزان حس درد از تست فرمالین استفاده شد، زیرا در میان مدل های مختلف تست درد، تست فرمالین به عنوان یک مدل معتبر تحقیقاتی شناخته شده است. به طور کلی در این تحقیق، از مقایسه بین دو گروه ۱ و ۳ مشخص شد که تستوسترون آگزوژن تا حدی درد تحت حاد و مزمن را بالا برده است. از مقایسه بین دو گروه ۲ و ۴ مشخص شد که تستوسترون آگزوژن باعث کاهش اثر بی دردی ناشی از مورفین در مراحل آغازین درد مزمن شده است، یعنی باعث افزایش پاسخ به درد مزمن در حضور مورفین شده است که این احتمالاً نشان دهنده میان کنش تستوسترون آگزوژن بر گیرنده های مورفین در جهت کاهش اثر بی دردی مورفین می باشد و یا این که ممکن است تستوسترون یکسری متابولیت هایی را ایجاد کرده باشد که باعث کاهش اثر بی دردی مورفین

نمی کند و در مورد افزایش اثر ضد دردی مورفین توسط فیناستراید تایید کننده نتیجه آزمایش انجام شده به وسیله وردی می باشد. (۱۶)

در بعضی از تحقیقات قبلی نشان داده شده است که استروئیدهای جنسی از طریق مکانیسم های اپیوئیدی باعث کاهش درد می شوند، زیرا با به کارگیری آنتاگونیست های گیرنده های اپیوئیدی (نالوکسان) اثر ضد دردی استروئیدهای جنسی را بر می گرداند، (۲۱). که با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد. از طرفی نتایج مطالعات دیگر نشان داده است که تستوسترون باعث افزایش حساسیت گیرنده های درد و در نتیجه افزایش درد حاد می شود. (۹)

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر، خود تستوسترون اثر دردی دارد، و استعمال تستوسترون همراه با مورفین باعث می شود که تستوسترون به طور قوی تری اثر ضد دردی مورفین را کاهش دهد و یا این که پاسخ به درد را به طور معناداری افزایش دهد، از طرف دیگر داروی ضد آندروژن (فیناستراید) اثر ضد دردی مورفین را افزایش می دهد.

مکانیسم تغییرات وابسته به هورمونی درگیر در درد و بی دردی ناشی از مورفین کاملاً شناخته شده نیست. مطالعاتی وجود دارند که پیشنهاد می کنند که جایگاه های احتمالی در سیستم عصبی مرکزی به ویژه در مسیر پایین رو مهار کننده درد، جایی که استروئیدهای گنادی میزان درد پایه را به خوبی میزان بی دردی ناشی از اپیوئیدها تنظیم می کنند، وجود دارد. (۲۳، ۲۴)

نواحی از مغز مانند PAG که در مهار پایین رو درد و بی دردی ناشی از مورفین درگیرند، شامل رسپتورهای آندروژن (۲۳) و رسپتورهای استروژن (آلفا) می باشد، (۲۳، ۲۴). علاوه بر آن در بخش کمری-خاجی طناب نخاعی، رسپتورهای استروژن مشخص شده اند، (۲۴). و در واقع همه نورون های حرکتی دارای رسپتورهای آندروژن هستند، (۲۵، ۲۶). نواحی از PAG و طناب نخاعی که رسپتورهای هورمون های استروئیدی گنادی را بیان می کنند به طور نزدیک با نواحی شناخته شده شامل رسپتورهای اپیوئیدی هم پوشانی

معنی است که حلال تستوسترون تا حدودی باعث ایجاد درد شده است و احتمالاً بر گیرنده های مورفین تاثیر منفی گذاشته است و باعث تضعیف اثر بی دردی مورفین شده است و یا این که این ماده تا حدودی دردزا بوده و این اثر دردزایی با اثر فرمالین جمع شده و ظهور بهتری یافته است. به طور کلی در این تحقیق نتایج آزمایشات نشان می داد که هم تستوسترون اگزوژن و هم تستوسترون اندوژن و به میزان کمتری حلال آن یعنی روغن کنجد اثر ضد دردی مورفین را کاهش می دهد، یعنی پاسخ به درد را افزایش می دهند که نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های قبلی، (۱۹). مطابقت داشت. نتیجه دیگر این آزمایشات نشان می داد که داروی ضد آندروژن (فیناستراید) اثر ضد دردی مورفین را افزایش می دهد که با توجه به نمودارها، این اثر به این خاطر است که داروی ضد آندروژن فیناستراید، تستوسترون اندوژن را نابود کرده است و در نتیجه اثر مساعد کننده پاسخ به درد تستوسترون اندوژن و یا اثر مقابله ای که با مورفین داشته را از بین برده است و یا این که ممکن است خود دارو تا حدودی اثر ضد دردی داشته باشد. اما یک یافته اخیر نشان می دهد که برداشتن بیضه ها در موش های نر هم اثر ضد دردی مورفین را افزایش می دهد، (۱۷). و این موضوع احتمال دخالت داشتن تستوسترون در کاهش بی دردی ناشی از مورفین و یا اثر مساعد کننده آن در پاسخ به درد را تقویت می کند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که همراهی مهار کننده آنزیم 5α ردوکتاز (فیناستراید) با مورفین می تواند اثر ضد دردی مورفین را تقویت کند، در حالی که فیناستراید به تنهایی (در غیاب مورفین) تاثیری بر بی دردی ندارد، (۱۶). هر چند یک گزارش دیگر موید آن است که داروی فیناستراید به صورت خفیف و غیر معنی داری دارای اثر ضد دردی در موش صحرایی است. (۱۸)

این نتایج در مورد تاثیر تستوسترون بر افزایش درد و کاهش بی دردی تایید کننده نتایج آزمایشات انجام شده به وسیله جامعی (۹) سقایی (۱۹)، بورزان جی (۲۰) می باشد لازم به ذکر است که در پژوهش جامعی درد حاد مورد بررسی قرار گرفته است، در حالی که نتایج حاصل از تحقیقات الوئیسی (۲۱)، جوان (۲۲) را پشتیبانی



همراه با مورفین به کار برده می شود (به علت این که توسط مهار آنزیم ۵-آلفاردوکتاز از تبدیل تستوسترون به فرم فعال آن یعنی دی هیدروتستوسترون جلوگیری می کند) سطح تستوسترون CNS افزایش می یابد و سطح دی هیدروتستوسترون (فرم فعال تستوسترون) کاهش می یابد، (۲۹). و با توجه به نتیجه قبلی اثر تستوسترون (اندوژن) در کاهش اثر ضد دردی مورفین برداشته می شود و بدین وسیله داروی فیناستراید باعث افزایش اثر ضد دردی مورفین می شود. و یا این که این دارو با کاهش میزان اندروژن فعال این اثر را اعمال می کند.

دارند، (۲۴،۲۱). و احتمالاً در نتیجه این هم پوشانی، استعمال تستوسترون همراه با مورفین، باعث افزایش حساسیت گیرنده های درد و در نتیجه کاهش بی دردی ناشی از مورفین می شود.

در مورد تاثیر داروی فیناستراید بر بی دردی، اگر چه نشان داده شده که مورفین فعالیت آنزیم ۵-آلفاردوکتاز را در سیستم عصبی مرکزی (CNS) افزایش می دهد، (۲۷). اما ارتباط بین آنزیم ۵-آلفاردوکتاز و اثرات مورفین از جمله بی دردی و وابستگی هنوز کاملاً مشخص نیست. پیشنهاد شده که احتمالاً یک جایگاه مشترک بین آنزیم ۵-آلفاردوکتاز و مورفین وجود دارد، (۲۸). و به همین دلیل وقتی داروی فیناستراید

## References

- 1-Mogilt JS, Sternberg WF, Kest B, Morek P, Liebeskind JC. Sex differences in the antagonism of swim stress-induced analgesia: effects of gonadectomy and estrogen replacement. *Pain* 1993;53:17-25.
- 2-Stock HS, Caldarone B, Abrahamsen G, Mongeluzi D, Wilson MA, Rosellini RA. Sex difference I relation to conditional fear-induced enhancement of morphine analgesia. *Physiol Behav* 2001;72(3):439-47.
- 3-Craft RM, Stratman SA, Bortok RE. Sex difference in development of morphine tolerance and dependence in the rat. *Psychopharmacology* 1999;143:1-7.
- 4-Kest B, Sarton E, Dahan A. Gender differences in opioid-mediated analgesia: animal and human studies. *Anesthesiology* 2000;93:539-47.
- 5-Cicero TJ, Nock B, O'Connor L, Meyer ER. Role of steroids in sex differences in morphine-induced analgesia Activational and organizational effects. *J Pharmacol Exp Ther* 2002;300:695-701.
- 6-Kandel ER. Disorders of thought and evolution: schizophrenia. In: Kandel ER, Schwarts JH, Jessell TM, (Eds). *Int Edition; Principle of neural science*. 4<sup>th</sup> ed. Mc Graw- Hill, New York, 2000;1200-03.
- 7-Aloisi AM, Ceccarelli I, Fiorezani P, Massafra C. Testosterone affects formalin-

induced rponses differently in male and female rats. *Neurosci Lett* 2004;361(1-3): 262-4.

8-Ali B.H, Sharif Sh, Elkad A. Sex differences and the effect of gonadectomy on morphine-induced antiniception and dependence in rats and mice. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 1995;22:342-4.

9-Jamei A, Zarifkar A, Shariati M. [Different effects of testosterone on acute and chronic pain in gonadectomize male rats]. *Article 233, Eighteenth Physiology And Pharmacology Congress, Iran, 2007.* (Persian)

10-Aggarwal S, Thareja S, Verma A, Bhardwaj TR, Kumar M. An overview on 5alpha-reductase inhibitors. *Steroids* 2010 Feb;75(2):109-53.

11-Ovrrerstreet JW, Fuh VL, Lieber MM, Hellstrom J. Chronic treatment with finasteride daily dose not affect spermatogenesis or semen production in yong men. *J Urol* 1999;162(4):1295-300.

12-Prasad S, Kalra N, Shukla Y. Modulatory effects of diallyl sulfide against testosterone-induced oxidative stress in swiss albino mice. *Asian J Androl* 2006; 8(6):719-23.

13-Mosavi SZ, Shafaghi B, Kobarfard F, Jorjani M. [Sex differences and role of ganadal hormones in development of

- tolerance to morphine analgesia and glutamate level in the nucleus accumbens of rats: a microdialysis study]. *Physiology and Pharmacology*, Spring 2006;10:3-10. (Persian)
- 14-Dubuisson D, Dennis SG. The formalin test: a quantitative study of the analgesic effects of morphine, meperidine and brain stem stimulation in rat and cats. *Pain* 1977; 4:161-74.
- 15-Tjolsen A, Berge OG, Hunskaar S, Rosland JH, Hole K. The formalin test: an evaluation of the method. *Pain* 1992;51:5-17.
- 16-Verdi J, Ahmadiani A. Finasteride, a  $5\alpha$ -reductase inhibitor, potentiates antinociceptive effects of morphine, prevents the development of morphine tolerance and attenuates abstinence behavior in the rat. *Dept of Pharmacology* 2007;51(5):605-10.
- 17-Yousofvand N, Khani S, Nasri S. [Gonadectomy conditions on nociception and effect of these factors on morphine-induced analgesia in male mice, using the formalin test]. *Armaghane- Danesh* 2010;59(15):212-21. (Persian)
- 18-Duborua-Kovacevic N, Jakovljevic V, Sabo A, Tomic Z. Anti-nociceptive and anti-inflammatory properties of  $5\alpha$ -reductase inhibitor finasteride in experimental animals. *European J of Drug Metabolism And pharmacokinetics* 2008; 33(3):181-6.
- 19-Saghaei F, Yousofvand N. [The effect of exogene testosterone on the morphine analgesia in males gonadectomized mice]. MSc Thesis. Razi University 2007. (Persian)
- 20-Borzan J, Fuchs PN. Organizational and activational effects of testosterone on carrageenan induced inflammatory pain and morphine analgesia. *Neuroscience* 2006; 143(3):885-95.
- 21-Aloisi AM, Ceccarelli I. Role of gonadal hormones in formalin-induced pain responses of male rats; modulation by estradiol and naloxone administration. *Neuroscience* 2000;95(2):559-66.
- 22-Javan M, Ahmadiani A, Motamadi F, Kazemi B. Changes in G proteins genes expression in rat lumbar spinal cord support the inhibitory effect of chronic pain on the development of tolerance to morphine analgesia. *Neurosci Res* 2005;53:250-6.
- 23-Nestler EJ. Molecular mechanisms of opiate and cocaine addiction. *Curr Opin Neurobiol* 1997;7:713-19.
- 24-Vander Horst VGJM, Meijer E, Schasfoort FC, Leeuwen FWV, Holstege G. Estrogen receptor - immunoreactive neurons in the lumbosacral Cord projection to the periaqueductal gray in the ovariectomized female cat. *Neurosci Lett* 1997;236:25-8.
- 25-McEwen BS. Genome and hormones: gender differences in physiology. Invited review: estrogens effects on the brain: multiple sites and molecular mechanisms. *J Appl Physiol* 2001;91:278-80.
- 26-Meunier JC. Opioid receptors, tolerance and dependence. *Therapie* 1992;46:402-5.
- 27-Amini, Ahmadiani. In vivo evidence for an increase in  $5\alpha$ -reductase activity in the rat central nervous system following morphine exposure. *Neurosci* 2005;975:1-6.
- 28-Hau OA, Dominguez, Evrard HC. Testosterone reduces responsiveness to nociceptive stimuli in a wild bird. *Horm Behave* 2004;46:165-70.
- 29-Uygur Arik AL, Altug U, Erol D. Effects of  $5\alpha$ -reductase inhibitor finasteride on serum levels of gonadal, adrenal, and hypophyseal hormones study. *Steroids* 1998;63:208-13.



## Effectiveness of Exogen Testosterone And Finasterid on Morphine Analgesia in Male Mices Using Formalin Test

Nasri S<sup>1\*</sup>, Yousofyvand N<sup>2</sup>, Khani S<sup>1</sup>

(Received: 7 Apr. 2010)

Accepted: 25 Dec. 2010)

### Abstract

**Introduction:** Intensity of pain in both the male and female sexes is different. This difference suggests that sexual hormones may affect on pain system. One such variant is the possible effect of nongonadal hormones on the pain. The aim of the current study was to evaluate the effect iveness of exogenous testosterone and finasteride, antiandrogen drug, on morphine analgesia in male mice using formalin test.

**Materials & Methods:** In this study, male mice were divided into 6 groups (N=7); saline, testosterone, sesame seed oil, morphine or antiandrogen drug finasteride. Formalin test was performed in all the mice and data were analyzed by one-way ANOVA.

**Findings:** Reduced analgesia due to using morphine in the group which received testosterone (or sesame seed oil) and morphine was found out to be less compared to that of the group that received

morphine, ( $P < 0.05$ ,  $P < 0.01$ ). Analgesia in the group which received finasteride and morphine showed an increase compared to the group that only received morphine, ( $P < 0.05$ ).

**Discussion & Conclusion:** It can be concluded that either exogenous testosterone and endogen testosterone can reduced analgesia due to morphine. On the other hand, antiandrogen drug (finasteride) increases analgesia of morphine that may be due to elimination of endogen testosterone that results in elimination of adverse effects of testosterone with morphine or may be some sort of anti-analgesia effects of finasteride.

**Keywords:** analgesia, finasteride, morphine, testosterone, male mice

1. Dept of Biology, Faculty of Basic Sciences, Payam-e-Noor University of Tehran, Tehran, Iran

2. Dept of Biology, Faculty of Basic Sciences, Kermanshah University, Kermanshah, Iran

\*(corresponding author)