

Role of Intermediate Hosts' Lymph Nodes in the Continuity of Life Cycle and Prevalence of the *Linguatula Serrata* Parasite

Ali Reza Alborzi^{1*} , Somayeh Bahrami¹, Alimard Hassanbegi¹

¹ Dept of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Article Info

Article type:

Research article

Article History:

Received: 12 April 2021

Revised: 14 April 2021

Accepted: 29 November 2021

* Correspondence to:

Ali Reza Alborzi
Dept of Parasitology, Faculty of
Veterinary Medicine, Shahid
Chamran University of Ahvaz,
Ahvaz, Iran
Email: a.alborzi@scu.ac.ir

ABSTRACT

Introduction: *Linguatula Serrata* is a zoonotic parasite. Several cases of human infection have been reported from Iran and other countries. Sheep and Canids, as the intermediate and definitive hosts, respectively, play an important role in the persistence of infection in humans. The present study aimed to evaluate the lymph node infection in the sheep with respect to host factors (age and gender), lymph nodes (color and consistency), and their role in the infection of various hosts.

Material & Methods: This cross-sectional study included the randomly selected samples of mesenteric lymph nodes from slaughtered sheep (n=619) of different areas of Ilam province, Iran, from April to November 2015. The positive samples were determined by collecting *Linguatula Serrata* nymphs. Following that, the obtained data were analyzed using statistical tests.

Findings: Out of 619 sheep samples, 99 (16%) samples were infected with *Linguatula Serrata* nymphs. The highest prevalence rates were observed in the southern areas, including Abadan, Darreh Shahr, and Dehloran (19%). On the other hand, the lowest prevalence rates were in the eastern regions, including Shirvan, Sirvan, and Chardavol (11.7%). The infection prevalence rate in females was 25.6% (n=52 of 203) that was more than that in males (11.3%; n=47 of 416). There was a significant relationship among gender, age, and the prevalence rate of the infection (P<0.05). The highest and lowest infection rates were observed in the age groups of ≥3 (23.4%) and <1 (11.3%), respectively. Furthermore, the maximum infection rates were noted in the dark and soft lymph nodes, (54.3% and 38.7%, respectively), compared to normal ones (11.5%, and 10.4%, respectively). The color and consistency of the lymph nodes showed a significant relationship with the infection rate (P<0.05).


Discussion & Conclusion: Considering the high levels of infection in sheep, which is a reflection of dogs' infection in the area and the potential risk to humans, health education and observance of the principles of prevention, especially avoiding the use of infected lymph nodes to feed dogs, are essential to reduce the parasite infection in the hosts.

Keywords: Ilam, *Linguatula Serrata*, Lymph node, Sheep, Zoonosis

➤ How to cite this paper

Alborzi AR, Bahrami S, Hassanbegi A. Role of Intermediate Hosts' Lymph Nodes in the Continuity of Life Cycle and Prevalence of the *Linguatula Serrata* Parasite. *Journal of Ilam University of Medical Sciences*. 2022;30(1): 11-18.

نقش گره‌های لنفاوی میزبان واسط در تداوم چرخه زندگی و شیوع انگل لینگواتولا سراتا

علیرضا البرزی^{۱*} , سمیه بهرامی^۱، علیمرد حسن بگی^۱^۱ بخش انگل‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات مقاله

چکیده

نوع مقاله: پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

تاریخ داوری: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

نویسنده مسئول:

علیرضا البرزی

بخش انگل‌شناسی، دانشکده

دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران

اهواز، اهواز، ایران

Email: a.alborzi@scu.ac.ir

مقدمه: لینگواتولا سراتا یکی از انگل‌های مشترک میان انسان و حیوان (زئونوز) است. موارد متعددی از ابتلای انسان به آن از ایران و سایر کشورها گزارش شده است. گوسفندان و سگ‌سانان به ترتیب به عنوان میزبان واسط و اصلی، نقش مهمی در بقا و ابتلای انسان به انگل دارند. هدف این مطالعه ارزیابی آلودگی گره‌های لنفاوی در گوسفندان با توجه به عوامل میزبانی (سن و جنس)، ویژگی‌های گره‌های لنفاوی (رنگ و قوام) و نقش آن در ابتلای میزبان‌های متنوع آن است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی، طی فروردین تا آبان‌ماه ۱۳۹۴، از گره‌های لنفاوی مزاتر تعداد ۶۱۹ گوسفند کشتار شده در مراکز کشتارگاهی پنج منطقه مختلف استان ایلام، به صورت تصادفی نمونه‌گیری شد. نمونه‌های مثبت با جمع‌آوری نوچه‌های لینگواتولا سراتا تعیین گردید و با توجه عوامل، داده‌ها تجزیه و تحلیل آماری شد.

یافته‌ها: از مجموع ۶۱۹ نمونه، ۹۹ مورد (۱۶ درصد) به نوچه لینگواتولا سراتا آلوده بودند. بیشترین شیوع در گوسفندان منطقه جنوبی شامل آبدانان، دره شهر و دهلران (۱۹/۰ درصد)، کمترین آن در منطقه شرقی (۱۱/۷ درصد) شامل شیروان، شیروان و چرداول بود. شیوع آلودگی در ۲۰۳ رأس ماده با ۵۲ مورد آلوده (۲۵/۶ درصد)، بیشتر از ۴۱۶ رأس نر با ۴۷ آلوده (۱۱/۳ درصد) بود. میان جنسیت، سن و شیوع آلودگی رابطه معناداری دیده شد ($P < 0.05$). بیشترین درصد آلودگی مربوط به سن ≥ 3 سال به میزان ۲۳/۴ درصد و کمترین آن مربوط به سن < 1 سال (۱۱/۳ درصد) بود. بیشترین آلودگی در گره‌های لنفاوی تیره و نرم به ترتیب با ۵۴/۳ درصد و ۳۸/۷ درصد، در مقایسه با گره‌های لنفاوی طبیعی با ۱۱/۵ درصد و ۱۰/۴ درصد دیده شد. رابطه رنگ و قوام گره‌های لنفاوی با میزان ابتلا معنادار بود ($P < 0.05$).

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به آلودگی بالای گوسفندان که بازتابی از آلودگی سگ‌های منطقه و خطر بالقوه برای انسان است، رعایت اصول پیشگیری و آموزش بهداشت، به ویژه استفاده نکردن از گره‌های لنفاوی آلوده برای تغذیه سگ‌ها، در کاهش آلودگی در میزبان‌ها ضروری است.

واژه‌های کلیدی: ایلام، زئونوز، گره‌های لنفاوی، گوسفند، لینگواتولا سراتا

✎ **استناد:** البرزی، علیرضا؛ بهرامی، سمیه؛ حسن بگی، علیمرد. نقش گره‌های لنفاوی میزبان واسط در تداوم چرخه زندگی و شیوع انگل لینگواتولا سراتا.

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اردیبهشت ۱۴۰۱؛ ۱۱(۱): ۱۱-۱۸.

ویژگی های گره های لنگوتولوز (رنگ و قوام) و نقش آن ها در ابتلای میزبان های متنوع انگل هدف گذاری شد.

مواد و روش ها

روش نمونه گیری: در این مطالعه، با تعیین تعداد نمونه با سطح اطمینان ۹۵ درصد و حاشیه خطای ۴ درصد و تعدیل جمعیتی مدنظر از گره های لنگوتولوز، تعداد ۶۱۹ رأس از گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه های مناطق مختلف استان ایلام، از ۵ منطقه جغرافیایی (شهرستان) شامل ۹۴ نمونه از شمال (ایوان)، ۱۳۱ نمونه از جنوب (آبدانان، دره شهر و دهلران)، ۹۴ نمونه از شرق (شیروان، چرداول و سیروان)، ۷۱ نمونه از غرب (مهران، ملکشاهی) و ۲۲۹ نمونه از مرکز (ایلام) و با ثبت سن تقریبی و جنس حیوانات به صورت تصادفی ساده نمونه گیری شد (شکل شماره ۱). همه نمونه های گرفته شده در چهار گروه سنی کمتر یک سال، یک تا کمتر از دو سال، دو تا کمتر از سه سال و سه سال به بالا دسته بندی گردیدند.

نمونه های گره های لنگوتولوز مزاتر به میزان تقریبی ۴۰ گرم از گوسفندان کشتار شده جمع آوری (۱۰) و با قرار دادن در ظروف مشخص به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه پس از جداسازی چربی ها از گره های لنگوتولوز، ضمن مشخص کردن وضعیت گره ها و ثبت

لنگوتولوز سراتا عامل لنگوتولوز، یکی از بیماری های انگلی مشترک میان انسان و حیوانات است. مراحل نوجه ای و تخم این انگل می تواند در انسان بیماری ایجاد کند (۱). میزبان نهایی این انگل سگ، گربه و سایر گوشت خواران و میزبان های واسط آن نشخوارکنندگان و برخی از پستانداران دیگر هستند (۲). انگل بالغ در مجاری تنفسی سگ ها زندگی می کند. تخم های انگل در اثر عطسه وارد محیط می شود و همراه مواد غذایی توسط میزبانان واسط بلعیده می گردد؛ سپس لاروها و نوجه ها در گره های لنگوتولوز مزاتریک، کبد، ریه و سایر اعضا مستقر و سبب آلودگی این اندام ها می شود (۳-۵).

در سیر تکاملی این انگل، نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز) از سایر میزبانان واسط در مبتلا کردن سگ ها (میزبان اصلی) به انگل یاد شده، نقش مهم تری دارند. روش دامداری سنتی، عشایری و کوچ رو، در صورت آلوده بودن سگ ها و به سبب ارتباط پیوسته آن ها با حیوانات دامداری های سنتی، فارم ها و گله ها می توانند به راحتی سبب آلودگی گوسفند و بز شوند. از سویی، دسترسی سگ ها به امعا و احشا و یا گره های لنگوتولوز آلوده گوسفند به نوجه انگل، به ابتلای سگ ها به انگل بالغ منجر خواهد شد. ابتلای انسان به مرحله نوجه ای (لاروی) و تخم انگل، به ترتیب سبب لنگوتولوز نازوفارینژیال و لنگوتولوز احشایی می شود. در این رابطه گزارش های متعددی از ایران و جهان وجود دارد (۶-۹). نشخوارکنندگان مبتلا به این انگل بدون نشانه های درمانگاهی هستند. ابتلای میزبان اصلی نیز معمولاً بدون نشانه است؛ اما در آلودگی شدید ممکن است نشانه هایی همچون تورم مخاط بینی، عطسه های نامرتب توأم با اشکالات تنفسی مشاهده شود (۵).

با توجه به اینکه اقدامات کنترلی و پیشگیری برای هر انگلی نیازمند آگاهی از وضعیت آلودگی به آن انگل در هر منطقه است؛ بنابراین، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی آلودگی گره های لنگوتولوز در گوسفندان مناطق مختلف جغرافیایی استان ایلام با در نظر گرفتن عوامل میزبانی (سن و جنس)،



شکل شماره ۱. نقشه استان ایلام، شهرستان های محل نمونه گیری با علامت * مشخص شده اند.

آن از نظر رنگ (طبیعی، قرمز و تیره) یا از نظر قوام (طبیعی، نرم و یا سفت)، داخل پلیت مناسب قرار داده شد. با استفاده از پنس، قیچی و یا اسکالپل نمونه‌های گره‌های لنفاوی را باز و تکه کرده و با اضافه کردن مقداری آب ولرم (حدود ۳۷ درجه سانتی‌گراد) به داخل پلیت با چشم غیرمسلح یا در زیر استروئومیکروسکوپ بررسی گردید. در صورت مثبت بودن، نوچه‌های انگل با استفاده از قلم‌موی جداسازی، ضمن شمارش آن‌ها پس از سه بار شستشو با آب معمولی، به داخل ظروف حاوی الکل ۷۰ درصد انتقال داده شد. در نهایت، تعدادی از نوچه‌های تثبیت‌شده در الکل اندازه‌گیری و نتایج ثبت گردید.

روش آزمون آماری: نتایج و داده‌های به‌دست‌آمده از میزان آلودگی، با توجه به مناطق، جنس و سن تقریبی، رنگ و قوام گره‌های لنفاوی با نرم‌افزار آماری SPSS vol.17 و با آزمون مربع کای تجزیه و تحلیل آماری شد.

یافته ها

نتایج بررسی و تحلیل آماری نمونه‌های اخذشده از گوسفندان استان ایلام به شرح زیر است:

الف. شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان استان ایلام و برحسب مناطق جغرافیایی: از مجموع ۶۱۹ نمونه گره‌های لنفاوی از گوسفندان مناطق استان ایلام، ۹۹ نمونه (۱۶ درصد) به نوچه انگل لینگواتولا سراتا آلوده

بودند. نتایج بررسی آزمون کای‌دو نشان داد که میان شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا، تفاوت معناداری وجود ندارد ($P=0.346$). در استان ایلام، بیشترین میزان شیوع به انگل در گوسفندان مناطق جنوبی و مرکزی استان به ترتیب با ۱۹ درصد و ۱۸/۳ درصد و کمترین میزان شیوع در منطقه شرقی ایلام با ۱۱/۷ درصد مشاهده شد. شیوع آلودگی در استان ایلام با ۹۵ درصد اطمینان، در فاصله ۴-۲۵/۸ درصد قرار گرفته است (جدول شماره ۱).

ب. شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان استان ایلام برحسب جنس: از ۴۱۶ گوسفند نر، ۴۷ نمونه (۱۱/۳ درصد) در منطقه ایلام و از ۲۰۳ گوسفند ماده، ۵۲ نمونه (۲۵/۶ درصد) به لینگواتولا سراتا آلوده بودند. نتایج آزمون کای‌دو نشان داد، میان شیوع آلودگی در دو جنس نر و ماده اختلاف معنی‌داری وجود دارد ($P=0.001$). شیوع آلودگی در گوسفندان جنس نر با ۹۵ درصد اطمینان، در فاصله ۸-۱۴/۳ درصد و جنس ماده در فاصله ۳۱/۶ - ۱۹/۶ درصد قرار داشت (جدول شماره ۲).

ج. شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان استان ایلام برحسب سن: در بررسی نمونه‌های چهار گروه سنی گوسفندان، بیشترین درصد آلودگی مربوط به دامنه سنی سه سال و بیشتر به میزان ۲۳/۴ درصد و کمترین آن مربوط به سن کمتر از یک سال به میزان ۱۱/۳ درصد بود.

جدول شماره ۱. شیوع آلودگی گره‌های لنفاوی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان استان ایلام برحسب منطقه (شهرستان)

منطقه	تعداد	تعداد آلوده	بیشینه فاصله	کمینه فاصله	X ²	p
مرکزی	۲۲۹	۴۲ (۱۸/۳ درصد)	۲۳/۴ درصد	۱۳/۳ درصد	۴/۴۶	۰/۳۴۶
شمالی	۹۴	۱۲ (۱۲/۷ درصد)	۱۹/۵ درصد	۶ درصد		
جنوبی	۱۳۱	۲۵ (۱۹ درصد)	۲۵/۸ درصد	۱۲/۴ درصد		
شرقی	۹۴	۱۱ (۱۱/۷ درصد)	۱۸/۲ درصد	۵ درصد		
غربی	۷۱	۹ (۶ درصد)	۲۰/۴ درصد	۴ درصد		
جمع	۶۱۹	۹۹ (۱۶ درصد)	۱۸/۹ درصد	۱۳/۱ درصد		

جدول شماره ۲. شیوع آلودگی گره‌های لنفاوی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان استان ایلام برحسب جنس

جنس	تعداد	تعداد آلوده	بیشینه فاصله	کمینه فاصله	X ²	P
نر	۴۱۶	۴۷ (۱۱/۳ درصد)	۱۴/۳ درصد	۸ درصد	۲۰/۸۱	۰/۰۰۱
ماده	۲۰۳	۵۲ (۲۵/۶ درصد)	۳۱/۶ درصد	۱۹/۶ درصد		
جمع	۶۱۹	۹۹ (۱۶ درصد)	۱۸/۹ درصد	۱۳/۱ درصد		

جدول شماره ۳. شیوع آلودگی گره‌های لنفاوی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان استان ایلام برحسب سن

سن (سال)	تعداد کل	تعداد آلوده	کمینه فاصله	بیشینه فاصله	X ²	P
<۱	۲۲۹	۲۶ (۱۱/۳ درصد)	۱۵/۵ درصد	۷/۲ درصد	۹/۰۳	۰/۰۲۹
۱-۲	۱۷۰	۲۶ (۱۵/۳ درصد)	۲۰/۷ درصد	۹/۹ درصد		
۲-۳	۱۲۲	۲۴ (۱۹/۶ درصد)	۲۶/۷ درصد	۱۲/۶ درصد		
۳≥	۹۸	۲۳ (۲۳/۴ درصد)	۳۱/۹ درصد	۱۵/۱ درصد		
جمع	۶۱۹	۹۹ (۱۶ درصد)	۱۸/۹ درصد	۱۳/۱ درصد		

نتایج آزمون کای دو نشان داد، در شیوع آلودگی میان گروه‌های سنی تفاوت معنی داری وجود دارد ($P=0.029$) (جدول شماره ۳).

د. شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان استان ایلام برحسب رنگ و قوام گره‌های لنفاوی: نتایج آزمون کای دو با توجه به بررسی رنگ گره‌های لنفاوی در گوسفندان استان ایلام نشان داد که از لحاظ شیوع آلودگی به انگل لینگواتولا سراتا، در گروه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد ($P=0.001$). بیشترین میزان شیوع انگل (۴۵/۶ درصد) به گره‌های تیره و کمترین میزان شیوع به گروه قرمز رنگ با (۷/۱ درصد) تعلق داشت. شیوع آلودگی با ۹۵ درصد اطمینان در گره‌های لنفاوی

رنگ طبیعی (در فاصله ۱۱/۵-۰/۶ درصد)، با رنگ قرمز (۶/۷-۱/۱۲ درصد) و با رنگ سیاه (۳/۵۴-۹/۳۶ درصد) قرار گرفته بود. نتایج نشان داد که در شیوع آلودگی بر اساس قوام گره‌های لنفاوی، در گروه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد ($P=0.001$). در این پژوهش از ۳۶۵ نمونه با قوام طبیعی، ۲۸ نمونه (۷/۶ درصد)، از ۱۲۷ نمونه با قوام سفت، ۳۲ نمونه (۲۵/۲ درصد)، از ۱۲۷ نمونه با قوام نرم نیز ۳۹ نمونه (۳۰/۱ درصد) آلوده بودند. فاصله نقطه‌ای بیشترین آلودگی در گروه با قوام نرم با ۹۵ درصد اطمینان، در فاصله ۳۸/۷-۲۲/۷ درصد و کمترین میزان شیوع آلودگی در گروه با قوام طبیعی در فاصله ۱۰/۴-۴/۹ درصد قرار داشت (جدول شماره ۴).

جدول شماره ۴. شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان استان ایلام برحسب رنگ و قوام گره‌های لنفاوی

متغیر	گروه	تعداد کل	تعداد آلوده	بیشینه فاصله	کمینه فاصله	تعداد نوجه		X ²	P
						بیشترین	کمترین		
رنگ	طبیعی	۴۱۰	۳۶ (۸/۷ درصد)	۱۱/۵ درصد	۰/۶ درصد	۴	۱۸	۱۰۲/۳۲	۰/۰۰۱
	قرمز	۸۴	۶ (۷/۱ درصد)	۱۲/۷ درصد	۱/۶ درصد	۴	۴		
	تیره	۱۲۵	۵۷ (۴۵/۶ درصد)	۵۴/۳ درصد	۳۶/۹ درصد	۴	۹۸		
قوام	طبیعی	۳۶۵	۲۸ (۷/۶ درصد)	۱۰/۴ درصد	۴/۹ درصد	۴	۱۸	۴۷/۲۹	۰/۰۰۱
	سفت	۱۲۷	۳۲ (۲۵/۲ درصد)	۳۲/۷ درصد	۱۷/۶ درصد	۴	۴		
	نرم	۱۲۷	۳۹ (۳۰/۷ درصد)	۳۸/۷ درصد	۲۲/۷ درصد	۴	۹۸		

بحث و نتیجه گیری

لینگواتولا سراتا یا کرم زبانی شکل، یکی از انگل‌های مشترک انسان و دام و عامل اشکال مختلف لینگواتولوز در نشخوارکنندگان، گوشت خواران و انسان است. ابتلای انسان به مرحله نوجه‌ای انگل، لینگواتولوزیس نازوفارنکس یا سندرم مارارا و یا هالزون و به تخم انگل،

لینگواتولوزیس احشایی نامیده شده است. آلودگی‌های انسانی از طریق مصرف احشای آلوده نشخوارکنندگان به ویژه کبد و گره‌های لنفاوی کم پخته از آفریقا، جنوب شرقی آسیا، چین و خاورمیانه گزارش شده است (۱۱-۱۵). گزارش‌های متعددی از لینگواتولوزیس در انسان به وسیله محققان از ایران ارائه گردیده است (۱۸-۱۹).

۱۶، ۸). نوچه‌های لینگواتولا سراتا از قسمت‌های مختلف بدن انسان نظیر چشم، مغز، روده، غده پروستات و کبد گزارش شده است. معمولاً آلودگی‌ها بدون علامت هستند و غالباً از طریق اتوپسی و مشاهدات رادیوگرافی می‌توان کیست‌های در حال کلیسیفه شدن و دارای نوچه را مشاهده کرد (۲۱-۱۱، ۱۹، ۷). با این حال، علائم بر اساس اعضای آلوده متفاوت است. در انسان نشانه‌های بالینی متنوع‌اند و شامل سرفه، گلودرد، ادم، ترشح زیاد بزاق و تجمع خلط می‌شود که ممکن است تا حنجره و شیبورهای استاش ادامه یابد. آماس ملتحمه، بینی و لب‌ها، آماس عقده‌های لنفاوی تحت‌فکی و گردنی و گاهی تشکیل آبسه در چشم و گوش گزارش شده است؛ همچنین دشواری در تنفس و بلع غذا، استفراغ، سردرد، ترس از نور و اگزوفتالمی دیده می‌شود. در لینگواتولوزیس چشمی، درد چشم، آماس ملتحمه و ضعف دید روی می‌دهد (۲۵-۲۲، ۱۸، ۶).

در مطالعه حاضر، شیوع آلودگی در گوسفندان استان ایلام با ۱۶ درصد و بیشترین شیوع با ۱۹ درصد در مناطق یا شهرستان‌های جنوبی (آبدانان، دره شهر و دهلران) و کمترین آن با ۱۱/۷ درصد در مناطق شرقی (شیروان، چرداول و سیروان) به دست آمد. بررسی آماری میان شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان تفاوت معناداری نشان نداد ($P=0.346$)، در صورتی که میان شیوع آلودگی به این انگل، جنس، سن حیوانات، رنگ و قوام گره‌های لنفاوی مطالعه شده اختلاف معنی‌داری دیده شد. بیشترین میزان شیوع آلودگی به انگل در جنس ماده، سنین بالاتر، در گره‌های لنفاوی تیره و دارای قوام نرم مشاهده گردید.

درباره شیوع آلودگی گوسفندان به این انگل و نیز ارتباط آن با جنس، سن و نوع گره‌های لنفاوی در مناطق مختلف ایران مطالعاتی انجام شده که با نتایج متفاوتی همراه بوده است. البرزی و درخشنده (۲۰۰۸) آلودگی گره‌های لنفاوی مزانتریک و کبدی به نوچه لینگواتولا سراتا در گوسفندان استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج)

در جنوب غربی ایران را به ترتیب ۴۶/۷۶ درصد و ۵/۷۵ درصد (۱۰) گزارش کردند، در صورتی که در جنوب ایران، شکر فروش و همکاران (۲۰۰۴) آلودگی گره‌های لنفاوی مزانتر و کبد گوسفندان استان فارس (شیراز) را به ترتیب ۱۱/۵ درصد و ۳ درصد گزارش نمودند (۴). البرزی و همکاران (۲۰۱۳) با بررسی گره‌های لنفاوی مزانتری، آلودگی گاو و گاومیش‌های اهواز به نوچه لینگواتولا سراتا را به ترتیب ۱۶/۸ و ۱۶/۳ درصد گزارش کردند (۲۶).

رضایی و همکاران (۲۰۱۱) شیوع آلودگی به نوچه لینگواتولا سراتا در گره‌های لنفاوی گوسفندان استان آذربایجان غربی (ارومیه) در شمال غرب ایران را ۴۲/۶۹ درصد و ارتباط آن با سن و جنس حیوانات را معنی‌دار گزارش نموده‌اند (۲۷).

توسلی و همکاران (۲۰۰۷) نیز با بررسی گره‌های لنفاوی مزانتریک و تغییرات آن در گوسفندان ارومیه، میزان شیوع آلودگی به نوچه انگل را ۵۲/۵ درصد اعلام کرده‌اند. در مطالعه یاد شده، شیوع آلودگی در گره‌های لنفاوی سیاه‌رنگ با ۸۶/۳ درصد از گره‌های با رنگ طبیعی با میزان ۹/۳ درصد، به طور معنی‌داری بیشتر بود ($P<0.05$). علاوه بر این، آلودگی گره‌های لنفاوی نرم با ۹۹ درصد، از گره‌های طبیعی با ۱۴/۶ درصد و گره‌های سخت با ۳۳/۳ درصد، به طور معنی‌داری متفاوت و همچنین میانگین شدت آلودگی در گره‌های نرم و سیاه به طور معنی‌داری از طبیعی بیشتر گزارش شده است ($P<0.05$) (۲۸).

نورالهی فرد و همکاران (۲۰۱۱) در بررسی کشتارگاهی گره‌های لنفاوی مزانتریک گوسفندان استان کرمان (کرمان)، شیوع آلودگی به نوچه لینگواتولا سراتا را ۱۶/۱ درصد و مرتبط با افزایش سن حیوانات اعلام کردند. افزایش سن سبب افزایش احتمال برخورد با تخم انگل می‌شود. با این حال، میان شیوع آلودگی در نرها و ماده‌ها تفاوت معنی‌داری دیده نشده است (۲۹).

میرزایی و همکاران (۲۰۱۱) با بررسی گره‌های

کیسه (کیست) خارج می شوند و با مهاجرت به نواحی بینی، حلق و... با قلاب های اطراف دهانشان به بافت میزبان متصل و به طور مکانیکی و با ایجاد ازدیاد حساسیت، سبب بیماری با نشانه های مشخص می گردند (۱۷، ۱۳).

نتایج مطالعات و همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد که درصد بالایی از گره های لنفاوی طبیعی گوسفندان به نوچه انگل آلوده است و ممکن است به علت ناآگاهی افراد، برای تغذیه سگ ها استفاده شود که در این صورت، چرخه زندگی انگل کامل می گردد و آلودگی و خطرات آن تداوم پیدا می کند. به طور کلی، با توجه به اینکه آلودگی بالای گوسفندان انعکاسی از آلودگی سگ های منطقه (۳۱) است که خطر بالقوه ای برای ابتلای انسان خواهد بود؛ بنابراین، علاوه بر اقدامات کنترلی معمول، آموزش صاحبان سگ (دامداران) در خودداری از تغذیه سگ ها با امعا و احشای دامی خام (به ویژه گره های لنفاوی) می تواند در پیشگیری و کنترل انگل مفید باشد؛ همچنین پیشنهاد می شود پزشکان محترم در هنگام برخورد با بیماران با علائم درد در ناحیه حلق، سرفه، عطسه، استفراغ و فارنژیت، امکان ابتلا به این انگل را در نظر بگیرند.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، به سبب تأمین هزینه اجرای این تحقیق، تشکر و قدردانی می کنند.

لنفاوی مزانتریک ۴۲۰ رأس گوسفند کشتار شده در کشتارگاه تبریز (شمال غرب ایران)، شیوع آلودگی به نوچه لینگواتولا سراتا را ۳۷/۵۷ درصد گزارش کردند. در این مطالعه نیز میزان آلودگی با بالا رفتن سن حیوانات و در گره های لنفاوی با رنگ تیره نسبت به گره های لنفاوی با رنگ طبیعی، به طور معنی داری افزایش داشته است ($P < 0.05$) (۳۰).

آلودگی گره های لنفاوی به این انگل از جنبه های اپیدمیولوژی بیماری در انسان و حیوانات بسیار مهم است. در بسیاری از مناطق به علل مختلف از جمله مذهبی، از گره های لنفاوی در تغذیه انسان استفاده نمی شود، با این حال، در برخی مناطق به طور خواسته و یا ناخواسته مصرف می گردد که می تواند سبب ابتلای انسان شود. نکته قابل توجه و مهم تر اینکه آلودگی گره های لنفاوی گوسفندان می تواند شاخصی در احتمال آلودگی کبد باشد که مصرف خوراکی بالایی برای انسان دارد (۱۰، ۴)؛ بنابراین، احتمال ابتلا از طریق خوردن کبدهای آلوده به صورت خام یا کم پخته، به ویژه با وجود برخی نگرش های موجود در جامعه که خوردن کبد خام را مقوی تر و با ارزش غذایی بالاتری تلقی می کنند، احتمال ابتلا به این انگل و ایجاد بیماری لینگواتولوز نازوفارنکس را افزایش می دهد. به نظر می رسد پس از خوردن احشای خام یا نیم پز، به ویژه کبد و گره های لنفاوی حاوی انگل، در دهان، مری یا معده طی چند دقیقه تا ساعت، نوچه ها از

References

1. Acha PN, Szyfres B. Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and Animals. Pan American Health Org. 2003; 15: 345-8.
2. Roberts LS, Janovy J, Gerald D, Schmidt & Larry S. Roberts' Foundations of Parasitology. Mc Graw-Hill. 2009; 485-90.
3. Esmailzadeh S, Mohammadian B, Rezaei A. Linguatula serrata nymphs in a cat. (Scientific report). Iran J Veterin Res. 2008; 9:4: 387-389.
4. Shekarfroush SS, Razavi SM, Izadi M. Prevalence of Linguatula serrata nymphs in sheep in Shiraz, Iran. Small Ruminant Res. 2004; 52: 99-101. doi: 10.1016/S0921-4488(03)00224-4
5. Soulsby EJ. Helminths. Arthropods and Protozoa of domesticated animals. Bailliere Tindall and Cassell Ltd, London; 1982; 497-8.
6. Mohammadi GA, Mobedi I, Ariaiepour M, Pourmohammadi Z, Bidaki MZ. A case report of nasopharyngeal linguatuliasis in Tehran, Iran and characterization of the isolated Linguatula serrata. Iran J Parasit. 2008; 3:53-5.
7. Machado MA, Makdissi FF, Canedo LF, Martino RB, Crescentini F, Chieffi PP, Bacchella T, Machado MC. Unusual case of pentastomiasis mimicking liver tumor. J Gastro Hep. 2006; 21:1218-20. doi:10.1111/j.1440-1746.2006.03203.x
8. Maleky F. A case report of Linguatula serrata in human throat from Tehran, central Iran. Indi J med sci. 2001; 55:8:439-41.
9. Yeganeh Moghadam A, Talari SA, Dehghani R. A case of Human Linguatula serrata infestation in Kashan. J Kerman Uni Med sci. 2001; 8:3:175-8.
10. Alborzi A, Derakhshandeh T. A survey of infection of Linguatula serrata nymphs in

- slaughtered sheep at Yasuj abattoir. Iran Veterin J. 2008; 4 :1:103-109. (Persian).
11. Lai C, Wang XQ, Lin L, Zhang HX, Zhang YY, Zhou YB. Imaging features of pediatric pentastomiasis infection: a case report. Korean J Radio. 2010;11(4):480-4. doi: <https://doi.org/10.3348/kjr.2010.11.4.480>
 12. El-Hassan AM, Eltoum IA, El-Asha BM. The Marrara syndrome: isolation of *Linguatula serrata* nymphs from a patient and the viscera of goats. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1991;85:2:309. doi: [10.1016/0035-9203\(91\)90072-7](https://doi.org/10.1016/0035-9203(91)90072-7)
 13. Yagi H, El Bahari S, Mohamed HA, Mustafa B, Mahmoud M, Saad MB, Sulaiman SM, El Hassan AM. The Marrara syndrome: a hypersensitivity reaction of the upper respiratory tract and buccopharyngeal mucosa to nymphs of *Linguatula serrata*. Acta Tropica. 1996;62:3:127-34. doi.org/10.1016/S0001-706X(96)00017-4
 14. Yao MH, Wu F, Tang LF. Human pentastomiasis in China: case report and literature review. J Parasitol. 2008;94:6:1295-8. doi: [10.1645/GE-1597.1](https://doi.org/10.1645/GE-1597.1)
 15. Yilmaz H, Cengiz ZT, Çiçek M, Dülger AC. A nasopharyngeal human infestation caused by *Linguatula serrata* nymphs in Van province: a case report. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2011;35:1:47-9. doi: [10.5152/tpd.2011.12](https://doi.org/10.5152/tpd.2011.12)
 16. Sadjjadi SM, Ardehali SM, Shojaei A. A case report of *Linguatula serrata* in human pharynx from Shiraz, southern Iran. Med J Islamic Rep Ir (MJIRI). 1998;12:2:193-4.
 17. Siavoshi MR, Asmar M, Vatankhah A. Nasopharyngeal pentastomiasis (Halzoun): report of 3 cases. Iranian Journal of Medical Sciences. 2002; 27(4):191-92.
 18. Yazdani R, Sharifi I, Bamorovat M, Mohammadi MA. Human linguatulosis caused by *Linguatula serrata* in the city of Kerman, South-eastern Iran-case report. Iran J parasitol. 2014;9:2:282.
 19. Baird JK, Kassebaum LJ, Ludwig GK. Hepatic granuloma in a man from North America caused by a nymph of *Linguatula serrata*. Pathology. 1988;20:2:198-9. doi: [10.3109/00313028809066635](https://doi.org/10.3109/00313028809066635).
 20. Gardiner CH, Dyke JW, Shirley SF. Hepatic granuloma due to a nymph of *Linguatula serrata* in a woman from Michigan: a case report and review of the literature. Am J Trop Med Hyg. 1984;33:1:187-9. doi: [10.4269/ajtmh.1984.33.187](https://doi.org/10.4269/ajtmh.1984.33.187)
 21. Ette HY, Fanton L, Bryn KA, Botti K, Koffi K, Malicier D. Human pentastomiasis discovered postmortem. Forensic Sci Int. 2003;137:1:52-4. doi: [10.4269/ajtmh.2011.11-0404](https://doi.org/10.4269/ajtmh.2011.11-0404)
 22. Koehsler M, Walochnik J, Georgopoulos M, Prunte C, Boeckeler W, Auer H, Barisani-Asenbauer T. *Linguatula serrata* tongue worm in human eye, Austria. Emerg Infect Dis. 2011;17:5:870. doi: [10.3201/eid1705.100790](https://doi.org/10.3201/eid1705.100790)
 23. Lazo RF, Hidalgo E, Lazo JE, Bermeo A, Llaguno M, Murillo J, Teixeira VP. Ocular linguatuliasis in Ecuador: case report and morphometric study of the larva of *Linguatula serrata*. Am J Trop Med Hyg. 1999;60:3:405-9. doi.org/10.4269/ajtmh.1999.60.405
 24. Saumya Pal S, Bhargava M, Kumar A, Mahajan N, Das S, Nandi K, Guha S, Raman M, Jeyathilakan N, Biswas J. An unusual intraocular tongue worm in anterior chamber: a case report. Ocul Immunol Inflamm. 2011;19:6:442-3. doi: [10.3109/09273948.2011.621579](https://doi.org/10.3109/09273948.2011.621579)
 25. Mehlhorn H, editor. Encyclopedia of parasitology: 2nd ed. Springer- Verlag Heidelberg. 2008; 720-722.
 26. Alborzi AR, Molayan PH, Akbari M. Prevalence of *Linguatula serrata* nymphs in mesenteric lymph nodes of cattle and buffaloes slaughtered in Ahvaz Abattoir, Iran. Iranian J Parasitol. 2013;8:2:327.
 27. Rezaei F, Tavassoli M, Mahmoudian A. Prevalence of *Linguatula serrata* infection among dogs (definitive host) and domestic ruminants (intermediate host) in the North West of Iran. Veterinarni Med. 2011;56(11):561-7.
 28. Tavassoli M, Tajic H, Dalir-Naghadeh B, Hariri F. Prevalence of *Linguatula serrata* nymphs and gross changes of infected mesenteric lymph nodes in sheep in Urmia, Iran. Small Ruminant Research. 2007;72:1:73-6. doi: [10.1016/j.smallrumres.2006.08.013](https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2006.08.013)
 29. Nourollahi Fard SR, Kheirandish R, Asl EN, Fathi S. Mesenteric and mediastinal lymph node infection with *Linguatula serrata* nymphs in sheep slaughtered in Kerman slaughterhouse, Southeast Iran. Tropical animal health and production. 2011;43:1:1-3. doi: [10.1007/s11250-010-9670-7](https://doi.org/10.1007/s11250-010-9670-7)
 30. Mirzaei M, Asgarinejad H, Rezaeisaghinsara H. A survey of *Linguatula serrata* infection in sheep in Tabriz abattoir, East Azarbaijan Province. Journal of Veterinary Laboratory Research. 2011 Sep 15;3(1):69-75. (Persian)
 31. Bahrani A, Yousofzadeh S, Kermanjani A. Study of *Linguatula serrata* infection rate among shepherd and stray dogs in Ilam (Western Iran). J Ilam Uni Med Sci. 2011; 19(2): 60-65. (Persian)