

بررسی اثر داروی ترکیبی زاج سیاه و سفید بر ضایعات ناشی از لیشمانيوز جلدی

علی محمد بهرامی^{۱*}، افرا خسروی^۲، ناهید ماسپی^۲

(آموزشکده دامپزشکی، دانشگاه ایلام)

(۲) گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تاریخ پذیرش: 88/10/22

تاریخ دریافت: 88/6/15

چکیده

مقدمه: لیشمانيوز بیماری انگلی مشترک بین انسان و حیوان با تنوع بالینی گسترده می‌باشد، که تحقیقات زیادی درباره جنبه‌های مختلف آن توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شده است. درمان لیشمانيوز انسانی هنوز بر پایه استفاده از ترکیبات آنتی موan ۵ ظرفیتی که دارویی پرعارضه می‌باشد صورت می‌گیرد. علاوه بر عوارض کاربرد این ترکیب‌ها، مقاومت انگل نسبت به این ترکیب‌ها هم مشکلی رو به افزایش است و با توجه به مشکلات مذکور و از طرف دیگر اندمیک بودن بیماری در این منطقه، نیز از دیگر دلایل اجرای این تحقیق محاسب گردید.

مواد و روش‌ها: با استفاده از پرسشنامه‌های از قبل تهیه شده و همکاری معاونت بهداشت و درمان استان و درمانگاه‌های سطح شهر ایلام، ۳۶ بیمار انتخاب گردید پس از دریافت رضایت کتبی به سه گروه ۱۲ نفره تقسیم گردیدند. گروه ۱ شاهد(تحت درمان با داروی شیمیائی آمفوتربیسین B، گروه ۲(تحت درمان با داروی محلی فرمول‌بندی شده شماره ۱) و گروه سوم(تحت درمان با داروی فرمول‌بندی شده محلی شماره ۲)(شماره ۱ با ترکیب درصد بالاتر بصورت جلدی) تحت نظر پزشک مورد درمان قرار گرفتند. جهت اطمینان از وجود آماتیگوت در بیماران از سه روش الف)بیویسی ب)محیط کشت (NNN) ج)آسپیره کردن از لبه ضایعه استفاده گردید.

یافته‌های پژوهش: یافته‌های حاصل از این نشان داد که داروی محلی ترکیب شده در دو غلظت متفاوت اثر خوبی داشت و داروی شماره دو محلی می‌تواند در تسريع بهبود زخم‌ها با داروی شیمیائی قابل مقایسه باشد. در افرادی که با داروی محلی شماره دو درمان شده بودند احساس استرس و خارش در اطراف زخم‌ها وجود نداشت و در صورتی که در گروه شاهد این احساس استرس و خارش در دوران معالجه وجود داشت. در کنترل قطره‌های زخم‌ها نیز داروی تهیه شده محلی تأثیر بسزایی در کوتاه مدت از خود نشان داد که قابل مقایسه با داروی آمفوتربیسین B می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که احتمالاً در ترکیب داروی محلی فرمول‌بندی شده با زاج سفید، زاج سیاه، کات کبود، کره، عوامل کنترل و مهار کننده بیماری لیشمانيوز جلدی وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: لیشمانيوز، سالک، زاج سفید، کات کبود

*نویسنده مسئول: آموزشکده دامپزشکی، دانشگاه ایلام

Email : am_bahram۴۰۰۲@yahoo.com

مقدمه

36 نفر از بیماران پس از انجام آزمایش و مثبت بودن نتیجه آن یعنی تایید لیشمانیوز جلدی به صورت داوطلبانه با آگاهی از ترکیب داروی محلی و با اخذ رضایت کتبی انتخاب گردیده، تحت نظر پزشک مورد درمان قرار گرفتند. ابتدا در مواردی که زخم بیمار مشکوک به بیماری ثانویه بود با تجویز داروی آنتی‌بیوتیک مناسب به مدت یک هفته عفونت مورد درمان قرار گرفت. از تعداد 36 نفر بیمار، 22 نفر زن و 14 نفر مرد بودند. این تعداد که بین 20 تا 30 سال سن داشتند به سه گروه 12 نفری تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه شاهد تحت درمان داروی شیمیائی آمفوتیریسین B سه روز اول 0/25 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن (از راه وریدی) و بعد از سه روز دوز دارو به میزان 0/5 میلی‌گرم بر کیلوگرم افزایش یافت و درمان به مدت 6 تا 12 هفته با مراجعه روزانه افراد تحت درمان، به درمانگاه ادامه داشت. گروه دوم تحت درمان ترکیب فرمول‌بندی شده داروی محلی شماره یک، و گروه سوم تحت درمان ترکیب فرمول‌بندی شده داروی محلی شماره 2 قرار گرفتند(جدول شماره 1). هر هفته یک بار معاینات بالینی بر روی بیماران صورت گرفت و قطره هاله زخم‌ها از ابتدای شروع تجویز دارو تا زمان توقف رشد زخم اندازه‌گیری گردید.

قبل از شروع درمان جهت اطمینان از وجود یا عدم وجود آماتستیگوت با سه روش تشخیص آزمایشگاهی ذیل لیشمانیوز جلدی تایید گردید.

الف- روش آسپیره کردن از لبه ضایعه: ابتدا لبه ضایعه مشخص گردید و سپس توسط یک سرنگ 2 میلی‌لیتری میزان 0/1 میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی استریل به داخل لبه ضایعه تزریق گردید. سر سوزن 2 الی 4 بار داخل پوست چرخانده شد. این کار موجب تشکیل قطعاتی از بافت در محل ورود سوزن می‌گردد و مایعات داخل بافت به وسیله سرنگ کشیده شد و از این مایع برای محیط کشت و تهیه گسترش جهت رنگ آمیزی استفاده گردید، (10). یک قطره کوچک از محتویات داخل سرنگ بر روی لام قرار گرفت و پس از خشک شدن در دمای اتاق با متانول فیکس گردید. لام‌ها با استفاده از محلول گیمسا به مدت 12 دقیقه رنگ آمیزی شدند و

عامل مولد بیماری لیشمانیوز جلدی در ایران لشیمانیا مازور (Leishmania major)، مولد فرم روسستائی یا مرتروب بیماری، و لشیمانیا تروپیکا (Leishmania tropica)، مولد فرم خشک یا شهری، می‌باشد، (1-2). علایم بالینی بیماری لیشمانیوز جلدی بسته به گونه و سویه انگل ایجاد کننده، متفاوت می‌باشد که از یک زخم کوچک پاپولی فاقد ترشحات تا فرم‌های با زخم وسیع، بادسرخی و فرم‌های مزمن لوپوئید یا توبرکلوئید متغیر می‌باشد. تفاوت در نوع ضایعات ناشی از تفاوت در گونه انگل، وبرولانس متفاوت آن‌ها و پاسخ‌های میزبان در مقابل انگل می‌باشد، (1-4). در زمینه کشف داروهای ضد لشیمانیا تاکنون مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته و مواد مختلفی به عنوان دارو پیشنهاد گردیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به عصاره اتیل استات از گیاه پودوکالیکس اشاره نمود که علیه پروماستیگوت‌های لیشمیمانیا مکزیکانا اثر نسبی دارد، (5). روغن لینالولول که از برگ‌های Croton-Cajucara گرفته می‌شود علیه لیشمیمانیا آمازونیس استفاده شده است، (6). با توجه به یافتن نشدن پاسخ بالینی صحیح، (7)، عوارض بالقوه جدی داروی‌های شیمیایی لیشمانیوز از جمله عوارض کبدی، قلبی، پانکراسی، عضلانی و اسکلتی، (9-8)، تزریق‌های دردناک طولانی مدت، هزینه‌های هنگفت برای سیستم بهداشتی و درمانی برای تهیه و وارد کردن دارو از مشکلات و نقاط ضعف داروهای شیمیایی در درمان لیشمانیوز جلدی می‌باشد. با توجه به نقاط ضعف یاد شده هدف از انجام این سری آزمایشات تلاش برای یافتن درمان کم عارضه، مؤثر، ارزان قیمت، قابل دسترس، کاهش دادن عارضه ضایعه باقی مانده از زخم پاپول‌ها(اسکارها) جهت دستیابی به داروئی برای التیام پاییول‌های لیشمانیوز جلدی با استفاده از دو ترکیب متفاوت از داروی محلی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

از بین بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به درمانگاه‌های سطح شهر ایلام، با مجوز از معاونت بهداشتی، دانشگاه علم و پزشکی ایلام،

روش تهیه و استعمال داروی محلی
زاج سفید، زاج سیاه، کات کبود ۰/۱ داده شده در
جدول (۱) با یکدیگر مخلوط نموده و با حرارت کم
سوزانده شد سپس آن را به خوبی بمدت ۵ دقیقه
سائیده با کره گاوی به خوبی مخلوط نموده
تا به صورت خمیر یا پماد مانند در آید. پماد تهیه
شده در دمای یخچال دور از حرارت و نور نگهداری شد
و این پماد در دو نوبت صبح و عصر روی
زخم‌ها(بدون وارد نمودن فشار) به حدی که تمام سطح
زمرا پوشاند مایلیده شد، باید توجه
داشته باشیم که فشار ب ساعت انتشار آماستیگوت
می‌گردد.

سپس با بزرگنمایی $\times 100$ و استفاده از روغن ایمرسیون
در زیر میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفتند.

ب-روش بیوپسی: ضایعه و لبه کناری آن برای
نمونه برداری با الكل کاملاً تمیز گردید. در موارد
ضروری و با درخواست بیمار بی حسی موضعی صورت
گرفت و سپس از لبه ضایعه با اسکالپل کاملاً استریل
شده نمونه برداری صورت گرفت.

ج-روش محیط کشت Navy- mac- Neal- (NNN) Nivolle

ترشحات از اطراف زخم گرفته شد و داخل محیط
NNN یا محیط‌های دو فازی با پایه آگار انتقال داده
شد و پروماستیگوت‌ها مشاهده گردید.

جدول ۱. فرمول مقدار مواد استفاده شده جهت تهیه پماد داروی محلی

فرمول تهیه شده داروی محلی شماره ۲		فرمول تهیه شده داروی محلی شماره ۱	
10 گرم	زاج سفید	5 گرم	زاج سفید
10 گرم	زاج سیاه	5 گرم	زاج سیاه
5 گرم	کات کبود ۰/۱	2/5 گرم	کات کبود ۰/۱
20 گرم	کره	10 گرم	کره
1 گرم	زردچوبه بعنوان ماده اضافی		

یافته‌های پژوهش

گروه سوم (بیمارانی که از داروی محلی شماره دو با درصد قوی‌تری و زردچوبه به عنوان ماده اضافه شده به پماد استفاده شده بود)، زخم‌های ۹ مورد بین ۳۹-۵۳ روز و ۳ مورد پس از ۱۴۶ روز بطور کامل بهبود یافتند(جدول شماره ۲). در مقایسه بین گروهی میانگین بهبود زخم‌های بیماران به ترتیب گروه یک تا سه، ۸۵، ۱۱۶ و ۷۱ روز به طول انجامید. انحراف معیار بین گروهی نیز آورده شده است(جدول شماره ۳).

قبل از درمان زخم‌های بیماران در هر ۳ گروه از وجود آماستیگوت اطمینان حاصل گردید و پس از شروع درمان، افراد تیمار شده با داروی شیمیائی آمفوتیریسین B در ۸ مورد زخم‌ها بین ۴۶-۶۱ روز، ۳ مورد بعد از ۱۴۱ روز و ۱ مورد بعد از ۱۶۸ روز زخم به طور کامل بهبود یافت. در گروه دوم از ۱۲ نفری که از داروی محلی شماره یک استفاده شده بود، زخم‌ها در ۷ مورد پس از ۶۲-۸۳ روز، ۳ مورد پس از ۱۶۴ روز و ۲ مورد پس از ۱۹۶ روز به طور کامل بهبود یافتدند. در

جدول شماره ۲. تفکیک روزهای بهبودی زخم‌ها با استفاده از داروهای مصرفی

عنوان دارویی	روزهای بهبود								جمع
	46-68	141	168	62-83	164	196	39-53	146	
آمفوتیریسین B	8	3	1	—	—	—	—	—	12
داروی بومی ۱	—	—	—	7	3	2	—	—	12
داروی بومی ۲	—	—	—	—	—	—	9	3	12

جدول شماره 3. مقایسه بین گروهی بهبود یافتن زخمهای و انحراف معیار سه گروه

مقایسه ها	No	(تعداد)	میانگین روزهای بهبود	Std. Deviation (انحراف معیار)
گروه اول (شاهد)	۱۲	۸۵	۴۷	
گروه دوم	۱۲	۱۱۶	۵۵	
گروه سوم	۱۲	۷۱	۴۵	

6 تا 9 روز به طول انجامید. داروی محلی شماره 1 که بر روی گروه دوم تست گردید دارای اثر ضعیفتری نسبت به داروی محلی شماره 2 از خود نشان داد. در 7 نفر از بیماران گروه دوم توقف رشد و گسترش پاپول‌ها پس از 9 روز از شروع درمان صورت گرفت و در 5 نفر باقی مانده این گروه 16 روز تا توقف گسترش پاپول‌ها به طول انجامید. زخمهای بیماران گروه شاهد(1) در 9 نفر از آن‌ها بعد از 8 روز استفاده از دارو و در 3 نفر دیگر باقی مانده این گروه بعد از گذشت 12 روز توقف گسترش زخمهای مورد مشاهده قرار گرفت.(جدول شماره 4)

یافته دیگر این تحقیق این که در دو مورد از بیماران گروههای 2 و 3 و به صورت خیلی خفیف از خارش اطراف زخمهای خود شکایت داشتند در صورتی که تمام افراد گروه یک(گروه شاهد) از خارش در اطراف زخمهای خود کاملاً گله مند و دچار استرس در دوره درمان بودند. قطر پاپول‌ها در هر سه گروه اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه گردید. داروی محلی شماره 2 که بر روی گروه سوم بیماران آزمایش گردید دارای اثر قابل توجهی بود، در 6 نفر از بیماران این گروه رشد پاپول‌ها به تدریج پس از 5 روز از استعمال داروی محلی متوقف گردید. در 6 نفر باقی مانده این گروه مدت زمان لازم برای توقف رشد تدریجی پاپول‌ها

جدول شماره 4. مقایسه بین قطر هاله ایجاد شده تا زمان فیکس شدن (به میلی متر)

عنوان دارویی	قطر هاله ایجاد شده تا زمان فیکس شدن (به میلی متر)			جمع
	15 تا 10	25 تا 16	36 تا 26	
Amphotericine B	۰	۱	۱۱	۱۲
داروی بومی 1	۱	۹	۱	۱۲
داروی بومی 2	۱	۱۱	۰	۱۲
جمع کل	۲	۲۱	۱۲	۳۶
درصد	۵,۶	۵۸,۳	۳۳,۳	۱۰۰

مقایسه با دو گروه دیگر نتیجه قابل توجه و موثری حاصل گردید. این داروی ترکیبی رشد و تکثیر انگل را متوقف نمود. در فرمول‌بندی داروی ترکیبی شماره 2 که از زردچوبه به عنوان ماده اضافی استفاده شده است، نتیجه بهتری حاصل شد که یکی از دلایل آن را می‌توان جذب رنگ در داخل سلول که آماتیگوت وجود داشت برشمود. احتمالاً عامل رنگی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل ممانعت از گسترش زخم عمل

بحث و نتیجه گیری
یکی از اهداف این پژوهش جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد تأثیر ترکیبی از زاج سفید، زاج سیاه، کات کبود ۱ درصد و کره گاوی در دو درصد متفاوت جهت دستیابی به داروی ترکیبی برای درمان بیماری لیشمینیوز جلدی انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در گروهی که از داروی محلی فرمول‌بندی شده شماره 2 استفاده کرده بودند، در

روزانه بیماران به پژوهش چهت دریافت تزریق دارو، نتیجه چندان مطلوبی حاصل نشده است،(11-13-16). نتیجه حاصل از استفاده داروی ترکیبی این تحقیق نشان می دهد که مقاومت دارویی به دلیل اثر مثبت آن در بهبود بیماران را می توان منفی تلقن نمود و از طرف دیگر اسکارهای باقیمانده در افرادی که از داروی ترکیبی استفاده نموده اند به دلیل جلوگیری از گسترش زخمها در ابتدای بیماری به مراتب برای بیماران قابل قبول تر و با استرس کمتر، نسبت به داروی شیمیائی بود و رضایت مندی نیز به همراه داشت.(عکس های 1-6) با توجه به نتیجه بدست آمده از این تحقیق و پاسخ قابل قبول علمی در برابر ترمیم ضایعات بیماری لیشمانيوز جلدی، این ترکیب داروی محلی فرمول بندی شده را می توان به عنوان یک داروی ترکیبی ارزان، قابل دسترس و مؤثر با مشورت پزشکان متخصص به صورت داروی درمانی جایگزین مورد استفاده بیماران جلدی با مطالعات و تحقیقات بیشتر پیشنهاد نمود. توصیه می شود به منظور تکمیل این تحقیق پژوهش های دیگری بر روی اثرگذاری واکنش رنگ در جلوگیری و در پیشرفت آماستیگوت در بیماران طراحی گردد.

نماید. این گفته در حد یک تئوری است، همچنان که در بعضی از مطالعات پراکنده کماکان به آن اشاره شده است و نیاز به تحقیقات دقیق تری دارد.

بر اساس نتایج این تحقیق، داروی تهیه شده ترکیبی بر روی ضایعات کوچک تر از 1/5 سانتیمتر مربع اثر بهبودی نسبتاً کاملی(94 درصد) داشت و در مقایسه با داروی شیمیائی فاقد واکنش حساسیت به شکل قرمزی پوست، تورم و خارش در اطراف ضایعه می باشد. وجود احساس خارش، تورم و حساسیت توسط داروهای شیمیائی در بیماران لیشمانيوز جلدی به وسیله تعدادی از محققین گزارش شده است،(15-11). اسکار، باقی مانده در پوست افراد مبتلا به بیماری لیشمانيوز جلدی حتی با گذشت سالیان متمادی همچنان نمایان است و ظاهری نامطلوب همراه با احساس ناخستنی به شخص دست می دهد چون معمولاً نواحی باز و در معرض دید از جمله صورت و دستها و پاهای گرفتار می شوند، و از نظر ظاهر و زیبائی به خصوص در دختران و زنان جوان مشکلاتی را ایجاد می کند. استفاده از داروهای کاملاً شیمیائی این ضایعه اسکار را کاملاً از میان نمی برد و از طرف دیگر در بعضی موارد به دلیل پیدایش مقاومت داروئی عامل بیماری، درد، طولانی بودن دوره درمان، مراجعه ممتد و



شکل(1،2) بهبودی لیشمانيوز بعد از استفاده از داروی محلی



شکل (4.3) اسکارهای باقی مانده بعد از بھبودی کامل با استفاده از داروی محلی



شکل(5) اسکارهای باقی مانده از لیشمانیوز جلدی بعد از استفاده از داروی شیمیابی



شکل(7) نمونه‌ای از مخازن پشه خاکی و جونده در محیط‌های زندگی



شکل (8) محیط زندگی همراه با احشام شرایطی مناسب(سیاه چادر)برای جذب پشه خاکی

References

- ۱-Motazadian H, Noamanpoor B, Ardehali S. [Characterization of leishmania parasites isolated from the Islamic Republic of Iran]. East Mediter Health J ۲۰۰۲; ۸(۲-۳): ۳۳۸-۳۴۴.
- ۲-Sarkari B, Razanejad H, Hatam GHR, Motazadian MH, Mirjalili A. [An in vitro study on virulence of leishmaniosis parasites isolated from cutaneous leishmaniosis patients]. Environmental of Armaghan-e- Danesh ۲۰۰۵; ۱۰(۳) ۱۷-۲۴.(Persian)
- ۳-Ardehali S, Rezai H, Nadim A. [Leishmaniasis and leishmania parasites]. ۱nd ed. Tehran: Tehran University publi. ۱۹۸۴; p. ۲۷-۴۲.(Persian)
- ۴-WHO. Report of working scientific group on leishmaniasis[on line][cited Feb. ۲۰۰۴]. Available from: URL http://www.who.int/publications/swg_leish.
- ۵-Ormazdi H. [Medical Parasitology (protozoa)]. ۱nd Ed. Tehran: Hayan publi ۱۹۸۸; ۲۳-۲۵.(Persian)
- ۶-Hatam GH, Ardehali S, Sajavy SM, Motezadian MH, Fakorzyba MR. [Technique of isolation and identification of leishmaniosis parasites]. Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences Publi ۱۹۸۹; ۳۸-۳۹. (Persian)
- ۷-Lawn SD, Yardley V, Watson J, et al. South American cutaneous leishmaniasis in returned travelers treatment failures using intravenous sodium stibogluconate. Trans Roy Soc Trop Med Hyg ۲۰۰۳; ۹۷: ۴۴۳-۰.
- ۸-Vega Lopez, Hey RJ. Parasitic worms and protozoa: Leishmaniosis. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths G, (editors). Rook's Textbook of Dermatology. Oxford Blackwell Science ۲۰۰۴.p. ۳۲: ۴۷.
- ۹-Pehoushek JF, Quinn DM, Crum WP. Cutaneous leishmaniasis in Iraqi soldiers. J Am Acad Dermatology ۲۰۰۴; ۴۱: S۱۲۰.
- ۱۰-Erans DA. Handbook on isolations, characterization and cry preservation of Leishmania. Geneva, Switzer land. UNDP/ World Bank / WHO Special Programme for Research and Training in Tropical Disease (TDR) ۱۹۸۹; ۱۲۱۱.
- ۱۱-Shamsi M, Bahrami AM. [The concepts of Arthropods in veterinary]. Ilam University publi ۲۰۰۹.p. ۲۱۱-۱۳.(Persian)
- ۱۲-Nylfroshzadeh MA, Raeeszadeh MR, Jafari F. [Local treatment of wet cutaneous leishmaniosis with chloro stick nazy acid in comparison with intralesional glucantim]. Clin Exp Dermatology ۲۰۰۳; ۲۶(۲): ۳۶-۴.(Persian)
- ۱۳-Sadeghian K, Nylforoshzadeh MA, Motavali Emami M. [Comparison of hyper tonic sodium chloride solution effects or interalesional Meglumine antimonite in treatment of cutaneous wet leishmaniosis]. Clin Exp Dermatology ۲۰۰۵; ۲۶(۴): ۲۵۱-۵۵.(Persian)
- ۱۴-Ardehali S, Razaei H, Nadeem A. [Leishmaniosis and leishmania parasites]. ۱nd Ed. Tehran: Tehran University publi ۱۹۸۴.p. ۲۰۸.(persian)
- ۱۵-Zaeem M, Sayadi Rashti SM, Saebi E .[The concepts of medical entomology]. ۱st ed, Tehran: Tehran University publi ۱۹۸۳; ۷۲-۰.(Persian)
- ۱۶-Faghihi G, Tavakoli Kia R. Treatment of cutaneous Leishmaniasis with either topical paromomycine or intralesional meglumine antimonite. Clin Exp Demerol ۲۰۰۳; ۲۸: ۱۳-۱۶.



Effects of Drug Combined of Black And White Alum on Cutaneous Leishmaniasis Lesion

Bahrami AM^{1*}, Khosravi A², Masp N²

(Received: 6 Sep, 2009)

Accepted: 12 Jan, 2010)

Abstract

Introduction: Leishmaniosis is a parasitic disease of man and animal with different clinical performance. WHO has suggested the disease to be investigated and supported from different points of view. The treatment of leishmaniosis is still based on using different compounds of antimonite drugs which cause variety of side-effects. Furthermore, resistance of parasites to this type of drug is an increasing problem. This is one reason along with being an epidemic disease in Ilam for our research to be accomplished.

Materials & Methods: In this study, 36 patients with their own written agreements, were divided into 3 groups, each group included 12 cases. The fist group was studied as the control part-taker receiving treatment with amphotericin B, the 2nd group were treated with local formulated drug (no 1), and the 3rd group received treatment with local made drug of more concentration (no2) under consultation of a physician. To conform the presence of amastigotes in patients, we used three different methods as follows: biopsy, culture media (NNN) and Smear.

Findings: Both the local made formulated drugs with two different concentration compounds showed different positive effects on leishmaniosis wounds; However, the 2nd local made drug showed better results in comparison with that of amphotericin B. Regarding the drug complications, in comparison with amphotericin B, the itching around wounds in patients who had used local made formulated drugs did not experience stresses and feelings of itching, but those patients who had used chemical drug had suffered lot of itching in the area as well as a lot of stresses during treatment. Regarding the control of the wound diameter in the patients, the local made drug proved more effective than amphotericin B.

Discussion & Concusion: In compound made local drug of black and white alum, sulphate of cooper %1 and butter, there is an effective factor for controlling cutanouse leishmaniosis.

Keywords: leishmaniosis, lesion, alum, sulphate of cooper

1. School of Veterinary, Ilam University, Ilam, Iran (corresponding author)

2. Dept of Basic Sciences, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Science, Ilam, Iran