

فعالیت آنتی اکسیدان های تام و غلظت مالون دی آلدئید در مایع سمینال مردان واریکوسل

اپاصلت حسین زاده کلاگر^{*}¹، علی بیدمشکی پور²، مریم قلی نژاد چاری¹

(1) گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه و گروه نانو و بیوتکنولوژی، دانشگاه مازندران

(2) گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه

تاریخ پذیرش: 88/3/4

تاریخ دریافت: 87/5/5

چکیده

مقدمه: واریکوسل شایع ترین علت ناباروری در مردان با شیوع تقریبی 19 تا 40 درصد می باشد که با مکانیسم های متعددی منجر به کاهش تولید و توانایی بارورسازی اسپرم ها می گردد. در این تحقیق، سطح آنتی اکسیدان های تام (TAC/total antioxidants capacity) و غلظت مالون دی آلدئید (MDA/malondialdehyde) در مایع سمینال به عنوان یکی از مکانیسم های احتمالی اثر واریکوسل بر روی کیفیت پارامتر های اسپرم و ناباروری در مردان بررسی شد.

مواد و روش ها: در پژوهش حاضر که یک مطالعه مورد- شاهدی است، نمونه های سمن شامل 15 مرد بارور نرمواسپرمیک و 14 مرد واریکوسل نابارور از مراکز IVF شهرستان بابل، فراهم شدند و بر اساس استانداردهای WHO آنالیز قرار گرفتند. سطح آنتی اکسیدان های تام (TAC) و غلظت مالون دی آلدئید (MDA)، در نمونه ها به ترتیب با روش های FRAP و TBA اندازه گیری شدند.

یافته های پژوهش: بر اساس نتایج مایانگین سطح TAC در مایع سمینال مردان واریکوسل $1092/43 \pm 370/56$ (p<0/001) به طور معنی داری کمتر از مردان بارور $(2335/44 \pm 764/78)$ بود (p<0/001). به علاوه سطح MDA در مایع سمینال مردان واریکوسل $(0/92 \pm 0/27)$ در مقایسه با مردان بارور $(0/57 \pm 0/22)$ به طور معنی داری بیشتر (p=0/001) بود.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق، به نظر می رسد که کاهش سطح آنتی اکسیدان ها و در پی آن افزایش سطح پراکسیداتیوی می تواند به عنوان یکی از اثرات منفی عارضه واریکوسل بر روی کیفیت و عملکرد اسپرم باشد که این نتایج نیازمند تحقیقات بیشتری است.

واژه های کلیدی: واریکوسل، ناباروری مردان، مالون دی آلدئید، فعالیت آنتی اکسیدان تام

*نویسنده مسئول: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه و گروه نانو و بیو تکنولوژی، دانشگاه مازندران

E-mail: ahcolagar@umz.ac.ir

واسطه گرهای (mediator) مهمی در مکانیسم‌های پیام رسانی داخل سلولی عمل می‌کنند. اما تولید بیش از حد ROS اثرات زیان باری بر عملکرد سلول دارد، (۱۰، ۱۱). تحقیقات بسیاری نشان دادند که ROS احتمالاً با پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع دارای چند پیوند دوگانه (poly unsaturated fatty acid) در ناحیه سر و قطعه میانی اسپرم و به موجب آن تغییر مورفوژئی اسپرم، کاهش تحرک اسپرم و عدم ادغام موقتی آمیز اسپرمیت - اسپرماتوزوآ در نقص عملکرد اسپرم نقش اساسی داشته باشد، (۱۲، ۱۳). شدت آسیب پراکسیداتیو را می‌توان با تخمین محصولات آลดهیدی پایدار انتهایی پراکسیداسیون لیپید (lipid peroxidative) از قبیل مالون دی آلدئید سنجد، (۱۰). این آلدهیدها می‌توانند از طریق واکنش پذیری با گروه تیول در پروتئین‌ها به طور کوالانسی به آن‌ها متصل گردد و عملکرد پروتئین را تغییر دهند. آن‌ها همچنین می‌توانند از طریق رادیکال‌های آلکوکسیل و پراکسیل باعث اکسیداسیون بازهای DNA (به ویژه گروه‌های آمینوگوانوزین) و اضافه شدن حلقه‌ها گردد که مجموعه این عوامل، سلول اسپرم را جهت بارورسازی تخمک ناتوان می‌سازد (۱۴، ۱۲). در مقابل اثرات پاتولوژیک رادیکال‌های آزاد، اسپرماتوزوآ و پلاسمای سمینال دارای مجموعه‌ای از آنتی اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی با وزن مولکولی پایین، تحت عنوان کلی ظرفیت آنتی اکسیدان‌های تام (TAC) می‌باشند. این آنتی اکسیدان‌ها به عنوان جمع کننده‌های رادیکال‌های آزاد جهت حفاظت اسپرماتوزوآ در برابر ROS عمل می‌کنند و از آنجایی که حجم عمدۀ ای از آنتی اکسیدان‌های سیتوپلاسمی اسپرم طی اسپرماتوزن تخلیه می‌شود، نسبت به اثرات پاتولوژیک رادیکال‌های آزاد فوق العاده حساس می‌باشند. لذا آنتی اکسیدان‌های مایع سمینال، جبرانی برای از دست رفتن این آنزیم‌های سیتوپلاسمی اند، (۹، ۱۵). بنابراین هر عاملی که سبب کاهش سطوح آنتی اکسیدان‌های پلاسمای سمینال گردد، منجر به اختلال در تعادل آنتی اکسیدان‌ها و رادیکال‌های آزاد شده و بر روی

مقدمه

واریکوسل توده‌های مشکل از وریدهای متسع و پیچ در پیچ (pampiniform) در بالا و اطراف بیضه است، (۱-۴). این اختلال آناتومیکی یکی از شایع‌ترین علل ناباروری در مردان می‌باشد، (۵). که تقریباً در ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت کل مردان، به ویژه جوانان، (۱) و ۱۹ تا ۴۱ درصد مردان نابارور دیده شده است، (۷، ۳، ۶). اگر چه پیشگویی اشر واریکوسل بر روی توانایی بارورسازی مردان تا حدودی مشکل می‌باشد، تحقیقات اخیر نشان داده است که احتمالاً واریکوسل با مکانیسم‌های متعددی بر کاهش کیفیت اسپرم اثر می‌گذارد که در نهایت فرآیند اسپرماتوزن دچار اختلال می‌گردد، (۷). یکی از این مکانیسم‌های پیشنهادی، افزایش سطح متابولیت‌های واکنش پذیر اکسیژن (oxygen species/ROS reactive) افزایش سطح اکسیداتیوی (oxidative stress) است که توجه زیادی را به خود جلب نمود، (۸). ROS‌ها به خانواده رادیکال‌های آزاد تعلق دارند که به خاطر داشتن حداقل یک الکترون جفت نشده در ساختار خود، بسیار واکنش پذیر بوده به طوری که قادرند با انواع ماکرومولکول‌های زیستی واکنش داده و نهایتاً منجر به اکسیداسیون آن‌ها گردند، (۹). متدائل ترین متابولیت‌های واکنش پذیر اکسیژن که اثر شدیدی بر بیولوژی تولید مثل می‌گذارند شامل آنیون سوپراکسید (-O^۲)، پراکسید هیدروژن (H^۲O^۲)، رادیکال هیپوکلرید (HClO-) و رادیکال بسیار واکنش پذیر هیدروکسیل (OH⁻) می‌باشند، (۱۰، ۹). تولید کنترل شده و متعادل ROS توسط اسپرماتوزوآ و دیگر سلول‌ها برای متابولیسم هوایی ضروری است به طوری که آن‌ها در غلظت‌های پایین نقش‌های فیزیولوژیکی زیادی برای سلول‌ها دارند و به عنوان

بابل می باشد. مراجعه کنندگان متعلق به استان مازندران و استان های هم جوار آن بودند. نمونه ها بعد از 2 تا 3 روز دوری از آمیزش در همان مراکز IVF در ظرف های پلاستیکی استریل جمع آوری شدند.

مطالعه پارامترهای اسپرم: نمونه های سمن تهیه شده، حدود نیم ساعت در دمای 37 درجه انکوبه شدند تا از فرم توده ای به فرم مایع روان تبدیل گردند. حدود 100 میکرولیتر از نمونه مایع روان برای بررسی پارامترهای اسپرمی (نظیر غلظت سمن، حرکت، تعداد و مورفولوژی اسپرم) بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO, ۱۹۹۸) برداشته شد، (18). و آنالیز اسپرمومگرام با روش های معمول میکروسوکوبی انجام شد، (جدول ۱). بقیه نمونه های ارزالی سریعاً جهت اندازه گیری TAC و MDA در دمای 20- درجه سانتی گراد فریز شدند.

اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدان های تام مایع سمینال به روش FRAP: فعالیت آنتی اکسیدان های FRAP (ferric reducing of antioxidants power) که اولین بار توسط Benzie در سال 1996 ابداع گردید، اندازه گیری شد، (19). برای این منظور ابتدا نمونه های سمن در g 10000 به مدت 7 دقیقه ساترنیفیوژ شدند. محلول رویی از رسوب جدا شد و 5 بار با آب مقطّر رقیق گردید، سپس سریعاً جهت اندازه گیری آنتی اکسیدان ها به کار رفت. برای اندازه گیری TAC، محلول استاندارد سولفات آهن (با غلظت های 125، 250، 500 و 1000 میکرومولار) و محلول FRAP [شامل: ۳۰ mM Sodium acetate buffer pH ۴، ۶-tri-pyridyl-s-، ۳، ۶ mM TPTZ و ۲۰ mM Ferric chloride triazine] به ترتیب با نسبت ۱۰، ۱ و ۱ استفاده شد. بعد از آماده سازی محلول ها، داخل هر لوله آزمایش ۱/۵ میلی لیتر محلول FRAP اضافه شد و به مدت ۵ دقیقه در دمای 37 درجه در حمام آب گرم انکوبه شدند. سپس حدود 50 میکرولیتر از نمونه های رقیق شده سمن، 50 میکرولیتر آب مقطّر (به عنوان کنترل) و 50 میکرولیتر از محلول های استاندارد با رقت های تهیه شده، به هر لوله آزمایش مربوطه اضافه گردید و مجدداً در حمام آب

عملکرد اسپرم اثر مخرب اعمال می کند. با این وجود تحت شرایط پاتولوژیکی، تولید بالای ROS ظرفیت آنتی اکسیدان ها را پاییمال می کند و باعث افزایش استرس اکسیداتیو می شود، (13، 14). محققان پیشنهاد دادند واریکوسل احتمالاً با سطح بالای ROS ارتباطی بین واریکوسل و ناباروری وجود دارد به روشنی مشخص نشده است. در مطالعه Hendin و همکاران، سطح ROS و ظرفیت آنتی اکسیدان ها در مردان نابارور دارای واریکوسل اختلاف معنی داری را در مقایسه با مردان بارور واریکوسلی نشان داد. با این وجود، آن ها اختلاف معنی داری را بین مردان دارای واریکوسل جزئی و مردان نابارور واریکوسلی نیافتد، (16). مطالعه Smith و همکاران اختلاف معنی داری را بین سطح ROS در اسپرماتوزوآی مردان واریکوسل با پارامترهای اسپرمی نرمال و غیر نرمال مطابق با قانون WHO، نشان داد، (17). با توجه به نتایج ضد و نقیض در مورد ارتباط استرس اکسیداتیو با واریکوسل و ناباروری، در این تحقیق دو بیومارکر مهم در بررسی وضعیت اکسیداتیوی بین دو گروه از مردان نابارور واریکوسلی و مردان سالم بارور مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجا که یکی از اثرات بیماری واریکوسل آسیب، فرآیند اسپرماتوزن و طی آن تولید اسپرم های غیرطبیعی می باشد، انتظار می رود که افزایش تعداد اسپرم های غیرطبیعی در سمن مردان واریکوسل با افزایش سطح رادیکال های آزاد سبب تشدید اثرات اکسیداتیوی گردد. به همین منظور در تحقیق کنونی سطح TAC و MDA به عنوان یک ابزار کلینیکی مناسب برای تخمین پراکسیداسیون لیپید غشای اسپرم، جهت تعیین شدت اکسیداتیوی مایع سمینال مردان واریکوسل مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

جمع آوری نمونه ها: مطالعه حاضر از نوع مورد-شاهدی با روش نمونه گیری تصادفی، شامل 29 نمونه سمن (semen) از مردان بارور نرمواسپرمیک (n=15) به عنوان گروه شاهد و مردان واریکوسل (n=14) به عنوان گروه مورد در مراکز IVF شهرستان



گرم به مدت 10 دقیقه در دمای 37 درجه حرارت داده شدند و بعد از خارج نمودن لوله ها از حمام آب گرم، جذب نمونه ها در طول موج 593 نانومتر اندازه گیری گردید. غلظت نمونه ها به کمک برنامه Excel بر اساس نمودار استاندارد، محاسبه شد.

اندازه گیری غلظت مالون دی آلدئید با روش TBA. غلظت MDA با استفاده از متده تیوباریتوريک اسید شرح داده شده توسط رائو و همکاران اندازه گیری گردید،(20). بر اساس این روش ابتدا نمونه های سمن در g 2000 به مدت 5 دقیقه سانتریفیوز شدند. سپس 100 میکرولیتر از مایع رویی(پلاسمای سمینال) به همراه 900 میکرولیتر آب مقطر در لوله آزمایشگاه TBA ریخته شد و به هر لوله 500 میکرولیتر معرف 0/67 thiobarbituric acid در 100 میلی لیتر NaOH 0/5 گرم آب مقطر حل شد و سپس به ترتیب 0/5 گرم 100 میلی لیتر اسید استیک گلاسیال به آرامی بدان افزوده شد) اضافه گردید و سر لوله ها توسط ورقه های آلومنیومی کاملا پوشانده شدند و به مدت یک ساعت در حمام آب جوش قرار گرفتند و پس از خنک شدن در 10 دقیقه سانتریفیوز شدند. در نهایت جذب محلول رویی در طول موج 534 نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر(UV1600) خوانده شد. غلظت MDA با استفاده از ضریب خاموشی 1/56 × 105 mol⁻¹ cm⁻¹ (بر اساس قانون nmol/ml: A=edc) محاسبه و به صورت گزارش گردید.

آنالیز آماری: کلیه آزمون های آماری با برنامه SPSS independent t-test و نرم افزار ۱۶ انجام شد. میانگین سطح MDA و TAC در دو گروه مورد مطالعه به صورت mean±S.D با Spearman correlation آماری معنی دار بود. بررسی همبستگی بین سطح MDA و TAC با استفاده از آنالیز

یافته های پژوهش


نتیجه حاصل از آنالیز کیفیت پارامترهای اسپرمی در بین مردان بارور و واریکوسل در جدول 1 نشان داده شده است. هیچ تفاوت معنی داری بین سن و حجم سمن بین دو گروه مشاهده نشد(به ترتیب، با 123 p=0/357 و p=0/357) و غلظت اسپرم در مردان بارور به طور معنی داری(p<0/001) بیشتر از مردان واریکوسل بود. درصد اسپرم های متحرک و درصد اسپرم هایی با مورفوЛОژی طبیعی نیز در مردان بارور به طور معنی داری(p<0/001) بیشتر از مردان واریکوسل بود.(جدول 1)

مقایسه سطح TAC و MDA در مایع سمینال مردان بارور نرم اسپرمیک و واریکوسل در جدول 1 نشان داده شده است. نتیجه حاصل از تحقیق ما نشان داد که سطح TAC در مایع سمینال مردان بارور سالم به طور معنی داری بیشتر از مردان واریکوسل است(p<0/001)، از طرفی غلظت MDA در مایع سمینال مردان واریکوسل به طور چشمگیری(p<0/01) بیشتر از مردان بارور بود،(نمودار 1). از طرفی سطح TAC پلاسمای سمینال دارای همبستگی معکوسی با غلظت MDA بود اما این همبستگی از نظر آماری معنی دار نبود (p=0/07; r=-0/47) (نمودار 2).




جدول 1. مقایسه کیفیت پارامترهای اسپرمی بین مردان بارور و واریکوسل

p- value	مردان واریکوسل 14	مردان سالم 15	پارامترهای اسperm
			تعداد نمونه
0/123	28/92 ± 4/34	31/6 ± 4/67	سن افراد (سال)
0/357	3/73 ± 1/83	4/26 ± 1/16	حجم سمن (میلی لیتر)
<0/001	50/14 ± 24/85	91/33 ± 11/25	غلظت اسperm (1 × 10 ⁶ /ml)
<0/001	187/02 ± 45/47	389/06 ± 130/51	تعداد کل اسperm (× 10 ⁶)
<0/05	47/14 ± 17/61	61/33 ± 8/75	درصد اسperm های متحرک
<0/001	4/42 ± 3/2	15/6 ± 4/42	درصد مورفولوژی طبیعی اسperm (بر اساس قانون کروگر)
<0/001	1081/35 ± 353/7	233/49 ± 764/78	غلظت TAC (میکرومول بر لیتر)
<0/01	0/92 ± 0/27	0/57 ± 0/22	غلظت MDA (نانومول بر میلی لیتر)



نمودار 1. مقایسه سطح MDA (چپ) و TAC (راست) بین مردان سالم نرمواسپرمیک و واریکوسل (به ترتیب $p<0/001$ و $p<0/01$).





نمودار 2. ارتباط بین سطح TAC و MDA: همبستگی در $p=0/01$ معنی دار است.

اکسیداسیون در مردان واریکوسل به طور معنی داری بیشتر از مردان بارور است ($p<0/01$). نتاج ما همچنین یک رابطه معکوس را بین ظرفیت آنتی اکسیدان های تام و شدت اکسیداسیون لیپید نشان داد (نمودار 2). مطالعات دیگری نیز ثابت کردند که بیماران واریکوسل به طور معنی داری غلظت مالون دی آلدئید بیشتری را نسبت به مردان نابارور بدون واریکوسل دارند، (29-30). در یک تحقیق سطح بالای ROS و کاهش ظرفیت آنتی اکسیدان ها در 21 بیمار نابارور دارای واریکوسل در مقایسه با 17 بیمار بارور به عنوان کنترل مشاهده شد، با این وجود یک گروه 15 نفره دارای واریکوسل جزئی، سطح یکسانی از ROS را نسبت به مردان نابارور واریکوسلی داشتند و مقدار آنتی اکسیدان تام در مقایسه با افراد بارور بدون واریکوسل Smith به طور معنی داری پایین تر بود، (16). همچنین و همکاران با مقایسه 55 بیمار دارای واریکوسل که به دو گروه نرمال و غیر نرمال مطابق با قانون WHO دسته بندی شده بودند و 25 مرد نرموماوسپرمیک ثابت کردند که اسپرماتوزوآی بیماران دارای واریکوسل به طور معنی داری میزان ROS بالاتری را حتی در گروه بیماران دارای پارامتر های استاندارد دارند، (17). که قابل مقایسه با نتایج تحقیقات قبلی بود، (31,24). این که چه مکانیسم یا مکانیسم هایی در ارتباط با واریکوسل و ناباروری وجود دارد همچنان به صورت عمومی باقی مانده است. مطالعات متعددی رابطه معنی داری بین واریکوسل و کیفیت پایین پارامترهای اسپرم نشان دادند. محققین بسیاری بهبود تمام پارامترهای اسپرمی را بعد از جراحی واریکوسل مشاهده کردند (32-34). در کنار این تحقیقات، مطالعات دیگری

بحث و نتیجه گیری

علی رغم مطالعات فراوان در زمینه نقش واریکوسل و ناباروری مردان، اثرات منفی آن بر ناباروری تاکنون به روشنی مشخص نشده و مکانیسم دقیق اثر آن بر عملکرد اسپرم همچنان بحث برانگیز و نگران کننده است. مطالعات بسیاری نشان داد که افزایش سطح اکسیداتیوی مایع سeminال از طریق مکانیسم های مختلف از جمله پراکسیداسیون لیپیدهای غشای اسپرم، آسیب در متابولیسم اسپرم و توانایی بارورسازی آن، سهم عمده ای در نقص عملکرد اسپرم دارد، (21). لذا آنتی اکسیدان های پلاسمای سeminال به عنوان مهمترین سد دفاعی اسپرم ها محسوب می شوند که با به دام انداختن رادیکال های آزاد، از اثرات پاتولوژیکی و آسیب های بعدی اسپرم جلوگیری می کنند، (22-23). تاکنون محققان بسیاری پیشنهاد دادند استرس اکسیداتیو می تواند نقش مهمی را در نقص عملکرد اسپرم در میان بیمارانی که از واریکوسل رنج می برند بازی کند، (2)، (24-28)، (16). در این مطالعه فعالیت آنتی اکسیدان های تام و همچنین سطح مالون دی آلدئید به عنوان یک نشانگر مناسب جهت تخمین شدت اکسیداتیو در مایع سeminال مردان بارور سالم و بیماران واریکوسل اندازه گیری گردید، (جدول 1). بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق میانگین سطح پلاسمای سeminال آنتی اکسیدان های تام در مردان سالم تا حدود قابل ملاحظه ای بیشتر از مردان واریکوسل بود ($p<0/001$). از طرفی اندازه گیری سطح MDA حاکی از آن بود که شدت

توانایی آنتی اکسیدان های مایع سمینال در احیاء یون فریک به یون فرو است،(19). اما این روش تنها برای اندازه گیری آنتی اکسیدان هایی با وزن مولکولی پایین مناسب است و برای اندازه گیری آنتی اکسیدان های آنزیمی و پروتئین های متصل به آنزیم چندان مناسب نیست. روش Enhanced chemiluminescence و کالریومتریک روش های دقیق تر و با ارزش تری برای اندازه گیری آنتی اکسیدان های تام می باشد،(36). با توجه به اینکه در مطالعه حاضر میزان MDA پلاسمای سمینال با روش اسپکتروفوتومتری بررسی گردید، برای دستیابی به نتایج دقیق تر روش هایی نظیر HPLC توصیه می شود. از دیگر محدودیت های مطالعه ما تعداد کم نمونه های واریکوسل بود به طوری که بررسی پارامتر های مختلف استرس اکسیداتیو در چهار گروه از بیماران واریکوسل بارور - نابارور و مردان بارور - نابارور بدون عارضه واریکوسل پیشنهاد می گردد. به طور خلاصه، طبق تحقیقات صورت گرفته و تحقیق حاضر، این احتمال وجود دارد که یکی از مکانیسم های احتمالی اثر واریکوسل بر روی عملکرد اسپرم، از طریق کاهش سطح آنتی اکسیدان های مایع سمینال و افزایش محصولات آلدئیدی پایدار پراکسیداسیون لبید از قبیل مالون دی آلدئید واسطه گردد که این نتایج نیازمند تحقیقات بیشتر و گسترده تر است.

References

- ۱-Enciso M, Muriel L, Fernandez JL, Goyanes V, Segrelles E, Marcos M et al. Infertile men with varicocele show a high relative proportion of sperm cells with intense nuclear damage level, evidenced by the Sperm Chromatin Dispersion Test. *J. Androl* ۲۰۰۶; ۲۷: ۱۰۶-۱۱.
- ۲-Chen SS, Chang LS, Chen HW, Wei YH. Polymorphisms of glutathione S-transferase M1 and male infertility in Taiwanese patients with varicocele. *Hum. Reprod* ۲۰۰۲; 17: ۷۱۸-۲۵.
- ۳-Nagler HM, Luntz RK, Martinis FG. Varicocele In: infertility in the male. Lipshultz LI and Howards SS, St. Louis (editors): *Mosby Year Book*; ۱۹۹۷.p.۳۲۶-۵۹.
- ۴-Rajeev K, Rupin S.Varicocele and male infertility: Current status. *J Obstet Gynecol India* ۲۰۰۵; ۵۵: ۵۰۵-۱۶.
- ۵-Naughton CK, Nangia AK, Agarwal A. Varicocele and male infertility: Part II. Pathophysiology of varicoceles in male infertility. *Hum. Reprod* ۲۰۰۱; 17: ۴۷۳-۸۱.
- ۶-Greenberg SH. Varicocele and male infertility. *Fertile Steril* ۱۹۷۷; ۲۸: ۶۹۹-۷۰۶.
- ۷-Marmar JL. The pathophysiology of varicoceles in the light of current molecular and genetic information. *Hum. Reprod* ۲۰۰۱; 17: ۴۶۱-۷۲.

نیز وجود دارند که هیچ ارتباط معنی داری را بین پارامترهای اسپرمی و بیماری واریکوسل نیافتد،(35). نتایج تحقیقات صالح و همکاران به یک کاهش معنی دار در غلظت و شکل نرمال اسپرم بین مردان نابارور دارای واریکوسل در مقایسه با مردان بارور و نابارور اشاره می کند. مطالعات آن ها همچنین نشان داد درصد تحرکت اسپرم در بیماران واریکوسلی به طور معنی داری پایین تر از مردان بارور است،(31). بر اساس آنالیز پارامترهای اسپرمی حاصل از نتایج ما درصد اسپرم های متحرک در مردان واریکوسل به طور چشمگیری کمتر از مردان بارور بود،($p<0/05$). همچنین غلظت اسپرم و درصد اسپرم هایی با مورفولوژی طبیعی در مردان واریکوسل به طور معنی داری کمتر از مردان بارور بود،($p<0/001$). (جدول ۱). مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج دیگر تحقیقات نشان می دهد که واریکوسل می تواند به نحوی با کاهش کیفیت اسپرم در ارتباط باشد. به علاوه، شاید یکی از فاکتور های موثر در عارضه واریکوسل و کیفیت پایین پارامترهای اسپرمی پراکسیداسیون لبیدی غشای اسپرم یا تولید محصولات آلدھیدی سیتو توکسیک ناشی از آن از جمله مالون دی آلدئید باشد. در تحقیق کنونی فعالیت آنتی اکسیدان های تام مایع سمینال به Ferric Reducing Ability of (FRAP) روش FRAP (Plasma FRAP) اندازه گیری شد. روش (Ferric Reducing Ability of Plasma)



- ۱-Zini A, de Lamirande E, Gagnon C. Reactive oxygen species in semen of infertile patients: levels of superoxide dismutase and catalase-like activities in seminal plasma and spermatozoa. *Int J Androl* ۱۹۹۳; ۱۶: ۱۸۳-۸.
- ۲-Agarwal A, Prabakaran SA. Mechanism, measurement and prevention of oxidative stress in male reproductive physiology. *Experimental Biology* ۲۰۰۰; ۴۳: ۹۶۲-۷۴.
- ۳-Sharma RK, Agarwal A. Role of reactive oxygen species in male infertility. *Urology* ۱۹۹۶; ۴۸: ۸۳۰-۰.
- ۴-Schlesinger MH, Wilets IF, Naglar HM. Treatment outcome after varicocelectomy; a critical analysis. *Urol Clin North Am* ۱۹۹۴; ۲۱: ۵۱۷-۲۹.
- ۵-Aitken RJ, Clarkson JS, Fishel S. Generation of reactive oxygen species, lipid peroxidation and human sperm function. *Biol Reprod* ۱۹۸۹; 40: ۱۸۳-۹۷.
- ۶-Aitken RJ, Clarkson JS. Cellular basis of defective sperm function and its association with the genesis of reactive oxygen species by human spermatozoa. *The Walpole Lecture J. Reprod. Fertil* ۱۹۸۷; ۸۳: ۴۰۹-۷۹.
- ۷-Niedernhofer LJ, Daniels JS, Rouzer CA, Greene RE, Marnett LJ. Malondialdehyde, a product of lipid peroxidation, is mutagenic in Human cells. *The American Society for Biochemistry and Molecular Biology Inc* ۲۰۰۳; ۱-۴۱.
- ۸-Elsayed NM, Bendich A. Dietary antioxidants: potential effects on oxidative products in cigarette smoke. *Elsevier Science Inc* ۲۰۰۱; ۲۱: ۵۰۱-۶۷.
- ۹-Hendin B, Kolettis P, Sharma RK, Thomas AJ, Agarwal A. Varicocele is associated with elevated spermatozoal reactive oxygen species production and diminished seminal plasma antioxidant capacity. *J Urol* ۱۹۹۹; ۱۶1: ۱۸۳۱-۶.
- ۱۰-Smith R, Kaune H, Parodi D, Madariaga M, Rios R, Morales I et al. Increased sperm DNA damage in patients with varicocele: relationship with seminal oxidative stress. *J. Hum. Reprod* ۲۰۰۶; ۲۱: ۹۸۶-۹۳.
- ۱۱-World Health Organization (WHO). Laboratory manual for the examination of human semen and semen-cervical mucus interaction, ۴th ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press; ۱۹۹۹.p. ۴-۲۴.
- ۱۲-Benzie IFF. Lipid peroxidation: a review of causes, consequences, measurements and dietary influences. *Int. J Food Sc. Nutr* ۱۹۹۶; ۴۷: ۲۳۳-۲۶۲.
- ۱۳-Rao B, Souflir JC, Martin M, David G. Lipid peroxidation in human spermatozoa as related to midpiece abnormalities and motility. *Gamete Res* ۱۹۸۹; ۲۴: ۱۲۷-۳۴.
- ۱۴-Armstrong JS, Rajasekaran M, Chamulitrat W, Gatti P, Hellstrom WJ, Sikka SC. Characterization of reactive oxygen species induced effects on human spermatozoa movement and energy metabolism. *Free. Rad. Biol. Med* ۱۹۹۹; ۲۶: ۸۶۹-۸۰.
- ۱۵-Sharma RK, Pasqualotto FF, Nelson DR, Thomas AJ, Agarwal A. The reactive oxygen species-total antioxidant capacity score is a new measure of oxidative stress to predict male infertility. *Hum. Reprod* ۱۹۹۹; 14: ۲۸۰۱-۷.
- ۱۶-Smith R, Vantman D, Ponce J, Escobar J, Lissi E. Total antioxidant capacity of human seminal plasma. *Hum. Reprod* ۱۹۹۶; 11: ۱۶۰۰-۶۰.
- ۱۷-Barbieri ER, Hidalgo ME, Venegas A, Smith R, Lissi EA. Varicocele associated decrease in antioxidant defenses. *J Androl* ۱۹۹۹; 20: ۷۱۲-۱۷.
- ۱۸-Chen SS, Chang LS, Wei YH. Oxidative damage proteins anddecrease of antioxidant capacity in patients with varicocele. *Free Rad Biol Med* ۲۰۰۱; 30: ۱۳۲۸-۳۴.
- ۱۹-Romeo C, Lentile R, Impellizzeri P, Turiaco N, Teletta M, Antonuccio P et al. Preliminary report on nitric oxide-mediated oxidative damage in adolescent varicocele. *Hum Reprod* ۲۰۰۳; 18: ۲۶-۲۹.
- ۲۰-Mehraban D, Ansari M, Keyhan H, Gilani MS, Naderi G, Esfehani F. Comparison of nitric oxide concentration in seminal fluid between infertile patients with and without varicocele and normal fertile men. *Urol* ۲۰۰۰; 10: ۱۰-۱۰.(persian)
- ۲۱-Agarwal A. Relationship between oxidative stress, varicocele and infertility. *Reproductive BioMedicine Online* ۲۰۰۶; 12: ۶۲۰-۲.
- ۲۲-Mostafa T, Anis TH, EL-Nashar A, Imam H, Othman IA. Varicocelectomy reduces reactive oxygen species levels and increases antioxidant activity of seminal plasma from infertile men with varicocele. *Int. J Androl* ۲۰۰۱; 24: ۲۶۱-۰.

- ۳۰-Koksal IT, Tefekli A, Usta M, Erol H, Abbasoglu S, Kadioglu A. The role of reactive oxygen species in testicular dysfunction associated with varicocele. *Brit. J Urol* 2000; 86: 549-52.
- ۳۱-Saleh RA, Agarwal A, Sharma RK, Said TM, Sikka SC, Thomas AJ Jr. Evaluation of nuclear DNA damage in spermatozoa from infertile men with varicocele. *Fertil Steril* 2003; 80: 1431-6.
- ۳۲-Schlesinger MH, Wilets IF, Nagler HM. Treatment outcome after varicocelectomy: a critical analysis. *Urol Clin North Am* 1994; 21: 517-29.
- ۳۳-Kim ED, Leibman BB, Grinblat DM, Lipshultz LI. Varicocele repair improves semen parameters in azoospermic men with spermatogenic failure. *J Urol* 1999; 162: 737-40.
- ۳۴-Parikh FR, Kamat SA, Kodwaney GG, Balaiah D. Computer-assisted semen analysis parameters in men with varicocele: is surgery helpful? *Fertil Steril* 1996; 66: 440-9.
- ۳۵-Nieschlag E, Hertle L, Fischbeck A, Abshagen K, Behre HM. Update on treatment of varicocele: counselling as effective as occlusion of the vena spermatica. *Hum. Reprod* 1998; 13: 2147-50.
- ۳۶-Said TM, Kattal N, Sharma R, Sikka SC, Thomas AJ, Mascha E et al. Enhanced Chemiluminescence assay vs colorimetric assay for measurement of the total antioxidant capacity of human seminal plasma. *J Androl* 2003; 24: 676-80.



Total Antioxidant Capacity and Malondialdehyde Levels in Seminal Plasma Among The Varicocele-Suffering Men

Hosseinzadeh Colagar A^{1*}, Bidmeshkipour A², Gholinezhad Chari M¹

(Received: 26 Jul, 2008)

Accepted: 25 May, 2009

Abstract

Introduction: Varicocele is the most common cause of male infertility with approximately 19 to 40% prevalence that leads to low sperm production and fertilization through several mechanisms. In this case-control study, seminal total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA) were investigated as one of the possible mechanism(s) by which varicocele may affect the sperm parameters quality and male infertility.

Materials & Methods: Semen samples were provided from healthy (normalospermic; n=15) and varicocele-suffering (infertile; n=14) men at babol IVF centers, then analyzed according to WHO (World Health Organization/1998) standards. Seminal TAC and MDA levels in

all the specimen were measured by FRAP and TBA methods, respectively.

Findings: Based on the results, mean concentration (\pm S.D) of TAC in the seminal plasma of varicocele-suffering men (1.92, 43.0370.56 μ mol/l) was significantly lower ($p<0.001$) than that of the healthy men (2.33, 5.44.074.78 μ mol/l). Moreover, MDA levels in seminal plasma of varicocele-suffering cases (0.970.27 nmol/ml) was significantly ($p=0.001$) higher than that of the healthy ones (0.580.22 nmol/ml).

Discussion & Conclusion: It implies that low level of seminal TAC activity and subsequently high oxidative status could be regarded as one of the negative effects of

varicocele on sperm quality and the function which initiates further studies.

Key words: Varicocele, Male infertility, Malondialdehyde, Total antioxidant capacity

1. Dept of Biology, Faculty of Basic Sciences, Nano & Biotechnology Dept, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

2. Dept of Biology, Faculty of Basic Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

*(corresponding author)

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

