

اثر ۸ هفته تمرین هوایی بر شاخص‌های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالم‌مند چاق

غفور غفاری^{*}، لطفعلی بلبلی^۱، علی رجبی^۲، صابر ساعدموچشی^۳

- (۱) گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
- (۲) گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
- (۳) گروه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۵/۲۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۶/۳۱

چکیده

مقدمه: بیماری‌های قلبی-عروقی به ویژه آترواسکلروز از علل اصلی ناتوانی و مرگ و میر در سطح جهان هستند که شیوع آن‌ها در ایران نیز رو به افزایش می‌باشد. هموسیستئین و فیبرینوژن دو ریسک فاکتور جدید پیشگوی خطر آترواسکلروز می‌باشند. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، اثر ۸ هفته تمرین هوایی بر شاخص‌های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالم‌مند چاق بود.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه نیمه تجربی ۴۴ زن چاق ($BMI \geq 30$) تا ۶۵ سال ($BMI = 30 \pm 3 / 5578$) به صورت داوطلب، انتخاب و به طور تصادفی در ۲۰ گروه تجربی (۲۲ نفر) و کنترل (۲۲ نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوایی با شدت ۴۵ تا ۶۵ درصد ضربان قلب بیشینه به مدت ۸ هفته، هر جلسه ۱ ساعت و ۳ جلسه در هفته بود. خونگیری پس از ۱۲ ساعت ناشتاپی در مراحل پیش آزمون و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین جهت سنجش هموسیستئین، فیبرینوژن، پروتئین واکنش پذیر-C (CRP) و نیمرخ لیپیدی اخذ شد.

یافته‌های پژوهش: نتایج آزمون آماری نشان داد که پس از ۸ هفته در مقادیر هموسیستئین ($P=0.004$), hs-CRP ($P=0.017$)، تری گلیسرید ($P=0.009$), کلسترول ($P=0.037$) و LDL-C ($P=0.047$) گروه تجربی کاهش معنی داری دیده شد. در حالی که در گروه کنترل تفاوت معنی داری در هیچ کدام از متغیرهای تحقیق مشاهده نشد. به علاوه در مقایسه بین گروه‌های کنترل و تجربی در متغیرهای هموسیستئین ($P=0.000$), hs-CRP ($P=0.037$), تری گلیسرید ($P=0.000$), کلسترول ($P=0.012$) و LDL-C ($P=0.049$) تفاوت معنی داری مشاهده گردید. در بررسی رابطه بین این عوامل رابطه معنی داری بین تغییرات درصد چربی بدن ($r=0.87$) و تغییرات شاخص توده بدن ($r=0.68$) با تغییرات هموسیستئین مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری: به طور خلاصه نتایج تحقیق نشان داد که ۸ هفته تمرین هوایی می‌تواند با کاهش وزن و درصد چربی بدن، هموسیستئین، CRP و هم‌چنین افزایش HDL، باعث کاهش عوامل خطرزای قلبی-عروقی و بهبود سطح سلامت در زنان سالم‌مند شود.

واژه‌های کلیدی: شاخص‌های التهابی، زنان سالم‌مند، پیشگوی آترواسکلروز

*نویسنده مسئول: گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

Email: Ghafour.ghafari@yahoo.com

مقدمه

لیپیدی نیز ممکن است با گسترش و پیشرفت آتروواسکلروز مرتبط باشد که این عوامل خطرزای جدیدتر بیماری عروق کرونر قلب یا آتروواسکلروز می‌نمایند(۲،۵). هموسیستئین یک اسید آمینه حاوی سولفور است که در جریان متابولیسم متیونین به وجود می‌آید و میزان مطلوب آن در بزرگسالان ۵ تا ۱۵ و در سالمندان بالای ۶۰ سال ۵ تا ۲۰ میکرومول در لیتر می‌باشد(۲). مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد افزایش غلظت هموسیستئین به صورت مستقیم با خطر بیماری‌های قلبی و عروقی ارتباط دارد و کاهش غلظت آن باعث بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش حملات قلبی می‌شود(۶). فیرینوژن یکی دیگر از عوامل خطرزای CRP پیشگوی آتروواسکلروز است. این مولکول همانند IL-6 تحت تاثیر القای توسط سلول‌های کبدی سنتز می‌شود. نیمه عمر این فاکتور التهابی سه تا پنج روز است و در تجمع پلاکت‌ها، آسیب آندوتیلوم، فرآیندهای انعقادی، ویسکوزیته خون و تجمع سلول‌های قرمز خون نقش عده ای را ایفا می‌کند(۷).

در سال‌های اخیر ارتباط میان التهاب و آتروواسکلروزیس طی تحقیقات بسیاری اعلام شده است(۵) و بر اساس اغلب گزارش‌ها گسترش بیماری‌های قلبی عروقی زمینه ای التهابی دارد و التهاب عمومی، نقش محوری در توسعه و پیشرفت آتروواسکلروز، بیماری قلبی، دیابت، و سرطان ایفا می‌کند(۸). لذا با توجه به ارتباط قویی که بین شاخص‌های التهابی و شیوع انواع بیماری‌ها به خصوص بیماری‌های قلبی-عروقی دیده شده، به نظر می‌رسد هر عاملی که باعث کاهش شاخص‌های التهابی شود، می‌تواند احتمال حوادث قلبی-عروقی را کاهش دهد(۹). این در حالی است که امروزه آثار مثبت تمرین و فعالیت بدنی برای پیشگیری اولیه و ثانویه بیماری‌های قلبی-عروقی به درستی ثابت شده است(۱۰). بنا بر این فعالیت بدنی احتمالاً از طریق کاهش شاخص‌های التهابی، انعقادی، چربی بدن و چاقی می‌تواند باعث کاهش عوامل خطرزای قلبی-عروقی افراد و در نتیجه کاهش مرگ و میر در این افراد گردد(۱۱). در مطالعه‌ای در این زمینه موریکاوا و همکاران(۲۰۱۱) ارتباط

جمعیت سالمندان جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. چگونگی تامین و حفظ تندرستی افراد سالمند یکی از مشکلات اساسی که جامعه جهانی را نگران کرده است. از جمله مشکلات دوران سالمندی، بیماری‌های قلبی و عروقی و در راس آن‌ها مشکلات عروق کرونر حائز اهمیت‌اند. مهمن ترین علت بیماری‌های عروق کرونری آتروواسکلروز است(۱). آتروواسکلروز بیماری پیشرونده‌هایی است که از دوران کودکی آغاز شده و تظاهرات بالینی خود را به طور عمده در بالغین، از میانسالی به بعد آشکار می‌کند. این بیماری با تجمع غیر طبیعی لیپید در جدار رگ مشخص شده و باعث انسداد، تنگی رگ و کاهش جریان خون به عضله میوکارد قلب می‌شود(۱). بنا بر این با توجه به اهمیت بیماری‌های قلبی-عروقی در میان بیماری‌های مزمن، پیش‌بینی این بیماری‌ها در درمان و پیشگیری از پیشرفت آن اهمیت فراوانی دارد که این امر به شناخت عوامل موثر در پیدایش این عارضه وابسته است(۲). از دیر باز، نیمرخ لیپید به عنوان ابزار استاندارد شناسایی افرادی که در معرض خطر حوادث قلبی-عروقی می‌باشند استفاده می‌شد، هر چند در حال حاضر در جامعه ما از این شاخص‌ها برای هدف‌های تشخیصی نیز استفاده می‌شود(۳). نتایج حاصله از مطالعه ۸ ساله روی ۲۷۹۳۹ زن سالم با میانگین ۵۴/۷ سال نشان داد که تقریباً نیمی از حوادث قلبی-عروقی در این مدت، در زنانی رخ داده است که مقدار LDL-C آن‌ها کمتر از ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر بوده است این موضوع نشان می‌دهد که برای شناسایی افراد در معرض خطر باید در جستجوی شاخص‌های دیگری بود(۳). انجمن قلب آمریکا عوامل خطرزای عده آتروواسکلروز را در دو گرووه معرفی کرده است: ۱-درمان پذیر با دارو و یا تعییر شیوه زندگی(نظیر چاقی، دیابت، عدم فعالیت بدنی، پرفشاری خون و اختلالات لیپیدی)، و ۲-درمان ناپذیر(نظیر افزایش سن، وراثت و جنسیت)(۴). یافته‌های مطالعات پژوهشی نشان می‌دهد برخی عوامل نظیر افزایش غلظت هموسیستئین و فیرینوژن سرم و عوامل دیگری هم چون افزایش سایتوکاین‌های پیش التهابی و نیمرخ

پس آزمون، از نوع کاربردی بود. آزمودنی‌های این تحقیق ۴۴ نفر از زنان غیر فعال ۵۵-۶۵ ساله عضو خانه سالمدان شهر ارومیه بودند که در طی دو سال قبل سابقه هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی نداشتند. این افراد به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. در جلسه‌ای با حضور مدیریت، پزشک و پرستاران مرکز سالمدان و نیز همه آزمودنی‌ها، اهداف و روش اجرای تحقیق تشریح و به همه افراد دعوت نامه‌ای شامل هدف و چگونگی اجرای پژوهش، فرم رضایت نامه و شرکت داوطلبانه، پرسش نامه سلامت و ریسک بیماری داده شد. زنان شرکت کننده فاقد هر گونه علائم ظاهری و بالینی بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت و پرفشار خونی بودند و سابقه مصرف هیچ گونه داروی خاص، مکمل غذایی و دارویی نداشتند. آزمودنی‌ها در قالب طرح نیمه تجربی به صورت تصادفی در ۲ گروه تمرین هوایی (۲۲ نفر) و گروه کنترل (۲۲ نفر) قرار گرفتند. پیش از شروع تمرینات اندازه گیری قد با استفاده از قدسنچ، وزن با ترازوی دیجیتال مدل سکا (ساخت کشور آلمان)، شاخص توده بدن آزمودنی‌ها با استفاده از وزن آزمودنی‌ها تقسیم بر مجدد (قد/متر)، درصد چربی با استفاده از دستگاه Body composition analyzer مدل TNITA ساخت کشور ژاپن و حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از دستگاه GANSHORN مدل Gas analyzer ساخت GANSHORN دستگاه گرفت. برنامه تمرین هوایی به مدت ۸ هفته به صورت سه جلسه در هفته با شدتی بین ۴۵ تا ۶۵ درصد ضربان قلب بیشینه آزمودنی‌ها بود. در سه هفته اول آزمودنی‌ها با ۴۵ درصد حداکثر ضربان قلب فعالیت کردند، در هفته چهارم و پنجم با ۵۵ درصد حداکثر ضربان قلب فعالیت نمودند و در هفته ششم تا هشتم با ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب فعالیت نمودند. ۴۵ درصد، ۵۵ درصد و ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب متعلق به بخش تمرینات اصلی تمرین بود و ضربان قلب برای گرم کردن و پیاده روی پایین تر از این شدت‌ها و به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد حداکثر ضربان قلب آزمودنی بود. هر جلسه تمرین شامل ۵ دقیقه برنامه حرکات کششی، ۱۰ تا ۱۵ دقیقه برنامه گرم کردن پویا، ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تمرینات اصلی شامل پیاده

آمادگی جسمانی و شیوه زندگی با بیماری‌های کرونری را در مردان و زنان میانسال ژاپنی بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که تمرینات هوایی به صورت دویلن آرام و پیاده روی باعث کاهش مقدار چشمگیری از چربی‌های سرمه خون، درصد چربی بدن و چاقی و در نتیجه بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش آترواسکلروز در این افراد می‌شود(۱۲). در تحقیق دیگری در زمینه تاثیر فعالیت هوایی بر هموسیستین سرمه، اکورا و همکاران (۲۰۰۶) طی یک تحقیق دوسویه کور؛ ۱۴ هفته مداخله کاهش وزن را روی ۴۸ مرد ژاپنی چاق انجام دادند. افراد به دو گروه رژیم و رژیم+تمرین ورزشی تقسیم شدند. تمرین ورزشی شامل راه رفتن و دوی نرم به مدت ۴۰ جلسه(۳) روز در هفته) بود. نتایج نشان داد که وزن بدن به طور معناداری برای هر دو گروه کاهش یافت. اما هموسیستین سرمه تنها در گروه رژیم+تمرین ورزشی به طور معنی داری کاهش یافت؛ بنا بر این افزودن تمرینات ورزشی هوایی به برنامه رژیم غذایی کاهش وزن ممکن است در کاهش هموسیستین تاثیرگذار باشد(۶). جدیدترین مقالات نیز اشاره دارند که هنوز هیچ روش درمانی مؤثری در جلوگیری و یا کاهش علائم التهاب معرفی نشده است و این امر می‌تواند به علت عدم درک صحیح از این عارضه باشد(۱۰، ۱۳). هم چنین با توجه به این که فیبرینوژن و هموسیستین دو فاکتور التهابی اصلی برای ارزیابی مشکلات عروق کرونری هستند و غلظت آن‌ها در خون تحت تاثیر مستقیم پروفایل چربی قرار می‌گیرد(۷، ۲۶)؛ بنا بر این تعیین فعالیت ورزشی استقامتی با شدت و مدت مشخص، برای ارائه الگویی مناسب به افراد سالم‌نمایانه می‌تواند در جهت کاهش شاخص‌های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و در نتیجه ارتقای سلامت آن‌ها و کاهش بسیاری از مضلالات اجتماعی حائز اهمیت باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ۸ هفته تمرین هوایی بر غلظت‌های هموسیستین، فیبرینوژن و CRP سرمه و هم‌چنین نیمرخ لیپیدی در زنان سالم‌نمایانه چاق طراحی و اجرا شد.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی پیش آزمون-

کیت Diagnostic Biochem ساخت کشور کانادا با حساسیت بالا (Intraassay CV%: 5.4, Sensitivity: 10 ng/ml) گرفته شد. کلسترول تام با روش آنریمی با استفاده از کلسترول استراز و کلسترول اکسیداز اندازه گیری گردید. HDL-C، LDL-TG و C به روش مستقیم با استفاده از کیت‌های تجاری شرکت پارس آزمون ایران اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا از آزمون شاپریووایلک برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. پس از مشخص شدن نرمال بودن توزیع کلیه داده‌ها، از آزمون t همبسته برای مقایسه نتایج درون گروهی و از آزمون t مستقل برای بررسی نتایج بین گروهی استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون نیز برای تعیین ارتباط بین متغیرهای تن سنجی شامل وزن، درصد چربی بدن و شاخص توده بدن(BMI) با هموسیستئین و فیبرینوژن استفاده شد. سطح معناداری نیز در سطح خطای آلفای ۵ درصد($P < 0.05$) در نظر گرفته شد.

یافته‌های پژوهش

نتایج آزمون شاپریووایلک نشان داد که دو گروه در مرحله پیش آزمون و ابتدای پژوهش در هیچ یک از متغیرهای تن سنجی، سن($P=0.145$), قد($P=0.884$), وزن($P=0.449$), درصد چربی بدن($P=0.633$)، شاخص توده بدن($P=0.211$) و اکسیژن مصرفی بیشینه($P=0.282$) با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند(جدول شماره ۱). هم‌چنین نتایج آزمون آماری t همبسته نشان داد که از میان متغیرهای تن سنجی در گروه تجربی تنها وزن($P=0.037$), درصد چربی بدن($P=0.012$) و شاخص توده بدن($P=0.044$) در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری کاهش یافتند. این در حالی بود که در گروه کنترل یک افزایش خفیفی در این متغیرها در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون دیده شد اما این افزایش به لحاظ آماری به سطح معنی داری نرسید(جدول شماره ۱).

روی سریع، دویدن نرم و سبک، حرکات جا به جایی، استقامت موضعی و ریلاکسیشن و غیره بود و در نهایت ۱۰ دقیقه برنامه سرد کردن و برگشت به حالت اولیه بود. شایان ذکر است که این برنامه تمرینی بر اساس توصیه‌های ویژه کالج آمریکایی طب ورزشی (ACSM) برای سالمدان اجرا شد^(۱۴). هم‌چنین برای به دست آوردن $VO_{2\text{max}}$ آزمودنی‌ها از آزمون راه رفتن راکپورت استفاده شد^(۱۵). منطقه ضربان قلب برای هر فرد مشخص بود اگر ضربان قلب شمارش شده پایین‌تر از منطقه مورد نظر بود فرد سرعتش را افزایش و اگر بالاتر بود فرد سرعت خود را کاهش می‌داد. ضربان قلب آزمودنی‌ها با برنامه تمرینات و پولار(مدل پوکس ۱۰۰۰ ساخت کشور ژاپن) کنترل می‌شد. به منظور آشنا شدن آزمودنی‌ها با برنامه تمرینات و شمارش ضربان قلب و نیز کنترل حضور و غیاب آزمودنی‌ها، ۳ جلسه تمرین آمادگی پیش از شروع برنامه تمرینات این تحقیق در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش از دست چپ آزمودنی‌ها پس از ۱۲ ساعت ناشتاپی در مراحل پیش آزمون(ابتدای پژوهش) و پس آزمون(۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین) در آزمایشگاه شهر ارومیه مقدار ۱۰ سی سی خون سیاه‌گری پس از ۵ دقیقه استراحت کامل، با استفاده از سرنگ‌های ونوجک استریل حاوی ماده ضد انقاد EDTA گرفته و سپس در ظرف یخ قرار داده شد. سرم با استفاده از سانتریفوژ ۱۵۰۰-۷۰۰ g برای ۱۵ دقیقه به دست آمد و در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد برای آنالیزهای بعدی ذخیره شد. سطح فیبرینوژن سرم با استفاده از کیت مخصوص فیبرینوژن انسانی(Sigma Chemical Co. USA) و دستگاه اتوانالایزر انقاد پلاسما (TOA Medical Electronics Model CA-1000. USA) گیری شد. جهت اندازه گیری میزان هموسیستئین تام پلاسما از کیت تخصصی FHCY100 English EIA آنزیم ایمنوسی با دقت یک میکرو مول در لیتر و زیر نظر آزمایشگاه طبی استفاده شد. غلظت پروتئین واکنشی - C (hs-CRP) از روش الیزا و با استفاده از

جدول شماره ۱. مقادیر مربوط به میانگین تغییرات پیش آزمون-پس آزمون متغیرهای تن سنجی در گروه های پژوهش

P*	گروه ورزش - ویتامین		متغیر
	کنترل	تجربی	
۰/۱۴۵	۶۰/۸۸±۵/۳۳	۶۱/۶۵±۷/۴۲	سن (سال)
۰/۸۸۴	۱۶۰/۲۲±۶/۸۴	۱۶۱/۲۵±۷/۴۴	قد (سانتی متر)
۰/۴۴۹	۸۸/۷۴±۴/۰۹ ۸۹/۵۶±۶/۱۲	پیش پس ۸۷/۷۸±۵/۴۱ ۸۴/۹۴±۵/۲۱#	وزن(کیلو گرم) پس
۰/۶۳۳	۳۲/۸۸±۳/۵۶ ۳۳/۹۵±۴/۲۵	پیش پس ۳۳/۷۸±۳/۶۰ ۲۹/۲۱±۵/۰#	پیش پس درصد چربی بدنی(%)
۰/۲۱۱	۳۳/۷۰±۲/۶۹ ۳۲/۴۴±۲/۱۸	پیش پس ۳۲/۵۶±۲/۳۷ ۲۹/۲۴±۲/۲۱#	پیش پس شاخص توده‌ی بدنی (وزن / محدود قدر)
۰/۲۸۲	۲۴/۰.۸±۴/۴۱ ۲۴/۸۹±۲/۵۷	پیش پس ۲۵/۱۲±۵/۱۸ ۲۴/۷۴±۴/۱۹	پیش پس اکسیژن صرفی پیشینه (ml.kg/min)

پیش: مقادیر پیش آزمون، پس: مقادیر پس آزمون؛ مقادیر به شکل انحراف معیار \pm میانگین بیان شده است.

معنی داری نسبت به مقادیر پیش آزمون در هر گروه با استفاده از آزمون آماری t همبسته ($P<0.05$).

* مقادیر P برای مقایسه متغیرهای فیزیولوژیکی آزمودنی ها با استفاده از آزمون شاپیرو وابک.

افزایش غیر معنی دار در دامنه طبیعی این شاخص ها دیده شد در حالی که این افزایش از لحاظ آماری به حد معنی داری نرسید(جدول شماره ۲). به علاوه غلظت فیبرینوژن سرم($P=0.122$) در گروه تجربی بعد از ۸ هفته از تمرين هوایی کاهش یافت اما این کاهش به لحاظ آماری به حد معنی داری نرسید. هم چنان نسبت به وضعیت پایه افزایش یافت اما این افزایش به صورت معنی دار نبود(جدول شماره ۲).

از سوی دیگر نتایج آزمون آماری در مورد دیگر متغیرهای تحقیق نشان داد که سطوح پلاسمایی هموسیستین($P=0.009$), hs-CRP ($P=0.004$), تری‌گلیسرید($P=0.037$), کلسترول($P=0.017$) و LDL-C ($P=0.047$) در پس آزمون نسبت به وضعیت پایه در گروه تجربی از لحاظ آماری کاهش معنی داری یافتند. در گروه کنترل تفاوت معنی داری در پس آزمون متغیرهای تحقیق نسبت به پیش آزمون مشاهده نگردید؛ این در حالی بود که در گروه کنترل یک

جدول شماره ۲. مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش، پیش و پس از اجرای تمرينات در گروه های پژوهش

P	گروه کنترل		P	گروه تجربی		متغیر
	پس آزمون	پیش آزمون		پس آزمون	پیش آزمون	
۰/۰۰۰***	۱۳/۷۲±۰/۲۸	۱۳/۲۲±۰/۳۳	۰/۰۰۴*	۹/۸۸±۰/۸	۱۲/۹۱±۰/۹	هموسیستین ($\mu\text{mol/L}$)
۰/۲۴۶	۳۹۳/۴۱±۱۶/۲۶	۳۹۰/۲۸±۱۵/۱۴	۰/۱۲۲	۳۷۷/۴۳±۱۲/۲۵	۳۹۶/۱۲±۱۸/۲۴	فیبرینوژن (mg/dL)
۰/۰۳۷***	۳/۲۸±۱/۰۸	۴/۲۸±۱/۱۱	۰/۰۰۹*	۲/۱۱±۰/۷۲	۳/۲۸±۰/۹۶	hs-CRP (Ng/ml)
۰/۰۴۹***	۲۱۱/۲۸±۳۵/۵۴	۲۰/۹/۷۲±۳۴/۴۴	۰/۰۳۷*	۱۸۸/۷۳±۳۶/۳۱	۲۱۸/۴۹±۴۱/۱۵	کلسترول (mg/dL)
۰/۰۰۰***	۱۹۱/۱۹±۴۵/۱۶	۱۸۶/۶۴±۴۷/۲۷	۰/۰۱۷*	۱۴۹/۶۶±۴۸/۲۸	۱۸۵/۳۳±۵۱/۸۳	تری‌گلیسرید (mg/dL)
۰/۰۳۴۲	۶۴/۳۹±۱۷/۵۶	۶۶/۱۱±۱۶/۱۸	۰/۰۲۱۵	۶۷/۳۳±۱۲/۶۹	۶۱/۷۴±۱۳/۷۴	HDL-C (mg/dL)
۰/۰۱۲***	۱۴۱/۴۱±۱۸/۲۱	۱۳۸/۲۲±۱۴/۱۴	۰/۰۴۷*	۱۱۶/۵۲±۱۲/۲۵	۱۳۵/۱۲±۱۸/۶۳	LDL-C (mg/dL)

* معنی داری آماری در سطح $P<0.05$ با توجه به نتایج آزمون t همبسته در درون گروه ها.

** معنی داری آماری در سطح $P<0.05$ با توجه به نتایج آزمون t مستقل در بین گروه ها.

بدن($P=0.04$, $R=0.68$) و رابطه غیر معنی داری بین تغییرات وزن بدن($P=0.12$, $R=0.38$) با تغییرات هموسیستین مشاهده شد این در حالی بود که رابطه غیر معنی داری بین تغییرات وزن بدن($P=0.32$, $R=0.22$), تغییرات شاخص توده بدن($P=0.19$, $R=0.28$) و تغییرات درصد چربی بدن($P=0.41$, $R=0.37$) با تغییرات فیبرینوژن مشاهده شد(جدول شماره ۳).

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در جدول شماره ۳، نشان داد که همبستگی کم و غیر معنی داری بین مقادیر پایه وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن با سطوح استراحتی هموسیستین و فیبرینوژن سرم وجود داشت. بر خلاف آن همبستگی بیشتر و معنی داری بین سطوح تغییرات شاخص‌های ترکیب بدنی با تغییرات این شاخص‌های التهابی مشاهده شد. در نهایت رابطه معنی داری بین تغییرات درصد چربی بدن($P=0.02$, $R=0.87$) و تغییرات شاخص توده

جدول شماره ۳. مقادیر ضریب همبستگی پیرسون بین سطوح اولیه و تغییرات هموسیستین و فیبرینوژن سرم با متغیرهای ترکیب بدنی

P	تغییرات فیبرینوژن	سطوح اولیه فیبرینوژن	P	تغییرات هموسیستین	سطوح اولیه هموسیستین	متغیرها
-	.۰/۲۵	-	-	.۰/۴۴	-	وزن بدن
.۰/۳۲	.۰/۲۲	-	.۰/۱۲	.۰/۳۸	-	تغییرات وزن بدن
-	.۰/۴۱	-	-	.۰/۰۸	-	شاخص توده بدن
.۰/۱۹	.۰/۴۱	-	.۰/۰۴*	.۰/۶۸*	-	تغییرات شاخص توده بدن
-	.۰/۳۶	-	-	.۰/۲۳	-	درصد چربی بدن
.۰/۲۸	.۰/۳۷	-	.۰/۰۲*	.۰/۸۷*	-	تغییرات درصد چربی بدن

* معنی داری تغییرات پیش آزمون تا پس آزمون در سطح($P<0.05$).

ارتباط دارد بدین معنی که در افراد با غلظت پایه بالای هموسیستین، تمرینات منظم هوایی باعث کاهش بیشتری در هموسیستین تا رسیدن به میزان نرمالش می‌شود(۶). در تحقیق حاضر در گروه تجربی که غلظت هموسیستین پایه در آن ها بالا بود بعد از انجام ۸ هفته تمرین هوایی میزان غلظت این فاکتور التهابی به صورت بارز و معنی داری کاهش یافت و به میزان نرمال آن رسید که در این خصوص با تحقیق اوکارا و همکاران هم خوانی دارد. برخی از محققین معتقدند که کاهش وزن و درصد چربی بدن در اثر تمرین می‌تواند به طور مستقیم باعث کاهش نیمrix لیپیدی شود و هم چنین در افرادی که سطوح طبیعی و پایه نیمrix لیپیدی بیشتر از سطح نرمالشان باشد اثرگذاری تمرین بر کاهش این فاکتورها بیشتر و بارزتر می‌باشد(۱۷،۱۸) به طوری که در تحقیق حاضر وزن، درصد چربی بدن و شاخص توده بدن بعد از ۸ هفته تمرین هوایی به طور

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر نشان داد که ۸ هفته تمرینات استقامتی سبب کاهش معنی دار غلظت هموسیستین سرم، hs-CRP و نیمrix لیپیدی در زنان سالمند چاق می‌شود، بنا بر این انجام این تمرینات می‌تواند روش پیشگیرانه موثری در کاهش ابتلاء به بیماری‌های قلبی-عروقی در افراد سالمند شود. در همین زمینه نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیقات کلی و همکاران(۲۰۰۸) و اوکارا و همکاران(۲۰۰۶) در زمینه تاثیر فعالیت بدنی بر کاهش هموسیستین هم خوانی دارد. مطالعه کلی و همکاران نشان داد کاهش معنی دار در هموسیستین احتمالاً بیشتر در گروه‌های سالمندان دارای اضافه وزن رخ می‌دهد که از این جهت با این تحقیق هم خوانی دارد(۱۶). اوکارا و همکاران نشان دادند تغییرات در هموسیستین در اثر تمرینات منظم هوایی به طور منفی با غلظت اولیه هموسیستین

همکاران بود، بنا بر این با توجه به یافته های مطالعات پیشین(۱۶،۱۷) همه این عوامل می تواند دلایلی برای تاثیر بیشتر و معنی دار تمرینات هوایی بر این فاکتورهای التهابی در آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر باشد. از سوی دیگر بر اساس مطالعات انجام گرفته تمریناتی که به صورت هوایی و به شکل منظم و کنترل شده در افراد سالم‌مند انجام گیرد بیشتر و بهتر می تواند باعث کاهش انباشت هموسیستئین در خون شود(۱۹). در زمینه تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات فیبرینوژن سرم و hs-CRP، کوهات و همکاران(۲۰۰۶) نیز گزارش کردند تمرین هوایی به مدت ۳ جلسه در هفته هر جلسه ۴۵ دقیقه با شدت ۵۰ تا ۶۰ درصد حداقل توان هوایی به مدت ۱۰ ماه سبب کاهش معنی دار hs-CRP در مردان و زنان بالای ۶۴ سال شد(۲۱)؛ که از این نظر با یافته های مطالعه حاضر هم خوانی دارد. بنا بر این همانند نیمرخ لیپیدی، در مورد hs-CRP هم به نظر می رسد ۱- طول دوره تمرینی عامل مهم و تعیین کننده تغییر hs-CRP در اثر تمرین می باشد، به طوری که اکثر تحقیقات که کاهش hs-CRP را گزارش کرده اند از برنامه های تمرینی(هوایی و قدرتی) با مدت حداقل هشت هفته استفاده کرده اند(۲۱،۲۲). ۲- برخی محققان معتقدند که برنامه های تمرینی همراه با کاهش وزن یا درصد چربی، در کاهش hs-CRP موثرتر بوده اند(۲۳)؛ بنا بر این یکی از دلایل کاهش hs-CRP در تحقیق حاضر را می توان به کاهش وزن و درصد چربی بدن آزمودنی ها ناشی از انجام هشت هفته از تمرینات هوایی نسبت داد. در زمینه تاثیر تمرین بر فیبرینوژن سرم؛ ال سیدا و همکاران(۱۹۹۵) تاثیر یک برنامه تمرینی شامل ۳ جلسه در هفته هر جلسه ۳۰ دقیقه به مدت ۱۲ هفته را بر این فاکتور التهابی در ۲۵ آزمودنی(۲۶) تا ۳۸ سال) بررسی کردند. نتایج نشان داد که با وجود افزایش حداقل توان هوایی در گروه تمرین و کاهش ۶ درصدی در فیبرینوژن، این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبوده است(۲۴). در اینجا عدم کاهش معنی دار غلظت فیبرینوژن سرم در مطالعه ال سیدا و همکاران همسو با یافته های تحقیق حاضر می باشد. در مطالعه مشابه دیگری باربیو و همکاران(۲۰۰۲) که

معنی داری کاهش یافت و هم چنین سطوح فاکتورهای نیمرخ لیپیدی در آزمودنی های تحقیق، قبل از شروع تحقیق و انجام تمرینات هوایی نسبت به سطوح طبیعی و پایه آن ها بالاتر بود که این ها می توانند دلایلی برای اثرگذاری بیشتر تمرین هوایی بر کاهش نیمرخ لیپیدی باشد. تمرینات هوایی احتمالاً از طریق افزایش جذب ویتامین های موثر در چرخه هموسیستئین به ویژه ویتامین های گروه B در روده افراد سالم‌مند(که میزان جذب ویتامین ها از روده آن ها کاهش می یابد) به کاهش میزان هموسیستئین و تبدیل هموسیستئین به متیونین و سیستئین کمک می کند و از انباشت آن در خون جلوگیری می کند(۱۹). همه این عوامل و هم چنین کاهش هموسیستئین(عامل خطرازی جدید) می تواند در کاهش بیماری های قلبی-عروقی موثر باشد(۱۹). با این حال در مطالعه ای نیکبخت و همکاران(۲۰۰۷)، همبستگی میزان فعالیت بدنی با غلظت فیبرینوژن و هموسیستئین سرم را در مردان میان سال ۴۰ تا ۵۵ ساله مورد بررسی قرار دادند آن ها آزمودنی ها را به سه گروه فعال(با حداقل دو سال سابقه فعالیت ورزشی)، غیرفعال و مبتلا به بیماری عروق کرونر(CVD) تقسیم نمودند. در این تحقیق معیار فعال بودن آزمودنی ها تنها استاندارد کالج آمریکایی طب ورزش(ACSM) در پرسش نامه سلامت عمومی NHIS بود. در پایان نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان فعالیت بدنی و غلظت هموسیستئین و فیبرینوژن ارتباط معنی داری وجود ندارد(۲۰). در اینجا دلیل همسو نبودن یافته های مطالعه نیکبخت و همکاران با یافته های مطالعه حاضر را می توان ریشه در تفاوت های آزمودنی ها، سطح پایه شاخص های التهابی و هم چنین شدت مورد استفاده تمرینات در این مطالعات دانست. برخلاف مطالعه نیکبخت و همکاران، آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر زنان چاق بودند که دارای درصد بالاتری از فاکتورهای نیمرخ لیپیدی و هم چنین وزن و درصد چربی بالا بودند، به علاوه به دلیل بالاتر بودن این فاکتورها در این افراد، سطوح اولیه و پایه هموسیستئین و فیبرینوژن در آزمودنی های مطالعه حاضر بالاتر از حد نرمال و طبیعی و هم چنین بالاتر از آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه نیکبخت و

مشخص در پژوهش حاضر، سبب کاهش شاخص‌های التهابی منتخب هموسیستئین، hs-CRP و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق شده است، لذا پیشنهاد می‌گردد که در مراکز سالمندان به ویژه افراد با اضافه وزن و سطوح بالای هموسیستئین و نیمرخ لیپیدی به سمت تمرینات هوایی کم فشار به صورت دائمی هدایت شوند. به علاوه از آن جا که تاثیرات مفید تمرینات ورزشی بر بیماری‌های کرونری قلب ممکن است با کاهش شاخص‌های التهابی همراه باشد، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه تاثیر فعالیت‌های ورزشی هوایی باشد، مدت و تکرار متفاوت از این پژوهش و هم‌چنین کنترل رژیم غذایی بر روی این شاخص‌های پیشگویی کننده بیماری‌های قلبی-عروقی در افراد مسن ضروری است.

به طور خلاصه، نتایج پژوهش حاضر حاکی از این واقعیت است که ۸ هفته تمرین منظم هوایی با کاهش وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن در آزمودنی‌های تحقیق، می‌تواند منجر به کاهش هموسیستئین، فیبرینوژن و CRP سرم به عنوان عوامل خطرزای قلبی-عروقی جدید، شود بنا بر این این تمرینات اثرات منفی التهاب را در زنان سالمند چاق به حداقل می‌رساند. بر این اساس می‌توان گفت که اندازه گیری شاخص‌های التهابی منتخب در مطالعه حاضر، می‌تواند ابزار موثر و سودمندی جهت تشخیص ایجاد بیماری‌های قلبی-عروقی و پیشگیری، کنترل و کاهش آتروواسکلروز باشد.

سپاسگزاری

از مدیریت محترم بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی، مادران محترم عضو مرکز سالمندان، مدیریت، پرستاران این مرکز و کلیه عزیزانی که ما را در اجرای این تحقیق یاری نموده اند، کمال تشکر را دارد. به علاوه لازم به ذکر است که مقاله پژوهشی حاضر مستخرج از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه محقق اردبیلی در زمستان ۱۳۹۱ با شماره نامه (۲۶۲/دع) می‌باشد.

روی پسران و دختران چاق با میانگین سن ۱۵ سال انجام شد نشان دادند که هشت ماه فعالیت ورزشی با شدت متوسط و زیاد همراه با آموزش روش زندگی، تغییر معنی داری در مقدار فیبرینوژن سرم ایجاد نکرده است(۲۵). نتایج برخی پژوهش‌ها و پژوهش حاضر نشان می‌دهد احتمالاً فعالیت بدنی منظم و مستمر نتواند در کاهش غلظت سرمی فیبرینوژن موثر و مفید باشد. شرایط سلامتی افراد، به ویژه حضور عواملی نظری مصرف سیگار، پر فشاری خون، چاقی به ویژه از نوع چاقی شکم، دیابت، افزایش سن، وراثت و غیره از جمله عوامل تاثیرگذار بر غلظت فیبرینوژن سرم اند(۲۶). در پژوهش حاضر عواملی نظری سن، جنس، شاخص توده بدن، مصرف مکمل‌های دارویی، و غذایی مرتبط با بیماری‌های قلبی-عروقی نظری دیابت و پر فشاری خون و جزء آن تا حد ممکن از طریق پرسش نامه‌ها کنترل شد. اما برخی محدودیت‌ها مانع کنترل مطلوب عوامل دیگر نظری رژیم غذایی، مصرف سیگار، وراثت، خواب آزمودنی‌ها و جزء آن شد. لذا طراحی و اجرای پژوهش‌های مختلف با هدف تعیین تاثیر میزان فعالیت بدنی و تمرین ورزشی شاخص‌های التهابی از جمله هموسیستئین و فیبرینوژن سرم، با توجه به تفاوت و تاثیر گسترده این عوامل بر آزمودنی‌های پژوهش، نتایج بسیار پراکنده‌ای را باعث می‌شود، به ویژه آن که سطح بهینه شدت، مدت و نوع تمرین ورزشی نیز هنوز پرسشی بسیار مهم و بدون پاسخ مانده است. این عوامل را در کنار هم می‌توان از دلایل عدم کاهش معنی دار فیبرینوژن سرم در زنان سالمند چاق در مطالعه حاضر دانست.

در نهایت با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر و یافته‌های تحقیقات پیشین، می‌توان گفت که تمرین ورزشی استقاماتی به طور مستقیم با کاهش تولید سایتوکاین‌ها از بافت چربی، عضله و سلول‌های تک هسته‌ای و به طور غیر مستقیم با افزایش حساسیت انسولین، افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن، بهبود عملکرد آندوتیال و کاهش وزن و چربی بدن، شاخص‌های التهابی را کاهش دهد(۲۷). بنا بر این با توجه به این که انجام تمرینات استقاماتی باشد و مدت

References

- 1.Hansson GK. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease. *N Engl J Med* 2005; 352:1685-95.
- 2.Ghatreh Samani1 K, Roghani F, Farrokhi E. [Evaluation of correaltion between plasma homocysteine and oxidized low-density lipoprotein in patients with coronary artery disease]. *J Birjand Univ Med Sci* 2009; 16 : 47-53.(Persian)
- 3.Ridker PM, Rifai N, Rose L, Buring JE, Cook NR. Comparison of C-reactive protein and LDL cholesterol levels in the prediction of first cardiovascular events. *NEJM* 2002; 347: 1557-65.
- 4.Roger VL, Lloyd-Jones DM, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, Bravata DM, et al. Heart And Stroke Statistical Update. Dallas American Heart Asso 2012; 125:1002.
- 5.Bizheh N, Jaafari M. [The effect of a single bout circuit resistance exercise on homocysteine, hs-CRP and fibrinogen in sedentary middle aged men]. *Iran J Basic Med Sci* 2011; 14:568-73.(Persian)
- 6.Okura T, Rankinen T, Gagnon G, Cacan S, Davignon J, Leon A, et al. Effects of regular exercise on homocysteine concentrations the heritage family study. *J Appl Phys* 2006 ;98:394-401.
- 7.Reinhart WH. Fibrinogen-marker or mediator of vascular disease? *Vasc Med* 2003; 8: 211-6.
- 8.Lyon CJ, Law RE, Hsueh WA. Minireview adiposity, inflammation, and atherogenesis. *Endocrinology* 2003;144:2195-200.
- 9.Tousoulis D, Davies G, Stefanadis C, Toutouzas P, Ambrose JA. Inflammatory and thrombotic mechanisms in coronary athrosclerosis. *Heart* 2003; 89:993-7.
- 10.Ho SS, Dhaliwal SS, Hills AP, Pal S. Effects of chronic exercise training on inflammatory markers in Australian overweight and obese individuals in a randomized controlled trial. *Inflammation* 2013;36:625-32.
- 11.Robertos CK, Chen AK, Barnard RJ. Effect of a short -term diet and exercise intervention in youth on atherosclerotic risk factors. *Atherosclerosis* 2007; 191: 98-106.
- 12.Morikawa M, Okazaki K, Masuki S, Kamijo Y, Yamazaki T, Genno H, Nose H. Physical fitness and indices of lifestyle-related diseases before and after interval walking training in middle-aged and older males and females. *Br J Sports Med* 2011; 45: 216-24.
- 13.Pinto A, Di Raimondo D, Tuttolomondo A, Butta C, Milio G, Licata G. Effects of physical exercise on inflammatory markers of atherosclerosis. *Curr Pharm Des* 2012;18:4326-49.
- 14.Chodzko WJ, David N, Fiatarone SM, Minson CT, Nigg CR, Salem GJ, et al. Exercise and physical activity for older adults. *AC Sports Med* 2009; 62:1510-30.
15. Soldatovic I, Vukovic R, Culafic D, Gajic M, Dimitrijevicsreckovic V. SiMS Score: Simple Method for Quantifying Metabolic Syndrome. *PLoS One*. 2016;11:143-6.
- 16.Kelley G, Kelley K. Effects of exercise and physical activity on homocysteine in adults: A metaanalysis of randomized controlled trials. *J Exe Phys* 2008; 11:12-23.
- 17.Zorba E, Cengiz T, Karacabey K. Exercise training improves body composition blood lipid profile and serum insulin levels in obese children. *J Sports Med Phys Fit* 2011; 51:664-9.
- 18.Itena TS, Michaelson JL, Ball SD, Guilford BL, Thomas TR. Lipoprotein subfraction changes after continuous or intermittent exercise training. *Med Sci Sports Exerc* 2006; 38:367-72.
- 19.Manor M, Joubert L. Exercise, Nutrition, and homocysteine. *Int J Sport Nut Exe Metab*2006;16:341-61.
- 20.Nikbakht HA, Amirtash AM, Gharouni H, Zafari A. [Comparison of physical activity with serum fibrinogen and homocysteine concentration in active, sedentary and with CAD males]. *Olympic*2007; 15:71-80.(Persian)
- 21.Kohut, M.L, McCann D.A, Russell D.W, Konopka D.N, Cunnick J.E, Franke M.C, et al. Aerobic exercise but not flexibility resistance exercise reduces serum IL – 18, CRP and IL-6 in older adults. *Brain Behav Immun* 2006;20: 201-9.
- 22.Haghghi AH, Hamedinia MR, Jamili P. [The effect of resistance training on CRP in obese male]. *J Sabzevar Uni Med Sci* 2006; 4: 204-10.(Persian)
- 23.Plaissance EP, Taylor JK, Alhassan S, Abebe A, Mestek ML, Grandjean PW.

- Cardiovascular fitness and vascular inflammatory markers after acute aerobic exercise. *Int J Sport Nutr Exerc Metab* 2007; 17: 152-62.
- 24.Elsayed M.S, Lin X, Rattu A.J. Blood coagulation and fibrinolysis at rest and in response to maximal exercise before and after a physical conditioning programme. *Blood Coagul Fibrinolysis* 1995; 6:747-52.
- 25.Barbeau P, Litaker M.S, Woods K.F, Lemmon C.R, Humphries M.C, Owens S. and Gutin B. Hemostatic and inflammatory markers in obese youths: effects of exercise and adiposity. *J Pediatr* 2002; 141: 415-20.
- 26.Jagdip S, Dahlia C, Juanc K. The effects of rosiglitazone, a peroxisome proliferator-activated receptor-gamma agonist, on markers of endothelial cell activation, C-reactive protein, and fibrinogen levels in non-diabetic coronary artery disease patients. *J Am Coll Cardiol* 2003; 42: 1757-63.
- 27.Kasapis C, Thompson PD. The effects of physical activity on serum C-reactive protein and inflammatory markers: a systematic review. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45: 1563-9.

The Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Predictive Inflammatory Markers of Atherosclerosis and Lipid Profile in Obese Elderly Women

Ghafari G^{1*}, Bolboli L², Rajabi A², Saedmochshi S³

(Received: November 22, 2014)

Accepted: August 12, 2015)

Abstract

Introduction: Cardiovascular diseases especially atherosclerosis, are the main causative of disability and death in all over the world and they have increasing spread in Iran. Homocysteine and fibrinogen are two new risk factors for prediction of atherosclerosis. Considering this, our aim in this study was to evaluate the effect of 8 weeks aerobic training on serum predictive inflammatory markers of atherosclerosis and lipid profile in obese elderly women.

Materials & methods: In a quasi-experimental study, 44 obese women ($BMI \geq 30$) 55 to 65 years old as volunteer, were selected and randomly divided into two groups of experiment (22 individuals) and control (22 individuals). Training program included aerobic exercise with 45 to 65 percent of maximum heart rate for 1 hour per session and 3 sessions per week and continued for 8 weeks. Blood samples were collected after 12 hours fasting in the pre-test and 48 hours in the post-test to measure homocysteine, fibrinogen, high-sensitivity protein (CRP) and lipid profile.

Findings: Present study data shows that a significant decrease was observed in

homocysteine ($p=0.004$), hs-CRP ($p=0.009$), cholesterol ($p=0.037$), triglyceride ($p=0.017$) and LDL-C ($p=0.047$) levels in experimental group; while there wasn't significant relation between study variability in control group. Also, a significant difference was observed in comparison between control and experimental groups about homocysteine ($p=0.000$), hs-CRP ($p=0.037$), cholesterol ($p=0.049$), triglyceride ($p=0.000$) and LDL-C ($p=0.012$). There was a significant relation between body fat percentage ($r=0.87$) and body mass index ($r=0.68$) with homocysteine.

Discussion & Conclusions: To sum up, by losing weight and body fat, homocysteine, CRP and also the increase of HDL study results showed that 8 week aerobic training can lead to reduction of cardiovascular risk factors and improving the health status in the elderly women.

Keywords: Aerobic training, Homocysteine, Fibrinogen, Atherosclerosis, Elderly women

1. Dept of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

2. Dept of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

3. Dept of Biochemistry and Metabolism Exercise, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Birjand University, Birjand, Iran

* Corresponding author Email: ghafour1367@gmail.com