

بررسی شیوع آلودگی میکروبی و عوامل موثر بر آن در مسواک های دانشجویان دانشگاه

علوم پزشکی ایلام

کبری حیدرزادی^{۱*}، فرید عزیزی جلیلیان^{۲*}، علی رضا رکابی^۳، راضیه امینی^۴، علی خورشیدی^۵، ایرج باکزاد^۶، مروت طاهری کلانی^۷، علی همتیان^۸، زهرا قبادیان^۹، مریم بوچانی^{۱۰}

- (۱) کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
- (۲) گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
- (۳) گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
- (۴) گروه پریو، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
- (۵) گروه پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
- (۶) گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تاریخ پذیرش: ۹۴/۱/۲۶

تاریخ دریافت: ۹۳/۱۲/۱۸

چکیده

مقدمه: متدالول ترین روش حفظ بهداشت دهان و دندان در جهان مسواک زدن دندان ها می باشد. با این وجود گاهی مسواک به یک عامل خطر برای سلامت جمعیت تبدیل می شود. مهم ترین دلیل این امر آلوه شدن آن با میکروارگانیسم های متنوع است. هدف از مطالعه حاضر بررسی آلوهگی باکتریایی و قارچی مسواک های دانشجویان و عوامل موثر بر این آلوهگی است.

مواد و روش ها: در این مطالعه ۹۵ مسواک از افراد سالم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در لوله های آزمایش حاوی نوترینت براث استریل به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. سپس با استفاده از محیط های مغذی و اختصاصی شامل محیط های کشت بلاد آگار، شکلات آگار، مکانکی و سایبرودکستروز آگار میکروارگانیسم های مورد نظر جداسازی شد. سپس پلیت های تلقیح شده در ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴-۴۸ ساعت انکوبه شدند. پس از آن شناسایی میکروارگانیسم ها بر اساس تست های بیوشیمیای صورت گرفت.

یافته های پژوهش: شیوع آلوهگی در افراد مسواک بیش از ۴۰ درصد بود. استافیلکوک ها، نایسیریا، دیفتروئید، اکتینیومیست و اعضای خانواده انترباکتریا سه میکروارگانیسم های ایزووله شده از نمونه های مورد بررسی بودند. آلوهگی میکروبی در زنان بیشتر از مردان بود. ($P<0.05$) بین تعداد میکروارگانیسم های یافت شده روی مسواک با مدت زمان استفاده از مسواک، استفاده از دهان شویه و جنسیت رابطه معنی دار دیده شد. ($P<0.05$) هم چنین آلوهگی به میکروارگانیسم های کوکسی با جنسیت، و آلوهگی به باسیل ها با استفاده از مسواک دارای درپوش ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد. ($P<0.05$)

بحث و نتیجه گیری: یافته های تحقیق شیوع بالای آلوهگی میکروبی در مسواک های مورد استفاده دانشجویان را نشان داد. بر این اساس نگهداری و استفاده صحیح و مناسب مسواک و نیز تجویض به موقع آن نقش مهمی در کاهش آلوهگی مسواک ها و به تبع آن کاهش بیماری های دهان و دندان و بیماری های احتمالی منتج از آن را خواهد داشت.

واژه های کلیدی: بهداشت دهان، آلوهگی میکروبی، مسواک

*نویسنده مسئول: گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

Email: azizjalilian@yahoo.com

مقدمه

می توانند منجر به عفونت های موضعی و سیستمیک از قبیل پوسیدگی دندان، التهاب لثه، استوماتیت، باکتریمی و اندوکاردیت و... در یک فرد شوند که موثر بر سلامت دهان و سلامت عمومی بدن است(۲۰،۱۷،۲۵). علاوه بر این محققان ارتباط بین سرماخوردگی های طولانی مدت، گلودرد و آنفولانزا را با آلودگی مسواک ها شناسایی نموده اند. هم چنین اظهار داشته اند که باکتری های دهانی ممکن است در حملات قلبی، دیابت و تولد زودرس نقش داشته باشند(۲۴). با توجه به انجام مطالعات بسیار محدود در داخل کشور در زمینه بررسی آلودگی میکروبی مسواک ها و نیز محدود بودن مطالعات صورت گرفته در زمینه بررسی عوامل موثر بر آلودگی مسواک ها، اهداف مورد نظر از این مطالعه شامل بررسی آلودگی میکروبی مسواک های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام و بررسی عوامل تاثیرگذار بر این آلودگی می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع مقطعی بود. تعداد ۹۵ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به روش تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. دانشجویان با بیماری های پریودنتال فعل و ارتودنسی از مطالعه حذف شدند. داده های مطالعه در دو بخش جمع آوری گردید؛ اطلاعات مربوط به متغیرهای دموگرافیک، نحوه استفاده و نگهداری از مسواک و هم چنین وضعیت بهداشت دهان و دندان افراد مورد بررسی، با استفاده از پرسشنامه طراحی شده گردآوری شد. اطلاعات مربوط به آلودگی و تعیین نوع میکرووارگانیسم ها از طریق انجام آزمایشات لازم بر روی مسواک افراد، جمع آوری شد. محققین از شرکت کنندگان خواستند تا مسواک خود را صحیح و پس از مسواک زدن در اختیار آن ها قرار دهند. قسمت بُرس هر مسواک با یک تیغ استریل از دسته آن جدا شد و در یک لوله حاوی ۱۰ میلی لیتر محیط کشت نوتریمنت براث قرار داده شد. نمونه ها جهت آنالیز میکروبیولوژی به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در آزمایشگاه نوتریمنت براث محتوای مسواک ها جهت تکثیر میکرووارگانیسم های احتمالی موجود در مسواک ها در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. بعد از پایان مدت زمان انکوباسیون، جهت جداسازی میکرووارگانیسم ها از مسواک، محتوی به مدت ۳۰-۴۵ ثانیه به شدت هم زده شد. سپس قسمت برس مسواک از لوله تحت شرایط استریل خارج و مجدداً جهت همگن سازی کامل به مدت

از جمله مواردی که در بررسی وضعیت سلامت عمومی بدن اهمیت به سزاگی دارد، وضعیت بهداشت دهان و دندان است(۱). بهداشت دهان و دندان به طور مستقیم و غیرمستقیم منعکس کننده سلامت کلی فرد است. بنا بر این حفظ بهداشت دهان و دندان یک فاکتور بسیار مهم است(۲). یکی از شایع ترین روش ها برای حفظ و ترویج بهداشت دهان و دندان و جلوگیری از بیماری های پریودنتال مسواک زدن دندان ها است(۱۰-۱۳). پذیرفته شده که مسواک کارآمدترین ابزار در از بین بردن پلاک میکروبی و بقایای خوراکی از حفره دهان است(۱۱). در اوایل جویلن تکه هایی از چوب هایی مثل Babul, Neem و Miswak تنها ابزارهای بهداشتی دهان محسوب می شدند که در جمیعت های مختلف مورد استفاده قرار می گرفت. در سال ۱۸۴۴ اولین مسواک توسط Dr. Meyer L. Rhein ساخته شد(۲). اما علی رغم تاثیر کلینیکی مسواک ها در حذف پلاک میکروبی از سطح دندان ها، طی سالیان اخیر نگرانی بیشتری راجع به امکان آلودگی مسواک ها توسط میکرووارگانیسم های مختلف و در نتیجه انتقال بیماری ها از طریق آن ها پدیدار گشته است(۱۲). در اوایل سال ۱۹۲۰ این مطلب توسط Cobb عنوان شد که «مسواک ها پس از استفاده آلوده می شوند» پس از آن نیز تحقیقات مختلف نشان داد که مسواک ها در افراد سالم و بیماران مبتلا به بیماری های پریودنتال به سرعت توسط مجموعه ای از میکرووارگانیسم های دهانی شامل باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها آلوده می شوند(۱۹-۱۳). با تکرار استفاده این آلودگی افزایش می یابد(۲۰). میکرووارگانیسم های موجود در مسواک علاوه بر حفره دهان می توانند از انگشتان آلوده، میکروفلور پوست، ظروف ذخیره سازی مسواک ها، باکتری های روده ای پراکنده شده از طریق آثروسیل های ناشی از سیفون توالت و سودوموناس ناشی از حمام و دیگر مناطق مرطوب منشاء بگیرند(۲۱،۲۲). مسواک زدن با مسواک های آلوده می تواند عامل ایجاد میکرووارگانیسم های جدید در حفره دهان باشد که در نهایت منجر به کاهش فلور نرمال دهان و به هم خوردن تعادل باکتری ها در حفره دهان و ایجاد بیماری می گردد(۲۳،۲۱). افزون بر این مسواک های آلوده خطر بالقوه ای در انتقال عفونت به افراد سالم، عفونت مجدد در افراد مبتلا به بیماری های پریودنتال مزمن و سلامت افراد با ضعف سیستم ایمنی محسوب می شوند(۲۴). بنا بر این، این قبیل مسواک ها نه تنها پناهگاه، بلکه ناقل میکرووارگانیسم هایی هستند که

گردید(جدول شماره ۱) که عبارتند از؛ استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، میکروکوکوس و نایسیریا، اشیرشیاکلی، انتروباکتر، کلبسیلا، سودوموناس، دیفتروئید و اکتینومیست. قارچ های یافت شده روی مسوак ها در تمام موارد کاندیدا شناسایی شدند. تمامی کاندیداهای جدا شده به آمفوتوسین B و پلی میکسین مقاوم بودند.

بین تعداد ارگانیسم های مشاهده شده و مدت زمان استفاده از مسواك ارتباط معنی دار وجود داشت($P<0.05$). در نمونه های دارای آلدگی، برای افرادی که بیش از ۴ ماه از مسواك استفاده کرده اند درصد وجود بیش از یک میکروارگانیسم بیشتر از کسانی بود که مدت استفاده از مسواك در آن ها کمتر از ۴ ماه بود(به ترتیب ۳۰ درصد و ۱۲/۳ درصد).

ارتباط بین مصرف دهان شویه و تعداد میکروارگانیسم ها نیز از نظر آماری معنی دار بود($P=0.046$). نتایج این مطالعه ارتباط معنی داری را بین متغیرهای قومیت، مصرف آنتی بیوتیک، نوع مسواك(ایرانی یا خارجی بودن)، تعداد و نوع الیاف مسواك(نرم، متوسط و سخت)، دفعات مسواك زدن در شباهه روز، مدت زمان مسواك زدن، خیساندن مسواك قبل از مسواك زدن، روش مسواك زدن، تعداد دندان های پرشده، استفاده از نخ دندان و تعداد دندان های پوسیده و آلدگی میکروبی نشان نداد.

جدول شماره ۱. انواع میکروارگانیسم های مشاهده شده

درصد فراوانی	نوع میکروارگانیسم
۱۰/۲۵	استافیلوکوکوس اورئوس
۱۲/۸۲	استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
۷/۷	استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس
۱۷/۹۵	میکروکوکوس
۱۲/۸۲	نایسیریا
۵/۱۳	اشیرشیاکلی
۷/۷	انتروباکتر
۵/۱۳	کلبسیلا
۷/۷	سودوموناس
۲/۵۶	دیفتروئید
۲/۵۶	اکتینومیست
۶۶/۶۶	کاندیدا

۱۰-۱۵ ثانیه به شدت تکان داده شد. سپس در پلیت های حاوی محیط کشت مکانکی برای جداسازی باکتری های گرم منفی، محیط کشت بلاد آگار و شکلات آگار برای جداسازی باکتری های گرم مثبت و محیط کشت سابرودکستروزآگار برای جداسازی قارچ ها تلقیح شد. انکوباسیون پلیت ها به شرح زیر انجام شد: پلیت های مکانکی، بلاد آگار و سابرودکستروزآگار در شرایط هوایی در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت انکوبه شدند. پلیت حاوی محیط کشت شکلات آگار نیز در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت با ۵-۱۰ درصد CO_2 به منظور جداسازی بهتر استرپتوفک ها انکوبه شدند. محیط های کشت در ۲ مرحله متوالی ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد جهت بررسی کلیه میکروارگانیسم ها، شامل سریع و دیر رشد، مورد مطالعه قرار گرفت. سپس کلونی های رشد کرده بر روی محیط های کشت، توسط رنگ آمیزی گرم مورد آزمایش قرار گرفت. پس از آن در مورد کلی های به دست آمده رنگ آمیزی گرم انجام گرفت. در ادامه ارگانیسم های گرم مثبت با استفاده از تست های کاتالاز، حساسیت به نتوبوسبین و باسی تراسین و تست MSA شناسایی شدند. ارگانیسم های گرم منفی نیز با استفاده از تست های اکسیداز، تحرک و دیگر تست های بیوشیمیایی و محیط های کشت افراطی استاندارد شناسایی شدند(۱۰، ۲۱، ۲۶).

یافته های پژوهش

در این مطالعه داده های ۹۵ نفر تجزیه و تحلیل شد. شرکت کنندگان، ۲۸ مرد و ۶۷ زن بودند. شیوع آلدگی ۴۱/۱ درصد و در زنان بیشتر از مردان بود(۴۹/۳) درصد در برابر ۲۱/۴ درصد). در ۴۴ درصد نمونه های آلدگی، بیش از یک میکروارگانیسم دیده شد. آلدگی به میکروارگانیسم کوکسی در زنان و مردان به ترتیب ۲۵/۴ درصد و ۳/۶ درصد بود. تفاوت های مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود($P<0.05$) اما بین دو جنس از نظر آلدگی به باسیل و قارچ تفاوتی دیده نشد.

نتایج نشان داد که استفاده از درپوش مسواك با آلدگی آن ارتباط دارد. در مسواك های دارای درپوش، آلدگی به باسیل بیشتر بود(۱۷/۴ درصد در برابر ۴/۱ درصد) و این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار بود($P<0.05$). در مجموع، ۱۲ گونه باکتریایی و قارچ شناسایی

بحث و نتیجه گیری

استرپتوکوکوس شناسایی شد اما طبق روش دوم هیچ گونه استرپتوکوکی جدا نشد. شیوع آلودگی، تعداد میکرووارگانیسم ها و درصد آلودگی به میکرووارگانیسم کوکسی در زنان بیشتر از مردان بود. تنها مطالعه ای که ارتباط جنسیت با میزان آلوگی را مورد بررسی قرار داده، مطالعه نصرت نوربخش و همکاران(۳۶)، است که بیان داشتن جنسیت بر میزان آلودگی مسواک ها اثری ندارد. این نتیجه با نتیجه مطالعه ما هم خوانی ندارد. از آن جایی که گروه های جمعیتی مختلف ممکن است در بار میکروبی خود اختلاف داشته باشند و با توجه به این که انواع میکرووارگانیسم های روی مسواک بازتابی از میکرووارگانیسم های موجود در حفره دهان استفاده کننده است(۲۲،۱۸). ارتباط بین آلودگی میکروبی مسواک و جنسیت می تواند نشان دهنده الگوی متغیر میکروفلور بین ۲ گروه باشد. افرون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از درپوش مسواک با آلودگی آن ارتباط دارد به طوری که با استفاده از درپوش درصد آلودگی افزایش می یافتد. ۱۷/۴ درصد از مسواک های دارای درپوش با ارگانیسم های باسیل آلود بودند در حالی که تنها ۴/۱ درصد از مسواک های بدون درپوش آلود بودند. به طور مشابه نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که شرایط نگهداری مسواک فاکتور مهمی برای بقا باکتری ها می باشد. Dayoub و همکاران و Meier و همکاران نشان دادند که تعداد میکرووارگانیسم ها در مسواک هایی که در شرایط هوادهی و بدون درپوش نگهداری می شوند در مقایسه با مسواک هایی که با استفاده از درپوش نگه داشته می شوند کمتر است(۴،۳۹). Heather Borso و همکاران در مطالعه خود گزارش کردند که تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلونی (CFU) استرپتوکوکوس موتانس روی مسواک های دارای درپوش در مقایسه با مسواک های بدون درپوش بیشتر است(۴۰). Mehta A و همکاران نیز در مطالعه خود بیان داشتند که استفاده از درپوش پلاستیکی برای مسواک، با حفظ رطوبت آن منجر به رشد میکرووارگانیسم هایی مثل سودوموناس آثروژینوزا و پاتوژن های فرست طلب می شود(۱۳). Dayoub و همکاران نیز اظهار داشته اند که محیط مرتبط یک فاکتور ایده آل برای رشد میکرووارگانیسم ها محسوب می شود(۴۱). بنا بر این می توان گفت استفاده از درپوش برای مسواک باعث حفظ رطوبت آن شده و شرایط مناسب برای رشد میکرووارگانیسم ها را فراهم می آورد. نصرت نوربخش و همکاران(۳۶)، بیان داشته اند که نداشتن درپوش مسواک با افزایش میزان آلودگی مسواک ها همراه بوده است. این یافته با نتایج ما

مطالعات متعددی حضور میکرووارگانیسم ها را روی مسواک گزارش کرده اند(۲۷-۲۹). مسواک های آلود می توانند نقش مهمی در توسعه بیماری های مختلف ایفا کنند(۶). خطر انتقال عفونت و عفونت مجدد افراد به دلیل حضور میکرووارگانیسم ها روی مسواک باعث بررسی عوامل موثر بر آلودگی میکروبی مسواک ها شد(۳۰). این مطالعه به منظور بررسی آلودگی باکتریایی و قارچی مسواک های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام و عوامل موثر بر این آلودگی انجام گرفت. طبق نتایج حاصل از این مطالعه ۴۱/۱ درصد از مسواک های مورد بررسی آلود بودند. در مجموع ۱۲ گونه باکتریایی و کاندیدا روی مسواک های مورد بررسی شناسایی شد. این نتایج مطابق با یافته های مطالعات قبلی است که نشان می دهند بیشتر مسواک ها به طور گسترده با انواع میکرووارگانیسم ها آلود می شوند(۳۵-۳۱). بنا بر این خطر کلوفیزیسیون مجدد دهان با میکرووارگانیسم ها بعد از هر بار مسواک زدن وجود دارد که این امر در بیماران پریودنتال تحت درمان اهمیت ویژه ای دارد(۱۰). مطالعه انجام شده توسط A و همکاران آلودگی ۷۰ درصد مسواک های استفاده شده را با میکرووارگانیسم های پاتوژن شامل استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، اسینتوباکتر و استرپتوکوکوس Rodrigues LK و ویریدنس گزارش کردند(۱۳). همکاران در مطالعه مسواک های استفاده شده توسط دانشجویان دندان پزشکی آلودگی بیش از ۹۰ درصد آن ها را با استرپتوکوک، استافیلوکوک، انترباکتریاسه و مخمر گزارش کردند(۱۸). نصرت نوربخش و همکاران نیز در مطالعه خود آلودگی ۲۱/۴ درصد از مسواک های استفاده شده را گزارش کردند(۳۶). مطالعه ما از نظر درصد آلودگی و میکرووارگانیسم های یافت شده روی مسواک در توازن با مطالعات قبلی است اما برخلاف تعدادی از مطالعات از جمله Sato AP و همکاران(۳۷) و Nascimento S و همکاران(۳۸) که به ترتیب آلودگی ۹۲/۷ درصد مسواک ها را با استرپتوکوکوس موتانس و ۸۰ درصد را با استرپتوکوک گزارش کردند در مطالعه ما هیچ گونه استرپتوکوکی از مسواک ها شناسایی نشد. دلیل احتمالی این امر را می توان با مطالعه انجام شده توسط Ferreira CA و همکاران(۶)، توضیح داد که در مطالعه خود مسواک های جمع آوری شده از ۲ گروه ۲۰ نفره را طبق دو روش میکروبیولوژی خاص مورد بررسی قرار دادند. طبق یک روش میکروبیولوژی در ۱۰ درصد مسواک ها

یک ماه استفاده شده بودند از نظر تعداد میکرووارگانیسم های رشد یافته روی مسوک در مقایسه با مسوک هایی که به مدت سه ماه استفاده شده بودند، کمتر بودند.

یافته های تحقیق شیوع بالای آلدگی میکروبی در مسوک های مورد استفاده دانشجویان را نشان داد. بر این اساس نگهداری و استفاده صحیح و مناسب مسوک و نیز تعویض به موقع آن نقش مهمی در کاهش آلدگی مسوک ها و به تبع آن کاهش بیماری های دهان و دندان و بیماری های احتمالی منتج از آن محسوب می شود.

سپاسگزاری

نویسندها مقاله مراتب تشکر و تقدیر خود را از کلیه دانشجویان شرکت کننده در این تحقیق اعلام می دارند. این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفته است.

هم خوانی ندارد. به نظر می رسد که تعویض مسوک ها جهت حفظ بهداشت دهان ضروری است و استفاده طولانی مدت از مسوک باعث افزایش فرسودگی و افزایش تجمع میکرووارگانیسم ها روی الیاف آن می شود^(۶). طبق مطالعه نصرت نوربخش و همکاران^(۳۶)، مدت زمان استفاده از مسوک بر میزان آلدگی مسوک ها اثری نداشته است. اما برخلاف این مطالعه، بررسی صورت گرفته توسط Ferreira CA و همکاران^(۶)، گزارش کرد که مدت زمان استفاده از مسوک ها می تواند با پیدایش آلدگی در ارتباط باشد به طوری که آلدگی مسوک ها با استفاده طولانی مدت از آن ها افزایش می یابد. افزون بر این در ارتباط با نتایج ما مطالعه karibasappa GN و همکاران^(۲)، پس از گزارش آلدگی ۹۵ درصد مسوک های مورد بررسی بیان داشتند که مسوک های که به مدت

References

- 1.Bhat S, Hegde KS, George R. Microbial contamination of toothbrushes and their decontamination. J Indian Soc Pedo Prev Dent 2003;21:108-12.
2. Karibasappa G, Nagesh L, Sujatha B. Assessment of microbial contamination of toothbrush head: An in vitro study. Indian J Dent Res 2011;22:2-5.
- 3.Wetzel WE, Schaumburg C, Ansari F, Kroeger T, Szegoleit A. Microbial contamination of toothbrushes with different principles of filament anchoring J Am Dent Assoc 2005;136:758-64.
- 4.Gujjari GK,Gujjari AK, Patel PV. Comparative evaluation of ultraviolet and microwave sanitization techniques for toothbrush decontamination. J Int Soc Prevent Commun Dentist2011;1:20-6.
- 5.Macari S, Ito I, Silva R, Silva L, PaulaSilva F. Efficacy of antimicrobial sprays for disinfection of children's toothbrushes a randomized clinical trial. RPG Rev Pos Grad 2011;18;1:8-12.
- 6.Ferreira C, Savi G, Panatto A, Generoso J, BarichelloT. Microbiological evaluation of bristles of frequently used toothbrushes. Dent Press J Orthod 2012 ; 17:72-6.
- 7.Pai V. Effect of a single use toothbrush on plaque microflora. India J Dent Res2009;20:404-6.
- 8.Glaze PM, Wade AB. Toothbrush age and wear as it relates to plaque control. J Clin Periodontol1986;13:52-6.
9. Sogi SH. Contamination of toothbrushes of different time intervals and effectiveness of various disinfecting solutions in reducing the contaminationof toothbrush . J Indian Soc Pedod Prev Dent2002;20:81-5.
- 10.Bezirtzoglou E, Cretoiu S, Moldoveanu M, Alexopoulos A, Lazar V, Nakou M. A quantitative approach to the effectiveness of ozone against microbiota organisms colonizing toothbrushes. J Dent 2008;36:600-5.
- 11.Kennedy HF, Morrison D, Tomlinson D, Gibson BES,Bagg J, Gemmell CG. Gingivitis and toothbrushes Potential roles in viridans streptococcal bacteraemia. J Infect2003;46:67-70.
- 12.Saravia ME, Nelson P, Silva R, Faria G, Rossi M, Ito I. Viability of Streptococcus mutans toothbrush bristles. ASDC J Dent Child2008;75:29-32.
- 13.Mehta A, Sequeira PS, Bhat G. Bacterial contamination and decomtamination of toothbrushes after use. NY State Dent J2007; 4: 20-2.
- 14.Michelle R, Frazelle and Cindy L, Munro. Toothbrush Contamination: A Review of the Literature. Nurs Res Prac2012;8:213-9.

- 15.Nascimento A. P, Watanabe E, Ito IY. Toothbrush contamination by candida sppc and efficacy of mouthrinse spray for their disinfection. *Mycopathologia*2010; 169:133-8.
- 16.Nelson P, Isper A, Assed S, Faria G, Ito I. Effect of triclosan dentifrice on toothbrush contamination. *Pediatr Dent*2004;26:11-16.
- 17.Saini R, Saini S. Microbial flora on toothbrush at greater risk. *Ann Niger Med*2010;4:23-9.
- 18.Rodrigues L, Motter C, Pegoraro D, Vicente P, Menolli R . Microbiological contamination of toothbrushes and identification of a decontamination protocol using chlorhexidine spray. *Rev odonto cienc*2012;27:81-6.
- 19.Nelson P, Faria G, Silva RA, Rossi MA, Ito IY. Evaluation of the contamination and disinfection methods of toothbrushes used by 24 to 48 month old children . *J Dent Child*2006 ;73:152-8.
- 20.Bunet L, Tnicot D. Invitro evaluation the retention of there species of pathogenic microorganisms by three different types pf toothbrush. *Oral microbiol Immunol*2000 ;15:31-6.
- 21.Konidala U, Nuvvula S, Mohapatra A, Nirmala S. Efficacy of various disinfectants on microbially contaminated toothbrushes due to brushing. *Contemp Clin Dent*2011; 2:302-7.
- 22.Ankola AV, Hebbal M, Eshwar S. How clean is the toothbrush that cleans your tooth? *Int J Dent Hyg*2009;7:237-40.
- 23.Glass RT, Lare MM. Toothbrush contamination a potential health risk? *Quintess Int*1986;17:39-42.
24. Turner LA, McCombs GB, Hynes WL, Tolle SL. A novel approach to controlling bacterial contamination on toothbrushes chlorhexidine coating. *Int J Dent Hygien*2009;7:241-5.
- 25.Warren DP, Goldschmidt MC, Thompson MB, Storthz K, Keene HJ. The effect of toothpastes on the residual microbial contamination of toothbrushes .*J Am Dent Assoc*2001 ;132:1241-5.
- 26.Taji SS, Rogers AH. The microbial contamination of toothbrushes. A pilot study. *Aust Dent J*1998; 43: 128-30.
- 27.Lock G, Dirscherl M, Obermeier F , Gelbmann CM, Hellerbrand C, Knoll A, et al. Hepatitis C - contamination of toothbrushes: myth or reality? *J Viral Hepat*2006;13:571-3.
- 28.Glass RT, Jensen HG. More on the contaminated toothbrush the viral story. *Quintess Int*1988;19:713-6.
- 29.Peter R, John N, Rippin W. The efficacy of a toothbrush disinfectant spray an in vitro study. *J Dentistr*2003;31:153-7.
- 30.Sato S, Pedrazzi V, Lara EH, Panzeri H, Albuquerque RF, Ito IY. Antimicrobial spray for toothbrush disinfection: an in vivo evaluation. *Quintess Int*2005;36:812-6.
- 31.Nascimento CD , Scarabel TT, Miani PK , Watanabe E , Pedrazzi V. In Vitro Evaluation of the Microbial Contamination on New Toothbrushes: a Preliminary Study. *Microsc Res Tech*2012 ;75:42-5.
- 32.Quirynen M, Desoete M, Pauwels M, Goossens K,Teughels W, Eldere J, et al. Bacterial survival rate on tooth and interdental brushes in relation to the use of toothpaste. *J Clin Periodontol*2001;28:1106-14.
- 33.Nanjunda KV, Anand UM, Prashanth MB. Evaluation of streptococcus mutans contamination of tooth brushes and their decontamination using various disinfectants an in vitro study. *J Adv Oral Res*2011;2:132-8.
- 34.Svanberg M. Contamination of toothpaste and toothbrush by Streptococcus mutans. *Scand J Dent Res*1978;86:412-4.
- 35.Jonathan B. Nutt and Susan E. Barbaro. Effect of toothpaste formulations on the number of viable bacteria left on toothbrushes following routing brushing. *Riv Acad J*2013;9:121-9.
- 36.Eichenauer J, von Bremen J, Ruf S. Microbial contamination of toothbrushes during treatment with multibracket appliances. *Head Face Med*2014;10:43.
- 37.Nascimento AP, Faria G, Watanabe E, Ito IY. Efficacy of mouthrinse spray in inhibiting cariogenic biofilm formation on toothbrush bristles . *Brazil J Oral Sci*2008;7:1489-92.
- 38.Sato S, Yoko I, Guimaraes Lara EH, Panzeri H, Ferreira de Albuquerque H, Pedrazzi V. Bacterial survival rate on toothbrushes and their decontamination with antimicrobial solutions. *J Appl Oral Sci*

Sci2004;12:99-103.

39. Nelson F, Macaris S, Faria G, Assed S, Ito IY. Microbial contamination of toothbrushes and their decontamination. Pediat Dent2000; 22:381-4.
40.Borso H, Crump R , Schelling M. The Effect of Toothbrush Covers on Bacterial

Retention. J Dent Hygiene2004;78:71-6.
41.Bhat SS, Hegde KS, George RM. Microbial contamination of tooth brushes and their decontamination . J Indian Soc Pedod Prev Dent2003;21: 108-12.

The survey of Microbial Contamination Prevalance and the Effective Factors in ILam University of Medical Sciences Student's Toothbrushes

Heidarzadi K^{1,2}, Azizi Jalilian F^{3*}, Rekabi A⁴, Amini R⁵, Khorshidi A⁶, Pakzad I², Taherikalani M², Hematian A², Ghobadian Z¹, Bouchani M¹

(Received: March 9, 2015 Accepted: April 15, 2015)

Abstract

Introduction: The most common method of oral hygiene is tooth brushing. However, occasionally brushing becomes a risk factor for health. The main reason is getting infected with various microorganisms. The purpose of this study was to investigate bacterial and fungal contamination of toothbrushes students, and factors affecting the contamination.

Materials & Methods: Ninety five brushes were assessed in this study. Samples were incubated in test tubes containing nutrient broth for twenty-four hours. Then the microorganisms were isolated using specific nutrient medium containing Blood agar, Chocolate agar MacConkey and sabouraud dextrose agar. The inoculated plates were incubated for 24 to 48 hours at 37 C. The identification of microorganisms was performed based on biochemical tests.

Findings: The infection rate was more than

40% of the subject staphylococcus, Niesseria, Diphtheroids, Actinomycetes and Enterobacteriacae family members were isolated from samples. Microbial contamination was higher in women than men ($P<0.05$). There was found correlation between the number of microorganism on brush with time of use, using mouthwash and gender ($P<0.05$). There was statistically significant relation between cocci microorganisms' infections with sexes as well as between bacillus infections with capped brush.

Discussion & Conclusion: Based on results, high incidence of bacterial contamination observed in brushes, therefore the proper use, maintenance and timely replacement of toothbrush play an important role in reducing pollution and consequently decreasing oral disease.

Keywords: Oral hygiene, Microbial contamination, Toothbrush.

1.Student Research Committee, Ilam University of Medical Science, Ilam, Iran

2.Dept of of Microbiology, faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

3.Dept of of Microbiology, faculty of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

4.Dept of periodontology, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences, Ilam Iran

5.Dept of Molecular Medicine, Faculty of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran

6.Dept of Epidemiology, faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

* Corresponding author Email: azizijalilian@yahoo.com