

تاثیر عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگولانس بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی و پارامترهای اسپرم به دنبال تجویز تستوسترون در رت

مریم سریشگی^۱، عذرًا خواجه‌جوی*

(۱) گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۲/۵

تاریخ دریافت: ۹۶/۰۹/۲۱

چکیده

مقدمه: افزایش سطح تستوسترون و یا استفاده ناصحیح و خودسرانه از تستوسترون می‌تواند باعث ایجاد اختلال در باروری گردد. امروزه استفاده از گیاهان دارویی برای درمان اختلالات هورمونی و نازابی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثرات عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگولانس بر تعداد و قابلیت حیات اسperm، شاخص گونادوسوماتیک، سطح مالون دی آلدئید(MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل(TAC)، در بیضه رت به دنبال تجویز تزریق تستوسترون بررسی شده است.

مواد و روش‌ها: در مطالعه تجربی حاضر تعداد ۴۸ سر رت از نژاد ویستار به طور تصادفی به ۶ گروه تقسیم شدند: کنترل، شاهد، تستوسترون و سه گروه دریافت کننده تستوسترون همراه با عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگولانس با دوزهای ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم، تستوسترون پروپیونات ۳ میلی گرم بر کیلوگرم روزانه به صورت زیرجلدی به مدت ۴ هفته تزریق گردید. گاواآ دهانی عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگولانس یا آب مقدار به طور هم زمان با تزریق تستوسترون انجام شد. در پایان شاخص گونادوسوماتیک، تعداد و قابلیت حیات اسperm، TAC و MDA در بیضه مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌های پژوهش: نتایج نشان دهنده کاهش شاخص گونادوسوماتیک، تعداد قابلیت حیات اسperm و سطح آنتی اکسیدانی کل و افزایش MDA در گروه دریافت کننده تستوسترون بود($P<0.001$). عصاره ویتانیا کواگولانس به صورت واسطه به دوز باعث افزایش شاخص گونادوسوماتیک و پارامترهای اسperm، کاهش MDA و افزایش TAC در بیضه در مقایسه با گروه تستوسترون گردید($P<0.05$).

بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد عصاره ویتانیا کواگولانس می‌تواند باعث بهبود وضعیت پارامترهای باروری گردد و ممکن است در درمان مشکلات ناباروری مفید واقع شود اگر چه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

واژه‌های کلیدی: ویتانیا کواگولانس، تستوسترون، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، مالون دی آلدئید، رت

* نویسنده مسئول: گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

Email: ozrakhajavi@gmail.com

Copyright © 2018 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits copy and redistribute the material, in any medium or format, provided the original work is properly cited.

دارای خواص آنتی اکسیدانی، کاهنده قند و چربی خون می باشد(۴).

تحقیقات انجام شده نشان داده است که عصاره گیاه ویتانیا می تواند باعث درمان الیگواسپرمی در مردان شود و هم چنین با تحریک فولیکول زایی باعث افزایش قدرت باروری در زنان گردد(۵). مطالعه Kiasalari و همکاران نشان داد عصاره ویتانیا باعث تنظیم و بهبود اختلالات هورون های جنسی ناشی از دیابت القاء شده در رت های نر می شود(۷). بنا بر این هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات عصاره آبی الکلی ویتانیا کوآگولانس بر شاخص گونادوسوماتیک، تعداد و قابلیت حیات اسپرم وضعیت آنتی اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی در بیضه رت به دنبال تزریق تستوسترون می باشد.

مواد و روش ها

روش تهیه عصاره: گیاه ویتانیا از نواحی اطراف شهرستان سراوان(سیستان و بلوچستان) توسط مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی دانشگاه سیستان و بلوچستان شناسایی و جمع آوری شد و به صورت انبوه در گلخانه این مرکز کشت داده می شود. نمونه های گیاه پس از دریافت با آب بدون یون شسته و در دمای ۲۵ درجه در محیط آزمایشگاه خشک گردید. هر یک گرم نمونه پودر خشک شده گیاه با استفاده از ۱۰ میلی لیتر حلal مтанول: آب(۲۵:۷۵) به صورت هموژنیزه در آمده و به مدت ۲۰ دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار گرفت. در ادامه مخلوط از کاغذ صافی عبور داده شد و پس از آن مایع جمع آوری شده توسط دستگاه تبخیر کننده چرخشی تقطیل و خشک گردید. پودر جمع آوری شده وزن و تا هنگام استفاده در فریزر نگهداری شد(۸).

در مطالعه حاضر از ۴۸ سر موش صحرابی نر بالغ به وزن تقریبی ۲۵۰-۲۸۰ گرم استفاده شد. حیوانات در مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شرایط استاندارد(۱۲ ساعت روشناختی و ۱۲ ساعت تاریکی و دمای ۲۲ ± 2 درجه سانتی گراد و با دسترسی آزادانه به آب و غذای استاندارد حیوانات آزمایشگاهی) نگهداری شدند. حیوانات به طور تصادفی

مقدمه

آندروزن ها برای رشد و فعالیت طبیعی عدد جنسی ضروری اند. مطالعات نشان دهنده ارتباط مستقیم بین سطح تستوسترون خون و وزن بیضه ها، اپیدیدیم، کیسه های سینال و پروستات می باشد. تستوسترون هورمون اصلی مترشحه از بیضه ها است که توسط سلول های لیدیگ بافت بیضه ساخته و ترشح می شود. این هورمون توسط آنزیم ۵ آلفا ردوکتاز تبدیل به دی هیدرو تستوسترون می شود. هم چنین صفات ثانویه جنسی مردان در دوران بلوغ تحت تاثیر تستوسترون پیشرفت می کند(۱).

در صورت تزریق این هورمون به صورت بروزنزاد، به دلیل افزایش سطح تستوسترون سرم، محور هیپوتالاموس-هیپوفیز- بیضه ای مهار گردیده و به دنبال آن سطح هورمون های FSH و LH و در نهایت، سطح تستوسترون سرم و بیضه کاهش یافته و همین امر باعث کاهش وزن بیضه ها و تعداد اسپرم می شود(۲).

در بعضی از کشورها از تستوسترون به عنوان یک داروی ضد باروری در مردان استفاده می شود از طرفی دیگر در بسیاری از موارد از این هورمون برای افزایش حجم عضلات در باشگاه های بدنسازی استفاده می گردد. مطالعات نشان داده است تستوسترون بروزنزاد (Exogenous) می تواند باعث ناباروری گردد(۳). امروزه استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان انواع بیماری ها مورد توجه می باشد. ویتانیا کوآگولانس (Withania coagulans) از خانواده سولاناسه، از جمله گیاهان دارویی و چند منظوره است که در ایران، منحصرآ در برخی از رویشگاه های جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان پراکنش دارد. عمدۀ ویژگی دارویی این گیاه مربوط به حضور گروهی از لاکتون های استروپیدی به نام ویتانولوئیدها می باشد. در بین ویتانولوئیدهای موجود، ترکیب ویتافرین A به دلیل ویژگی بازدارندگی رشد سلول ها و تومورهای سرطانی، دارا بودن ویژگی آنتی آنثیوژن و القاء مرگ برنامه ریزی شده سلول در صنایع دارویی از ارزش بالایی برخوردار می باشد، هم چنین عصاره این گیاه

محاسبه شاخص گونادوسوماتیک: با تقسیم کردن وزن بیضه ها بر وزن بدن برای هر موش و ضرب عدد بدست آمده در ۱۰۰، شاخص گونادوسوماتیک محاسبه گردید(۱۱).

شمارش اسپرم ها: جهت شمارش تعداد اسپرم ها یک سانتی متر از انتهای اپی دیدیم برش داده شد و در ۲ سی سی محلول فسفات بافر سالین با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ گردید. ۱۰ میکرولیتر(یک قطره) از سوسپانسیون اسپرمی به دست آمده بر روی لام هم‌وسیتومتر (Darmstadt, Germany, LABART) قرار داده شد و با استفاده میکروسکوپ نوری و بزرگ نمایی ۴۰ تعداد سر اسپرم ها در پنج خانه مخصوص شمارش گلیبول های قرمز شمارش و سپس تعداد اسپرم در ۱ میلی لیتر نمونه محاسبه گردید(۱۲).

قابلیت حیات اسپرم: جهت بررسی قابلیت حیات اسپرم از رنگ ائوزین استفاده شد بدین صورت که ۷ ماکرولیتر رنگ ائوزین(۵/۰۰ درصد در سالین) به ۲۰ ماکرولیتر نمونه اسپرم روی لام نئوبار اضافه شد و زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی ۴۰ اسپرم های بدون رنگ شمارش گردید حداقل ۱۰۰ اسپرم در پنج میدان دید برای هر نمونه شمارش و نتیجه به صورت میانگین اسپرم های زنده گزارش گردید(۱۱).

اندازه گیری سطح MDA در بافت بیضه: به طور خلاصه ۵/۰ سی سی از محلول رویی حاصل از سوسپانسیون بافتی به ۳ سی سی اسیدفسفوریک ۱ درصد و ۱ سی سی محلول تیوباربیتوریک اسید ۶ درصد(شرکت مرک آلمان) افزوده شد. محلول فوق در بن ماری ۹۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ دقیقه قرار داده شد. پس از سرد شدن ۴ سی سی ان-بوتانول اضافه شد و به شدت تکان داده شد و مجدداً سانتریفیوژ گردید تا لایه ان-بوتانول جدا گردد. جذب محصول صورتی رنگ در طول موج ۵۳۵ نانومتر خوانده شد. از تراماتوکسی پروپان جهت استاندارد استفاده شد. سطح MDA بر اساس نانومول/میلی گرم پروتئین گزارش گردید(۱۳).

اندازه گیری سطح TAC در بافت بیضه: سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در بیضه با استفاده از روش

به ۶ گروه به شرح ذیل تقسیم شدند(n=۸):

گروه کنترل: هیچ دارویی دریافت نکردن.

گروه شاهد: روغن ذرت(حالل تستوسترون) را (زیرجلدی در ناحیه پوست پشت گردن) دریافت کردن و هم زمان گاواز آب مقطر(حالل عصاره) انجام شد.

گروه تستوسترون: ۳ mg/kg تستوسترون پروپیونات(زیرجلدی در ناحیه پوست پشت گردن) دریافت کردن و هم زمان گاواز آب مقطر انجام شد. دوز تستوسترون بر اساس مطالعات قبلی انتخاب گردید(۹).

گروه تستوسترون+ویتانیا: ۲۵۰ mg/kg تستوسترون و ۲۵۰ mg/kg عصاره ویتانیا کواگولانس دریافت کردن.

گروه تستوسترون+ویتانیا: ۵۰۰ mg/kg تستوسترون و ۵۰۰ mg/kg عصاره ویتانیا کواگولانس دریافت کردن.

گروه تستوسترون+ویتانیا: ۱۰۰۰ mg/kg تستوسترون و ۱۰۰۰ mg/kg عصاره ویتانیا کواگولانس دریافت کردن.

دوز انتخابی عصاره و مدت زمان مصرف بر اساس مطالعات قبلی تعیین گردید(۱۰). گاواز و تزریقات هر روز حدود ساعت ۹-۱۰ صبح به مدت ۴ هفته انجام گردید. یک روز پس از اتمام گاواز و تزریق، همه حیوانات وزن و پس از بیهوشی عمیق با کلروفرم، نخاعی و کشته شدند. پس از ایجاد شکاف در قسمت تحتانی شکم، بیضه و اپیدیدیم هر دو سمت خارج گردیدند. بیضه ها با ترازوی سارتوریوس(MSE224S-000-DU) ساخت شرکت سارتوریوس آلمان) با دقت ۰/۰۰۰۱ گرم وزن شدند و بیضه راست جهت انجام آنالیزهای بیوشیمیایی در دمای ۷۰ - درجه سانتی گراد منجمد گردید.

کلیه اقدامات انجام شده بر روی حیوانات بر اساس چک لیست قوانین حمایت و کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکی انجام گردید. کلیات طرح انجام شده به تائید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رسید.

(۵±۰/۳) و شاهد(۵±۰/۳) کاهش داشت($P<0.001$). میانگین تعداد اسپرم فقط در گروه دریافت کننده دوز ۵۰۰ ($۳/۹±۰/۱$) و ۱۰۰۰ میلی گرم ($۴/۴±۰/۲$) از عصاره نسبت به گروه تستوسترون افزایش معنی داری را نشان داد($P<0.05$). نمودار شماره ۲-A. کاهش درصد قابلیت حیات اسپرم در گروه تستوسترون($۷۰/۵±۲$) نسبت به گروه کنترل ($۸۵/۱±۲/۸$) و شاهد($۸/۶±۱/۸$) از نظر آماری معنی دار بود($P<0.05$) اما در گروه دریافت کننده دوزهای ۲۵۰ ($۶۹/۳±۳/۲$) و ۵۰۰ ($۷۱/۳±۴/۳$) میلی گرم تفاوت معنی داری از نظر آماری نسبت به گروه تستوسترون مشاهده نشد($P>0.05$). نمودار شماره ۲-B. تیمار با عصاره ویتانیا به میزان (۱۰۰۰ mg/kg) باعث افزایش معنی دار ($P<0.05$) درصد قابلیت حیات اسپرم نسبت به گروه تستوسترون گردید(نمودار شماره ۲-B).

تأثیر عصاره ویتانیا بر سطح MDA بافت بیضه: نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار($P<0.001$) سطح مالون دی آلدئید در گروه تستوسترون($۸/۵±۰/۳$) ($۵/۶±۰/۷$) نسبت به گروه کنترل($۵/۵±۰/۶$) و شاهد($۵/۷±۰/۷$) می باشد. سطح مالون دی آلدئید در گروه های تیمار شده با دوزهای ۵۰۰ ($۷±۰/۵$) و ۱۰۰۰ گرم($۶±۰/۳$) از عصاره کاهش معنی داری را نسبت به گروه تستوسترون نشان داد($P<0.01$). نمودار شماره ۳-A.

تأثیر عصاره ویتانیا بر سطح TAC بافت بیضه: نتایج حاصل از تاثیر عصاره ویتانیا کواگولانس بر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل نشان دهنده کاهش معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در گروه تستوسترون($۱۵۰±۷$) نسبت به گروه کنترل($۲۵۰±۲۵$) و شاهد($۲۳۵±۲۰$) می باشد($P<0.001$). گواز عصاره به مدت ۴ هفته باعث افزایش معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در بیضه گروه های دریافت کننده دوزهای ۵۰۰ ($۵±۰/۱۰$) و ۱۰۰۰ میلی گرم($۲۱۰±۱۲$) گردید($P<0.01$), اما در گروه های تیمار شده با دوز ۲۵۰ میلی گرم($۱۵۵±۲۰$) از عصاره تغییر آماری معنی داری نسبت به گروه تستوسترون مشاهده نگردید($P>0.05$). نمودار شماره ۳-B.


FRAP انجام شد. اساس این روش به صورت است که کمپلکس فریک تری پایریدیل تریازین(TPTZ) ساخت شرکت سیگما امریکا) توسط آنتی اکسیدان های نمونه احیاء شده و به فرم فروس در می آید که به رنگ آبی تیره است و شدت آن در دستگاه اسپکتروفوتومتر با طول موج ۵۹۳ قابل اندازه گیری است. محلول کار توسط مخلوط کردن ۱۰ جرم از بافرفسفات($۰/۰$ مولار) با ۱ جرم از TPTZ ۱۰ میلی مولار در اسید کلریدریک(۴۰ میلی مولار) تهیه گردید. سپس ۱ سی سی محلول کلرید آهن III (۲۰ میلی مولار بر لیتر) به آن اضافه شد. ۵۰ میکرولیتر از محلول هموژن بیضه به $۱/۵$ سی سی از محلول فوق اضافه و در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه انکوبه گردید. میزان جذب رنگ آبی در طول موج ۵۹۳ نانومتر خوانده شد. از سولفات آهن(Feso4) به عنوان معرف استاندارد استفاده گردید.^{۱۴)}

آنالیز آماری: جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel نسخه ۲۰۱۰ استفاده شد. اختلاف بین گروه ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی مقایسه شدند. داده ها به شکل Mean \pm SEM نشان داده شدند. اختلاف میانگین ها در سطح $P<0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.


یافته های پژوهش

تأثیر عصاره ویتانیا بر شاخص گونادوسوماتیک: میانگین شاخص گونادوسوماتیک در گروه تستوسترون ($۱/۳۱±۰/۱$) به طور معنی داری کاهش نشان داد($P<0.001$). این میانگین در دوزهای ۵۰۰ ($۵±۰/۰۳$) و ۱۰۰۰ میلی گرم($۱/۰۴±۰/۱$) از عصاره افزایش معنی داری نسبت به گروه تستوسترون داشت($P<0.01$). در حالی که میانگین شاخص گونادوسوماتیک بین گروه تستوسترون و تیمار با دوز $۰/۰۷±۰/۰۷$ ($۲۵±۰/۰$ mg/kg) از عصاره از نظر آماری معنی دار نبود($P>0.05$). نمودار شماره ۱.


تأثیر عصاره ویتانیا بر تعداد و قابلیت حیات اسپرم: بررسی میانگین شمارش اسپرم ها در گروه دریافت کننده تستوسترون($۳/۲±۰/۰۳$) نسبت به گروه کنترل



نمودار شماره ۱. اثر عصاره ویتامین کواگولانس با دوزهای ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم، بر شاخص گونادوسوماتیک در رت به دنبال تزریق تستوسترون در گروه های مورد مطالعه. تجویز عصاره به صورت وابسته به دور باعث افزایش شاخص گونادوسوماتیک گردید. نتایج به صورت $\text{Mean} \pm \text{SEM}$ گزارش شده است ($n=8$). $*P<0.001$ اختلاف معنی دار با گروه کنترل، $**P<0.01$ اختلاف معنی دار با گروه تستوسترون.



نمودار شماره ۲. اثر عصاره ویتامین کواگولانس با دوزهای ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم، بر تعداد اسپرم (A) و قابلیت حیات اسپرم (B) در رت به دنبال تزریق تستوسترون در گروه های مورد مطالعه. عصاره ویتامین در بالاترین دوز باعث افزایش تعداد و قابلیت درصد حیات اسپرم گردید. نتایج به صورت $\text{Mean} \pm \text{SEM}$ گزارش شده است ($n=8$). $*P<0.001$ اختلاف معنی دار با گروه کنترل، $**P<0.05$ اختلاف معنی دار با گروه تستوسترون.



نمودار شماره ۳. اثر عصاره ویتانيا کواگولانس با دوزهای ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم، بر سطح مالون دی آلدیید(A) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل(B) در بافت بیضه رت به دنبال تزریق تستوسترون در گروه های مورد مطالعه. عصاره ویتانيا به صورت وابسته به دوز باعث کاهش سطح MDA و افزایش سطح TAC گردید. نتایج به صورت $\text{Mean} \pm \text{SEM}$ گزارش شده است(n=8).

* اختلاف معنی دار با گروه کنترل، **P<0.01

تستوسترون می باشد که احتمالاً این کاهش را می توان ناشی از کاهش سلول های سرتولی و لایدیگ و هم چنین کاهش ضخامت اپیتیلیوم لوله های منی ساز دانست(۱۷).

از طرفی در مطالعه حاضر گلاؤژر عصاره ویتانيا کواگولانس به مدت ۴ هفته به صورت وابسته به دوز مانع کاهش وزن بیضه ها گردید. نتیجه تحقیق Kumar و همکاران نشان داد عصاره ویتانيا باعث جلوگیری از تخریب لوله های اسپرم ساز و ترمیم اپیتیلیوم لوله ها در بیضه موش هایی که در معرض اندوسولفان قرار گرفته بودند می شود(۱۸).

یکی از ترکیبات اصلی گیاه ویتانيا، ویتانولیدها می باشند. این ترکیبات به عنوان هورمون های گیاهی قادرند با اشغال کردن گیرنده های سطح سلول از اتصال هورمون های حیوانی به رسپتورهای سلولی جلوگیری و در نتیجه مانع تاثیر هورمون ها و عملکرد آن ها شوند(۴).

در مطالعه حاضر احتمالاً ویتانولیدهای موجود در عصاره ویتانيا کواگولانس با ممانعت از باند شدن

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد درمان با عصاره آبی الکلی ویتانيا در رت های دریافت کننده تستوسترون به صورت وابسته به دوز از کاهش وزن بیضه و تعداد اسپرم جلوگیری کرد هم چنین باعث بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی بافت بیضه در دوزهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم گردید.

تستوسترون برونزاد با مهار ترشح LH و FSH در هیپوتالاموس باعث کاهش سطح تستوسترون و کاهش اسپرم زایی و وزن بیضه می شود(۲). در پژوهش انجام شده توسط Hijazi و همکاران تزریق تستوسترون باعث تغییرات چشمگیر در بافت بیضه، مانند آتروفی و کاهش ارتفاع اپیتیلیوم لوله های اسپرم ساز و کاهش سلول های لایدیگ شد(۱۵). هم چنین سطح تولید روزانه اسپرم(DSP) تعداد سلول های سرتولی، حجم و وزن بیضه در موش کاهش قابل توجهی را نشان داد(۱۶).

نتایج تحقیق حاضر نیز نشان دهنده کاهش شاخص گونادوسوماتیک(نشانگر وزن بیضه) به دنبال تزریق

آنتی اکسیدانی است و باعث کاهش سطح پراکسیداسیون لیپیدی می شود(۲۳). پراکسیداسیون لیپیدها یکی از صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو می باشد. ثابت شده است که سطح فیزیولوژیکی گونه های فعال اکسیژن(ROS) جهت عملکرد طبیعی اسپرم ضروری می باشد، اما افزایش بیش از اندازه ROS می تواند باعث افزایش میزان استرس اکسیداتیو شود که خود باعث صدمه به ماکرومولکول های غشاء مانند چربی ها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها و DNA هسته سلول گردد. غشای پلاسمایی اسپرم به دلیل دارا بودن مقادیر بالایی از اسیدهای چرب غیرراش باعث مستعد پراکسیداسیون لیپیدی می باشد بنا بر این افزایش سطح ROS می تواند منجر به آسیب غشای اسپرم، کاهش تولید، حرکت و قابلیت حیات اسپرم شود، آزمایشات انجام شده کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی و افزایش استرس اکسیداتیو را در مایع سمنیال مردان عقیم نشان داده اند. از آن جایی که تستوسترون باعث افزایش سرعت متابولیک می شود می توان انتظار داشت که افزایش سطح تستوسترون باعث ایجاد عدم تعادل بین تولید ROS و سیستم آنتی اکسیدانی شده و همین امر باعث ایجاد استرس اکسیداتیو می گردد. از طرفی تزریق تستوسترون باعث کاهش سطح سوپراکسید دیسموتاز(SOD) در بیضه می گردد که به دنبال آن افزایش سطح O₂⁻ به وجود می آید. این عوامل باعث غیرفعال شدن کاتالاز(CAT) شده و نهایتاً میزان پراکسید هیدروژن(H₂O₂) در سلول افزایش می یابد. بنا بر این افزایش سطح تستوسترون با القای استرس اکسیداتیو باعث کاهش سطح آنتی اکسیدان ها در سلول می گردد(۲۴).

نتیجه مطالعه Choobineh و همکاران نشان داد تزریق تستوسترون به رت های ضایعه نخاعی باعث کاهش سطح MDA در نخاع این حیوانات می گردد(۲۴) اما نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تزریق تستوسترون باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی در بیضه رت ها می گردد این اختلاف در یافته ها به دلیل مکانیسم اثر متفاوت تستوسترون در بافت های مختلف می باشد به طوری که تستوسترون در مغز خاصیت

تستوسترون به گیرنده های سطح سلول مانع از اتصال هورمون به این گیرنده ها و ورود آن به داخل سلول شده و در نتیجه مانع از اثر آن و ایجاد فیدبک منفی و کاهش وزن بیضه ها گردیده است.

در این مطالعه تزریق تستوسترون باعث کاهش ۴۰ درصدی میانگین تعداد اسپرم و هم چنین قابلیت حیات اسپرم ها گردید و تیمار با عصاره ویتانیا کواگولانس به صورت وابسته به دوز از کاهش تعداد اسپرم جلوگیری کرد به طوری که در گروه دریافت کننده دوز بالای عصاره(۱۰۰۰ mg/kg) افزایش ۳۰ درصدی تعداد اسپرم زنده نسبت به گروه تستوسترون مشاهده گردید، این نتایج می تواند احتمالاً به دلیل اثرات محافظتی آنتی اکسیدانی عصاره در مقابل آسیب رادیکال های ایجاد شده به اسپرم ها باشد که با نتیجه مطالعه Ahmad و همکاران هم خوانی دارد(۱۹).

Mahdi و همکاران با مطالعه اثر عصاره ویتانیا بر کیفیت و تعداد اسپرم مردان نابارور گزارش نمودند عصاره ویتانیا قادر به درمان الیگو اسپرمی و بهبود کیفیت اسپرم در این مردان می باشد(۲۰). هم چنین نشان داده شده است عصاره ویتانیا با افزایش میزان ترشح گونادو تروپین ها باعث افزایش تعداد اسپرم می شود(۲۱). توانایی حیات و تحرك اسپرم وابسته به میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی در پلاسمای منی می باشد و گیاهان دارویی با خاصیت آنتی اکسیدانی قادر به ایجاد این اثر می باشند و احتمالاً عصاره ویتانیا با داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی به خصوص ویتافرین A باعث بهبود کیفیت و کمیت اسپرم می گردد. از طرفی تحقیق دیگری نشان داد تجویز ۵۰ میلی گرم عصاره الکلی ویتانیا به مدت ۶۰ روز باعث کاهش تعداد و حرکت اسپرم هم چنین کاهش ضخامت اپیتلیوم لوله های اسپرم ساز در موش می گردد(۲۲). اما در مطالعه حاضر تجویز عصاره آبی الکلی ویتانیا به میزان ۱۰۰۰ میلی گرم به مدت ۴ هفته باعث افزایش تعداد و توانایی حیات اسپرم گردید، این اختلاف در نتایج را می توان احتمالاً به دلیل تفاوت در روش آماده سازی، نوع عصاره هم چنین دوز و مدت زمان تجویز عصاره دانست. ویتانیا کواگولانس با داشتن ترکیبات فلاونوئیدی و ویتانولیدی دارای اثرات

می تواند مانع کاهش تعداد اسپرم، آترووفی بیضه و افزایش MDA و هم چنین مانع کاهش سطح TAC در بافت بیضه موش ها گردد و این عوامل می تواند دلیل بر تاثیر این عصاره بر بهبود پارامترهای باروری در موش باشد.

با جمع بندی از نتایج تحقیقات فوق می توان به این نتیجه رسید که ترکیبات موجود در عصاره ویتانیا کواگولانس با تقویت سیستم آنتی اکسیدانی باعث کاهش عوارض استرس اکسیداتیو و صدمات ناشی از آن بر پارامترهای باروری در موش می گردد و شاید بتوان از این گیاه در درمان ناباروری و هم چنین عوارض ناشی از تزریق تستوسترون استفاده کرد.

سپاسگزاری

این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه (۷۴۴۶) خانم عذرًا خواجهی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد که بودجه آن توسط معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تأمین شد. هم چنین بدین وسیله از پرسنل مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قدردانی می شود.

آنتی اکسیدانی از خود نشان می دهد که احتمالاً به دلیل اثر متقابل کربن های غیراشباع تستوسترون و گروه های OH با رادیکال های آزاد می باشد اما در بیضه و پروستات خاصیت پرواکسیدانی دارد(۲۵). در TAC مطالعه حاضر تزریق تستوسترون باعث کاهش به میزان ۴۰ درصد نسبت به گروه کنترل در بافت بیضه موش ها گردید. در مطالعه Tothova و همکاران نیز بیان شد تستوسترون برونزاد باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و هم چنین کاهش سطح TAC در بیضه موش می شود که همسو با نتایج حاصل از مطالعه حاضر می باشد(۲۶).

در مطالعه ای دیگر نشان داده شد عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگولانس با جلوگیری از تکثیر سلولی و القاء آپوپتوز در سلول های پروستات و هم چنین کاهش سطح MDA باعث بهبود بزرگی خوش خیم پروستات در رت می شود(۱۰). هم چنین Ahmad و همکاران در سال ۲۰۱۰ نشان دادند عصاره ویتانیا باعث بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی مایع منی و افزایش تعداد اسپرم در مردان نابارور می شود(۱۹). نتیجه مطالعه حاضر نیز تائید نمود عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگولانس

References

- Purushottamachar P, Njar VC. A new simple and high yield synthesis of 5 α -dihydrotestosterone a potent androgen receptor agonist. *Steroids* 2012;77:1530-4. Doi:10.1016/j.steroids.2012.09.003.
- Zhang XW, Zhang C, Zhang W, Yang D, Meng S, Wang P, et al. Suppression of spermatogenesis by testosterone undecanoate-loaded injectable in situ forming implants in adult male rats. *Asian J Androl* 2016;18:791-7. Doi: 10.4103/1008-682X.160886.
- Wang C, Swerdloff RS. Hormonal approaches to male contraception. *Curr Opin Urol* 2010;20:520-4. Doi: 10.1097/MOU.0b013e32833f1b4a.
- Khodaei M, Jafari M, Noori M. Remedial use of withanolides from *Withania coagulans* stocks dunal. *Adv Life Sci* 2012;2:6-19. Doi:10.5923/j.als.20120201.02.
- Ambiye VR, Langade D, Dongre S, Aptikar P, Kulkarni M, Dongre A. Clinical evaluation of the spermatogenic activity of the Root extract of Ashwagandha *Withania somnifera* in oligospermic males a pilot study. *Evid Bas Comple Alte Med* 2013;2:22-8. Doi:10.1155/2013/571420.
- Qarawi A, Abdelrahman H, Badry A, Harraz F, Razig N, Abdelmagied E. The effect of extracts of *Cynomorium coccineum* and *Withania somnifera* on Gonadotrophins and ovarian follicles of immature wistar Rats. *Phytother Res* 2000;14:288-90.
- Kiasalari Z, Khalili M, Aghaei M. Effect of *withania somnifera* on levels of sex hormones in the diabetic male rats. *Iran J Reprod Med* 2009;7: 163-8.
- Sarbishegi M, Heidari Z, Mahmoudzadehsagheb H, Valizadeh M, Doostkami M. Neuroprotective effects of *Withania coagulans* Root extract on CA1 hippocampus following cerebral ischemia in Rats. *Avicenna J Phytomed* 2016;6:399-409.

- 9.Nahata A, Dixit V. Ameliorative effects of stinging nettle *Urtica dioica* on testosterone-induced prostatic hyperplasia in Rats. *Andrologia* 2012;44:396-409. Doi:10.1111/j.1439-0272.2011.01197.x.
- 10.Sarbishegi M, Khani M, Salimi S, Valizadeh M, Aval FS. Antiproliferative and Antioxidant Effects of *Withania coagulans* Extract on Benign Prostatic Hyperplasia in Rats. *Nephrourol Mon* 2016;8:33180. Doi: 10.5812/numonthly.33180.
- 11.Amini M, Roghani M, Shirinbayan P, Joghataei MT, Farhoudian A, Roshanpajouh M, et al. [Effects of Kerack used in addict Iranian people on fertility of adult mice]. *Tehran Uni Med J* 2013; 71: 293-302.(Persian)
- 12.Parhizkar S, Zulkifli SB, Dollah MA. Testicular morphology of male rats exposed to *Phaleria macrocarpa* Mahkota dewa aqueous extract. *Iran J Bas Med Sci* 2014;17:384-90.
- 13.Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. *Anal Biochem* 1979;95:351-8. Doi:10.1016/0003-2697(79)90738-3.
- 14.Thaipong K, Boonprakob U, Crosby K, Cisneros L, Byrne DH. Comparison of ABTS and DPPH and FRAP and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. *J Food Compos Anal* 2006;19:669-75. Doi:10.1016/j.jfca.2006.01.003.
15. Hijazi MM, Azmi MA, Hussain A, Naqvi S, Perveen R, Hijazi S. Androgenic anabolic steroid-based effects on the morphology of testicular structures of albino rats. *Pakistan J Zool* 2012;44:1529-37.
- 16.Khalilzadeh B, Tabrizi AD, Safavi E. Comparative survey of testosterone enanthate and nandrolonedecanoate administration on the number and function of sperms in Rat. *Bull Env Pharmacol Life Sci* 2013;3:42-5.
- 17.Morovvati H, Najafzadehvarzi H, Rashidi K. [Effect of *urtica dioica* extract on histological and histometrical changes of testis of Hamster after testosterone administration]. *Zahedan J Res Med Sci* 2013;15:4-8. (Persian)
- 8.Kumar R, Das S, Nanda I, Kumar A, Ali M, Nath A, et al. To study bioremedial effect of *Withania somnifera* on sperm count and seminiferous tubules of endosulfan exposed Mice. *Global J Trad Med Sys* 2012;1:16-20.
- 19.Ahmad MK, Mahdi AA, Shukla KK, Islam N, Rajender S, Madhukar D, et al. *Withania somnifera* improves semen quality by regulating reproductive hormone levels and oxidative stress in seminal plasma of infertile males. *Fertil Steril* 2010;94:989-96. Doi:10.1016/j.fertnstert.2009.04.046.
- 20.Mahdi AA, Shukla KK, Ahmad MK, Rajender S, Shankhwar SN, Singh V, et al. *Withania somnifera* improves semen quality in stress-related male fertility. *Evid Bas Comple Alte Med* 2011;2011. Doi:10.1093/ecam/nep138.
- 21.Kataria H, Gupta M, Lakhman S, Kaur G. *Withania somnifera* aqueous extract facilitates the expression and release of GnRH: in vitro and in vivo study. *Neurochem Int* 2015;89:111-9. Doi:10.1016/j.neuint.2015.08.001.
- 22.Singh AR, Singh K, Shekhawat PS. Spermicidal activity and antifertility activity of ethanolic extract of *Withania somnifera* in male albino rats. *Int J Pharm Sci Rev Res* 2013;21:227-32.
- 23.Shukla K, Dikshit P, Shukla R, Gambhir JK. The aqueous extract of *Withania coagulans* fruit partially reverses nicotinamide/streptozotocin induced diabetes mellitus in Rats. *J Med Food* 2012;15:718-25. oi:10.1089/jmf.2011.1829.
- 24.Choobineh H, Gilani MAS, Pasalar P, Jahanzad I, Ghorbani R, Hassanzadeh G. The effects of testosterone on oxidative stress markers in Mice with spinal cord injuries. *Int J Fertil Steril* 2016;10:87-93. Doi: 10.22074/ijfs.2016.4773.
- 25.Guzman DC, Mejia GB, Vazquez IE, Garcia EH, del Angel DS, Olguin HJ. Effect of testosterone and steroids homologues on indolamines and lipid peroxidation in Rat brain. *J Steroid Biochem* 2005;94:369-73. Doi:10.1016/j.jsbmb.2004.11.006.
- 26.Tothova L, Celec P, Ostatnikova D, Okuliarova M, Zeman M, Hodosy J. Effect of exogenous testosterone on oxidative status of the testes in adult male rats. *Andrologia* 2013;45:417-23. Doi:10.1111/and.12032.

The Effects of Hydro-Alcoholic Extract of *Withania coagulans* on Antioxidant Status and Sperm Parameters Following Testosterone Administration in Rat

Sarbishegi M¹, Khajavi O^{1*}

(Received: December 12, 2017)

Accepted: February 24, 2018)

Abstract

Introduction: Enhancement of testosterone levels or using improperly and arbitrarily of testosterone can disrupt fertility. Today, the use of medicinal herbs for the treatment of hormonal disorders and infertility has been considered. In the present study, the effects of hydro-alcoholic extract of *Withania coagulans* (WCE) on sperm count and viability, gonadosomatic index, malondialdehyde(MDA) level and total antioxidant capacity(TAC) were investigated in testis of rats following testosterone injection.

Materials and methods: In the current experimental study, 48 male Wistar rats were divided into 6 groups ($n = 8$). Control, Sham, Testosterone propionate (TP), and 3 TP treated with WCE (250, 500, and 1000 mg/kg/day). TP 3 mg/kg/body weight was injected subcutaneously and vehicle or WCE was administrated by oral gavage for 4 weeks. At the end of the gonadosomatic

index, sperm count and viability, MDA and TAC level were measured.

Finding: The results showed a significant decrease in gonadosomatic index, sperm count, sperm viability and TAC level and increase in MDA level in TP group compared to control group ($p < 0.001$). WCE significantly improved the sperm qualitative parameters and TAC, and decreased MDA level in the treated groups as dose dependently ($P < 0.05$).

Discussion & Conclusion: It seems *Withania coagulans* extract could improve the fertility parameters, and might be useful to treat infertility problems although more research is required.

Keywords: *Withania coagulans*, Testosterone, Total antioxidant capacity, Malondialdehyde, Rat.

1. Dept of Anatomy, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

*Corresponding author E mail: ozrakhajavi@gmail.com