

## ◆ تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مقادیر لپتین و آنزیم‌های کبدی در پسران چاق

\* مصصومه حسینی<sup>۱</sup>، شهریار نادری<sup>۱</sup>، سید‌کاظم موسوی ساداتی<sup>۲</sup>، شاهین ریاحی ملایری<sup>۱</sup>

- (۱) گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
 (۲) گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۸/۱۳

### چکیده

**مقدمه:** چاقی عارضه پیجیده‌ای است که با تجمع بیش از حد بافت چربی نمود پیدا می‌کند. لپتین هورمونی پیتیدی است که عمدتاً توسط بافت چربی ترشح شده و در تنظیم وزن بدن و چاقی موثر است. هدف پژوهش حاضر تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مقادیر لپتین و آنزیم‌های کبدی در پسران چاق و دارای اضافه وزن بود.

**مواد و روش‌ها:** در این پژوهش نیمه تجربی ۲۲ پسر(۱۱ سانتی متر، ۱۶۴/۴۳±۵/۱۱) سال) به صورت داوطلبانه انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی(n=11) قرار گرفتند. برنامه تمرین گروه تجربی شامل هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه ۴۰ دقیقه شامل ۱۰ سرت رکاب زدن به مدت ۶۰ ثانیه بر روی دوچرخه ثابت با شدت ۸۰ درصد ضربان قلب ذخیره بود. نمونه‌های خونی ۲۴ ساعت قبل و ۴۸ ساعت پس از برنامه تمرینی در حالت ناشتا گرفته شد. متغیرهای لپتین، آسپارتات آمینوتانسپراز(AST)، آلانین آمینوتانسپراز(ALT) و آکالالین فسفاتاز(ALP) با استفاده از روش‌های اخصاصی اندازه گیری شدند. درصد چربی بدن، BMI و VO2max در پیش و پس آزمون ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی، از آزمون آنالیز کوواریانس استفاده شد.

**یافته‌های پژوهش:** در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مقادیر آنزیم ALT و درصد چربی بدن کاهش و حداقل اکسیژن مصرفی افزایش معناداری داشت( $P<0.05$ ). مقادیر لپتین، آنزیم‌های AST و ALP کاهش یافت اما معنادار نبود( $P>0.05$ ).

**بحث و نتیجه گیری:** تمرینات تناوبی شدید بر روی دوچرخه ثابت می‌تواند راهبرد تمرینی مناسبی برای کاهش غلظت پلاسمایی ALT و درصد چربی بدن پسران چاق و دارای اضافه وزن باشد. با این حال برای دستیابی به نتایج مطلوب دوره مداخله باید طولانی تر باشد.

**واژه‌های کلیدی:** پسران چاق، تمرین تناوبی، لپتین

\* نویسنده مسئول: گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Email: [mhbisadi@yahoo.com](mailto:mhbisadi@yahoo.com)

Copyright © 2019 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits copy and redistribute the material, in any medium or format, provided the original work is properly cited.

## مقدمه

چاقی، اضافه وزن، دیابت و بیماری های قلبی- عروقی افزایش می یابد. پژوهشگران معتقدند ارتباط و همبستگی بالایی بین میزان چربی بدن و لپتین سرم وجود دارد. سطوح این پیتید در کودکان و نوجوانان چاق، ۴ تا ۵ برابر بالاتر از کودکان با وزن طبیعی می باشد(۶). تمرينات منظم کوتاه و طولانی مدت با بر هم زدن تعادل انرژی، باعث کاهش در ریتم ترشح شبانه روزی لپتین می گردد. در پژوهشی که توسط کاراکبی(۲۰۰۹) بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به چاقی کودکان چاق انجام شد، ۱۲ هفته شرکت در تمرينات دویدن هوازی منجر به کاهش شاخص توده بدنی ، سطوح لپتین و درصد چربی گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد(۶).

مارسینکو و همکاران(۲۰۱۵) دریافتند اجرای ۶ هفته تمرين های تناوبی شدید به کاهش معنی دار سطح لپتین منجر می شود(۷). در مقابل کین و همکاران(۲۰۱۰)، مشاهده کردند ۴۰ روز تمرين های شدید تناوبی با افزایش سطح لپتین همراه بوده است(۸). لوندز و همکاران(۲۰۰۸) نیز بر عدم تغییر معنی دار غلظت لپتین پس از اجرای تمرين های ورزشی با شدت متوسط اذعان داشتند(۹).

کبد چرب، بیماری نسبتاً خاموشی است که گاهی با افزایش آنزیم های کبدی خود را نشان می دهد. عدم تحرك، چاقی و کمبود آنتی اکسیدان در رژیم غذایی، از علل اصلی بیماری کبد چرب غیرالکلی به شمار می رود(۱۰). آنزیم های آسپارتات آمینوتранسفراز، آلانین آمینوتранسفراز و آکالالین فسفاتاز به طور متداول در بیماری های کبد اندازه گیری شده و در تشخیص این بیماری به کار می روند(۱۰). برخی از مطالعات نشان می دهد، تمرينات هوازی منظم موجب توسعه شاخص های متابولیکی همراه با بهبود عارضه کبد چرب غیرالکلی می شود(۱۱). نتایج پژوهشی که توسط اسلنتر(۲۰۱۱) بر روی آزمودنی های چاق و دارای اضافه وزن انجام شد نشان داد، تمرينات هوازی تداومی سبب کاهش وزن، چربی احشایی، چربی کبد و آنزیم های ALT و AST این افراد می گردد(۱۲).

برنامه های تمرينی طراحی شده برای کاهش وزن، به طور عمده بر اجرای پروتکل های تمرينی یکنواخت

چاقی کودکان به عنوان مشکلی مزمن است که سلامت آن ها را به خطر می اندازد و عامل زمینه ای برای بروز چاقی در بزرگسالی و افزایش خطر بروز بیماری های مزمن است(۱). علل چاقی در کودکان ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی است که از آن جمله می توان به افزایش کالری دریافتی، بی تحرکی، بیماری های غدد، ژنتیک و مصرف داروها اشاره کرد(۱،۲). با افزایش توده چربی بدن، خطر ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی، دیابت نوع ۲، سکته مغزی، اختلالات چربی خون و سلطان افزایش می یابد. علاوه بر این چاقی می تواند با عوامل خطرزای دیگری مانند کلسترول و لیپید بالا در ارتباط باشد(۱،۳). اگر چه محدودیت کالری و رژیم غذایی یکی از مداخله های درمانی اصلی در کنترل وزن به حساب می آید؛ پژوهش ها نشان دادند برنامه های ورزشی در کاهش توده چربی، افزایش توده بدون چربی و افزایش آمادگی جسمانی بدن نقش دارند(۳). کودکان و نوجوانان(۲-۱۸ سال) که شاخص توده بدنی بالاتر از صدک ۹۵ دارند (با توجه به سن و جنس) چاق بوده و آن هایی که شاخص توده بدنی بین ۸۵ الی ۹۵ دارند اضافه وزن داشته و در معرض خطر چاقی هستند(۳).

یکی از مهم ترین شاخص ها برای نشان دادن مقدار بافت چربی بدن، غلظت لپتین سرم است. لپتین پیتیدی است که عمدتاً در بافت چربی سفید تولید و از آن ترشح می شود، اما شواهدی نشان می دهد که لپتین در عضلات اسکلتی، سلول های اندوتیال معده، مغز و جفت نیز تولید می شود(۴). از مهم ترین اثرات چاقی می توان به افزایش توده چربی بدن و افزایش غلظت سرمی لپتین اشاره کرد. لپتین نقش مهمی را در تنظیم هموستاز انرژی انسان ایفا می کند و به عنوان پیام رسان چربی برای تنظیم بلند مدت وزن بدن به وسیله مغز در نظر گرفته می شود که این عمل را با کاهش اشتها و افزایش میزان انرژی در دسترس به وسیله بدن انجام می دهد(۴). لپتین در تولید لخته و ایجاد فشارخون بالا نقش دارد، به طوری که افزایش آن در خون عامل خطر مستقلی برای اولین سکته قلبی در اثر ایسکمی است(۵). سطح لپتین پلاسمما در شرایط

طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی (۱۱ نفر در هر گروه) تقسیم شدند. معیارهای ورود آزمودنی‌ها به پروتکل تحقیق بنا بر تایید پزشک مربوطه شامل برخورداری از سلامت فیزیکی، نداشتن بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت، فشارخون و سایر بیماری‌ها، و قرار داشتن در دامنه شاخص توده بدنی ۲۵-۳۴، هم چنین معیارهای خروج شامل مصرف دارو، مکمل، سیگار و الکل و شرکت در برنامه تمرینی حداقل ۳ ماه پیش از شرکت در برنامه تمرینات این تحقیق بود. اطلاعات لازم درباره ماهیت و نحوه اجرای تحقیق، خطرات احتمالی و نکات ضروری جهت شرکت در تحقیق به صورت شفاهی به آن‌ها داده شده و رضایت نامه کتبی از آنان و خانواده‌هایشان اخذ گردید. آزمودنی‌ها پس از انجام معاینات لازم توسط پزشک عمومی، مجوز ورود به طرح را کسب کردند. رعایت کامل ملاحظات اخلاقی (محرمانه بودن اطلاعات آزمودنی‌ها، اختیار کامل آزمودنی‌ها برای خارج شدن از مطالعه در هر مرحله) اجرا گردید.

طول قد آزمودنی‌ها با استفاده از قدستجو سکا مدل ۲۱۳ ساخت کشور آلمان با دقیق ۱ میلی متر و میزان وزن و درصد چربی آزمودنی‌ها با استفاده از دستگاه بادی کامپوزیشن بور مدل BF66 ساخت کشور آلمان ارزیابی شد. قبل و پس از پروتکل تحقیق، آزمودنی‌ها با لباس نازک ورزشی، بدون کفش بر روی دستگاه قرار گرفته و پس از وارد کردن مشخصاتی مثل قد، سن و جنس برای چند ثانیه بدون حرکت ایستادند، سپس مقادیر وزن و درصد چربی بدن به وسیله کارشناس ورزشی ثبت گردید.

شاخص توده بدنی آزمودنی‌ها از طریق فرمول زیر محاسبه شد و طبق جدول BMI نوجوانان (پلوومن) ارزیابی شد: محدوده قد(متر)/وزن بدن (kg).  $BMI = \frac{kg}{m^2}$  (۱۵).

جدول شماره ۱ نشان دهنده پروتکل تمرینی گروه تجربی می‌باشد.

و تداومی با شدت متوسط در جلسات ۳۰ دقیقه ای تأکید دارند که با کاهش ناچیز در محتوای چربی بدن همراه می‌باشد. از آن‌جا که در تمرينات های تناوبی با گنجاندن دوره های استراحت یا کاهش فعالیت بین وهله های مکرر تمرينی، امکان انجام کار بیشتر در خلال تمرين وجود دارد، ممکن است تمرينات های تناوبی در مقایسه با تمرينات های تداومی گرینه مناسب تری برای کاهش وزن باشند (۱۳).

با توجه به نقش چاقی در وقوع بیماری‌های مزمن و ناتوان کننده و نقش ورزش و فعالیت بدنی در کنترل بافت چربی و بیماری‌ها و توصیه کالج پزشکی ورزشی آمریکا مبنی بر انجام تمرينات ورزشی به شیوه متناسب و کمبود تحقیقی در زمینه تاثیر تمرينات تناوبی با شدت بالا بر مقادیر لپتین و آنزیم‌های کبدی، بیشتر مطالعات، تمرينات تداومی طولانی مدت و تمرينات مقاومتی را مورد بررسی قرار داده اند، هم چنین وجود تناقض در نتایج تحقیقات گذشته و ضرورت دستیابی به اطلاعات دقیق تر برای تدوین برنامه‌های تمرینی مناسب در کنترل چاقی و تعديل هموستاز انرژی در جهت ارتقاء سلامت ارگان‌های بدن محقق در نظر دارد تا به بررسی تاثیر تمرينات تناوبی با شدت بالا بر مقادیر لپتین و آنزیم‌های کبدی در پسران چاق و دارای اضافه وزن پردازد.

## مواد و روش‌ها

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه کنترل و تجربی بود که در بهار سال ۹۶ انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، پسران با دامنه شاخص توده بدنی ۲۵ تا ۳۵ که در تقسیم بندی محدوده وزن سلامت، چاق و دارای اضافه وزن محسوب می‌شوند از منطقه شهر ری تهران بودند که ۲۲ پسر (۱۶۴/۴۳±۵/۱۱ سانتی متر،  $BMI = ۲۹/۲۲۷\pm ۴/۰۹$  کیلوگرم،  $74/0.2\pm 12/34$  سال) بر اساس جدول کوهن (۱۴) به عنوان نمونه آماری به صورت داوطلبانه انتخاب شده و به

جدول شماره ۱. پروتکل تمرين گروه تجربی

نوع پروتکل	شدت فعالیت	زمان کل فعالیت	تعداد سنتها	مدت زمان هر سنت	مدت استراحت بین سنتها	
تمرين تناوبی	۸۰ درصد	۴۰ دقیقه	۱۰ سنت	۶۰ ثانیه	۶۰ ثانیه	

ضربان قلب استراحت+(درصد شدت تعیین شده×ضربان قلب ذخیره)  
در انتهای ۴ هفته اول، ضربان قلب استراحتی آزمودنی ها دوباره محاسبه شده و برنامه تمرينی ۴ هفته دوم بر اساس ضربان سازش یافته ۴ هفته اول برنامه ریزی شد. کنترل ضربان قلب در حین تمرينات توسط ساعت ضربان سنج پولار مدل m ۴۰۰ ساخت کشور آلمان انجام شد. حداقل اکسیژن مصرفی با استفاده از آزمون یک مایل دویدن و راه رفت(کورتون ۸-۱۲ سال) ارزیابی شد. روش محاسبه به این صورت بود که آزمودنی ها ۱ مایل(۳۵۰ متر) را در سالن ورزشی دور زمین هندبال(حدود ۱۴ دور) دویدند و در پایان، زمان دویدن در برگه ثبت شده و طبق فرمول زیر مقدار  $vo2max$  محاسبه شد(۱۷):

برنامه تمرينی گروه تجربی، شامل هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت ۴۰ دقیقه بود. ابتدا ۱۰ دقیقه گرم کردن، سپس ۱۰ سنت رکاب زدن تناوبی به مدت ۶۰ ثانیه بر روی دوچرخه ثابت(اسپرت تاپ مدل بی ۸۹۰ ساخت کشور تایوان) با شدت ۸۰ درصد ضربان قلب ذخیره اجرا شد. آزمودنی ها بین هر سنت رکاب زدن ۶۰ ثانیه استراحت غیر فعال کردند و در خاتمه ۱۰ دقیقه سرد کردن انجام شد(۱۶). برای محاسبه ضربان قلب هدف ابتدا حداقل ضربان قلب با استفاده از روش کارونن[سن آزمودنی =۲۰- ضربان قلب] به دست آمد. سپس ضربان قلب ذخیره از رابطه[ضربان قلب استراحت- ضربان قلب حداقل] ارزیابی شده و ضربان قلب هدف با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید(۱۶):

$$VO2Max: 10.8/94-8/41+(زمان، دقیقه)/34+(سن، جنس)/21-(سن×جنس)/84(BMI)$$

بالینی و طب آزمایشگاهی) از کیت های بایورکس فارس به ترتیب با حساسیت(IU/L) ۱ و ۲(IU/L) و برای اندازه گیری ALP به روش DGKC (استاندارد انجمن بیوشیمی آلمان) از کیست پارس آزمون با حساسیت(IU/L) ۳ بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شد. آنالیز نمونه های خونی در آزمایشگاه پژوهشگاه رویان انجام گردید. تجزیه و تحلیل آماری: بعد از تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی نمونه های خون، توصیف کمی داده ها با استفاده از شاخص های پراکنده مرکزی از قبیل میانگین و انحراف استاندارد انجام شد. جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیروویلک و برای بررسی تجانس واریانس ها از آزمون لون استفاده شد، هم چنین برای تعییرات معناداری هر یک از متغیرهای تحقیق بین گروه های مختلف از روش آنالیز کوواریانس(ANCOVA) استفاده شد. سطح معناداری

برای بررسی متغیرهای بیوشیمیایی، در دو مرحله (۲۴ ساعت قبل از شروع تمرين و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرين) پس از ۱۲-۱۴ ساعت ناشستایی، مقدار ۷ سی سی خون از سیاهرگ دست چپ هر آزمودنی در وضعیت نشسته و در حالت استراحت، توسط کارشناس آزمایشگاه گرفته شد. پس از خون گیری از آزمودنی ها، نمونه های خونی به مدت ۵ دقیقه جهت جداسازی پلاسما با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ(دستگاه Hetich ساخت آلمان) شده و در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری گردید. همه اندازه گیری ها، در شرایط یکسان ساعت ۸ الی ۹ صبح، در دمای ۲۶ الی ۲۸ درجه سانتی گراد انجام شد. جهت اندازه گیری لپتین از روش الایزا و کیت DBC با حساسیت ۵/۰ نانوگرم در میلی لیتر محصول کشور کانادا استفاده شد. برای اندازه گیری آنزیم های ALT، AST از روش IFCC (فدراسیون بین المللی شیمی

در جدول شماره ۲ مقادیر لپتین، AST، ALT، ALP، VO2max، درصد چربی بدن، BMI و وزن آزمودنی ها قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرین به صورت میانگین  $\pm$  انحراف استاندارد ارائه شده است.

برای تمام محاسبات ( $P<0.05$ ) در نظر گرفته شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ انجام گردید.

### یافته های پژوهش

جدول شماره ۲. مقایسه مقادیر متغیرهای دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از روش آنالیز کوواریانس

متغیر	گروه	گروه کنترل	گروه تمرین	معناداری (P)	F	ضریب اتا
پیش آزمون	لپتین (ng/ml)	۲۶/۹۴ $\pm$ ۱۰/۳۳	۳۴/۶۵ $\pm$ ۱۳/۶۰	۰/۶۸۵	۰/۱۷۰	۰/۰۰۹
پس آزمون	لپتین (ng/ml)	۲۲/۶۶ $\pm$ ۱۰/۳۹	۳۰/۲۵ $\pm$ ۱۲/۵۰			
پیش آزمون	AST (U/L)	۲۶/۰۸ $\pm$ ۴/۴۶	۲۳/۹۰ $\pm$ ۴/۲۸	۰/۰۴۱۴	۰/۶۹۹	۰/۰۳۵
پس آزمون	AST (U/L)	۲۴/۰۰ $\pm$ ۳/۷۱	۲۰/۳۰ $\pm$ ۵/۶۵			
پیش آزمون	ALT (U/L)	۱۹/۴۱ $\pm$ ۴/۴۶	۱۸/۲۰ $\pm$ ۳/۶۷	**۰/۰۴۲	۴/۷۶۳	۰/۲۰۰
پس آزمون	ALT (U/L)	۱۸/۲۵ $\pm$ ۴/۵۵	۱۴/۹۰ $\pm$ ۲/۳۷			
پیش آزمون	ALP (U/L)	۹۸۵/۵۰ $\pm$ ۲۷۵/۱۷	۸۷/۰۵ $\pm$ ۱۵/۰۰	۰/۰۸۰	۰/۰۵۳	۰/۰۰۳
پس آزمون	ALP (U/L)	۹۶۸/۲۵ $\pm$ ۲۰۶/۲۲	۸۵۵/۸۰ $\pm$ ۱۶۹/۵۳			
پیش آزمون	VO2max (ml.kg-1.min-1)	۳۸/۴۴ $\pm$ ۲/۷۵	۳۶/۵۶ $\pm$ ۲/۴۹	**۰/۰۳۸	۴/۹۶۱	۰/۲۰۷
پس آزمون	VO2max (ml.kg-1.min-1)	۳۹/۳۱ $\pm$ ۲/۱۶	۳۹/۵۶ $\pm$ ۲/۵۴			
پیش آزمون	درصد چربی بدن	۳۱/۶۲ $\pm$ ۴/۷۴	۳۵/۰۵ $\pm$ ۶/۳۸	**۰/۰۱۰	۸/۱۴۵	۰/۳۰۰
پس آزمون	بدن	۳۲/۴۰ $\pm$ ۱/۹۸	۳۲/۷۴ $\pm$ ۲/۸۷			
پیش آزمون	BMI [ kg/ m <sup>2</sup> ]	۲۶/۵۵ $\pm$ ۳/۰۸	۳۰/۰۷ $\pm$ ۵/۰۹	۰/۰۵۸۲	۳/۱۳	۰/۰۱۶
پس آزمون	BMI [ kg/ m <sup>2</sup> ]	۲۶/۶۰ $\pm$ ۲/۹۷	۳۰/۰۰ $\pm$ ۵/۱۲			
پیش آزمون	وزن بدن (kg)	۶۷/۵۱ $\pm$ ۷/۹۵	۸۰/۵۳ $\pm$ ۱۶/۰۸	۰/۰۷۸۷	۰/۴۱۵	۰/۰۱۸
پس آزمون	وزن بدن (kg)	۶۷/۷۰ $\pm$ ۷/۹۰	۸۰/۲۸ $\pm$ ۱۵/۹۰			

افزایش می یابد و این در حالی است که فواصل استراحتی بین تناوب های تمرینی شدید ضمن بازسازی ذخایر فسفوکراتین و میوگلوبین، با برداشت لاكتات در کاهش غلظت لاكتات خون موثر است. بنا بر این تمرین های تناوبی در مقایسه با تمرین های تداومی با نرخ کاری مشابه قادرند بدون به کارگیری سوت و ساز بی هوازی و تجمع اسیدلاکتیک، بر عضلات محیطی و ارگان های ناقل اکسیژن، فشاری بیشینه تحملی کنند(۱۸). ولی از آن جا که پاسخ های متابولیکی طی تمرین های متناوب به پاسخ های تمرین های تداومی و متوالی و با شدت متوسط، بسیار شباهت دارد، به احتمال زیاد ساز و کار تغییرات لپتین پس از تمرین های تناوبی به مثابه تغییرات آن پس از تمرین های هوازی با شدت متوسط می باشد. بنا بر این به احتمال زیاد تمرین های تناوبی(مانند تمرین های طولانی مدت) با تغییر در میزان دسترسی به مواد غذایی طی ورزش و ایجاد کسر انرژی، مسیرهای متابولیکی موثر در تنظیم بیان ژنی لپتین(مسیر احساس

نتایج پژوهش حاضر نشان داد در پی هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا مقادیر لپتین ( $P=0.685$ ) و آنزیم های AST ( $P=0.820$ ) ALP ( $P=0.414$ ) ALT ( $P=0.042$ ) و درصد چربی بدن ( $P=0.010$ ) گروه تجربی کاهش یافت که در مقایسه با گروه کنترل معنادار نبود.

مقادیر آنزیم VO2max ( $P=0.038$ ) گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنا داری یافت ( $P=0.038$ ).

### بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد در پی هشت هفته تمرین تناوبی شدید مقادیر لپتین سرم گروه تجربی کاهش یافت. بازده توانی بزرگتر در عضلات محیطی بدون تداخل با افزایش ظرفیت قلبی-تنفسی، مشخصه اصلی تمرین های تناوبی است که آن را به تمرین های تداومی ارجح می گردداند(۱۸)؛ زیرا در تمرین های تداومی پر شدت به دلیل کسر فسفوکراتین و استفاده از ذخایر اکسیژن متصل به میوگلوبین، سطح لاكتات خون

نتایج تحقیقات برخی محققان با نتایج تحقیق حاضر هم راستا نبود. ترب و همکاران(۲۰۰۸)، گزارش کردند بین کاهش سطح لپتین پلاسمما و بهبود ترکیب بدنی پس از اجرای ۱۵ هفته تمرين های تناوبی شدید ارتباط معنی دار برقرار بود(۲۲). ترتیبیان و همکاران (۱۳۹۶)، در مطالعه ای با بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرين تناوبی خیلی شدید بر غلظت لپتین و نیم رخ لیپیدی در مردان چاق غیرفعال، کاهش معنی دار لپتین و نی مرح لیپیدی را مشاهده کردند(۲۳).

بهرام و همکاران(۱۳۹۳)، با بررسی تاثیر دوازده هفته تمرين تناوبی خیلی شدید بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به چاقی دانشجویان دختر دارای اضافه وزن دریافتند، سطوح سرمی لپتین، وزن بدن و درصد چربی در گروه تجربی کاهش معناداری داشت. این محققان نتیجه گرفتند که تمرين تناوبی با شدت زیاد به عنوان یک روش غیر تهاجمی و غیر دارویی، می تواند اثر مثبتی بر کاهش مقدار لپتین و برخی عوامل وابسته به چاقی و اضافه وزن داشته باشد(۲۴). جعفری(۱۳۹۶)، نیز در مطالعه ای با بررسی تاثیر یک دوره تمرينات تناوبی سرعتی بر نوجوانان پسر غیر فعال دارای اضافه وزن، کاهش معنادار لپتین را گزارش کرد(۲۵). به نظر می رسد تفاوت در مدت پروتکل تمرينی که در اکثر تحقيقات مذکور ۱۲ هفته ای بود و تفاوت در شدت و نوع پروتکل تمرينی و تغيير در ترکيب بدن(درصد چربی بدن، وزن و شاخص توده بدن) می تواند از دلایل تفاوت نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقيقات مذکور باشد.

از دیگر نتایج تحقیق، کاهش مقادیر آنزیم های کبدی ALT، AST و ALP به دنبال هشت هفته تمرين تناوبی شدید بود اما این کاهش فقط برای آنزیم ALT معنادار شد. شمس الدینی(۱۳۹۴)، به بررسی تاثیر تمرين مقاومتی و هوایی بر آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الكلی پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که در هر دو گروه تمرين، آنزیم های ALT و AST در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت(۲۶). بیژه و همکاران(۱۳۹۱)، نیز در تحقیقی به بررسی تاثیر ۸ هفته تمرين شنا بر آنزیم های کبدی و متغيرهای هماتولوژیک در زنان جوان پرداختند. نتایج

غذا یا مسیر بیوسنتر هگزوامین) را فعال کرده و با کاهش جریان گلوکز در بافت چربی و برداشت آن توسط سلول های چربی، در تعديل غلظت لپتین موثرند(۱۹).

منیخ و همکاران(۲۰۱۵)، در تحقیقی به بررسی تاثیر ۶ هفته تمرينات مقاومتی بر ترکیب بدن، لپتین سرم و قدرت عضلانی در مردان غیرورزشکار پرداختند. یافته ها نشان داد تغیيرات لپتین سرمی و ترکیب بدن (درصد چربی و توده بدون چربی) گروه تجربی از نظر آماری معنی دار نبود. اين محققان نتيجه گرفتند که عدم تغيير ميزان لپتین سرمی به دليل عدم تغيير در درصد چربی بدن و کافي نبودن تمرين تناوبی کاظمي(۱۳۹۵)، نيزبا بررسی اثر ۶ هفته تمرين تناوبی شدید بر غلظت سرمی لپتین، گلوکز و درصد چربی بدن کشتي گيران جوان دریافت، تمرين تناوبی شدید سبب تغیيرات معنادار در سطوح لپتین و درصد چربی بدن کشتي گiran نشد(۲۱) که اين تحقيقات همراستا با نتيجه تحقیق حاضر هستند.

شواهد زيادي وجود دارد که نشان می دهد تمرينات تناوبی می تواند ترکيب بدنی را از طريق کاهش چربی بدن بهبود بخشد(۵). بخش عمده ای از اسيدهای چرب مورد نياز عضلات در حال فعالیت از طريق افرايش ۳ تا ۴ برابر ليبوليز تری گليسيريد بافت چربی تامين می شود. تمرينات تناوبی خيلی شدید، مقدار جريان خون به بافت چربی را دو برابر می کند و سبب افرايش ده برابری یا بيشتر جريان خون به عضلات فعال بدن می شود، که به عقیده بسياري از پژوهشگران، کاهش چربی بدن و بهبود ترکيب بدن به دليل بر هم خوردن تعادل بين انرژي دریافتی، مصرفی و ايجاد تعادل كالوريک منفي، ممکن است به کاهش لپتین پلاسمما منجر شود(۷). مقادير لپتین خون با مقدار بافت چربی نسبت مستقيمی دارد و همبستگي آن با توده چربی كل بدن نسبت به وزن بدن بيشتر است(۹). برخی مطالعات نشان داده اند، مکانيسم احتمالي کاهش لپتین می تواند ناشی از تاثير سيميت عصبي سمپاتيك در حين تمرين يا تاثير اپي نفرين موجود در گردن خون، با فعل کردن آنزيم ليباز و کاهش حجم سلول های چربی و افرايش حساسيت گيرنده ها به لپتین باشد(۷،۲۱).

و هم چنین نوع فعالیت های ورزشی به کار گرفته، اثرات متفاوتی را بر سیستم های ترشحی و متابولیسمی بگذارد. روش های آزمایشگاهی نیز در حصول نتایج تاثیرگذارند؛ زیرا نیمه عمر، شرایط نگهداری و اندازه گیری هر کدام از آنزیم ها با یکدیگر متفاوت است(۲۹) و عدم توجه و دقت کافی به این مسئله می تواند سبب تغییر نتایج شود که این امر شاید یکی از دلایل ناهمخوانی نتایج مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعات باشد.

در مطالعه حاضر کاهش معناداری در درصد چربی بدن گروه تمرين مشاهده شد. تمرين های تناوبی یکی از پروتکل های انتخابی است که با کاهش اشتها(با تسهیل رهایش فاکتور آزادکننده کورتیکوتروپین) و از راه افزایش اکسیداسیون چربی ها، در کنترل ترکیب بدن نقش دارد(۷). یافته های پژوهش تیجو ناو همکاران(۲۰۰۹)، مبنی بر کاهش معنادار محتوای چربی زیرپوستی، احشایی و محیط کمر پس از اجرای ۱۲ هفته تمرين های تناوبی شدید در بالغین چاق، موید این مطلب است(۳۰). از دیگر نتایج تحقیق حاضر، افزایش معنادار حداقل اکسیژن مصرفی آزمودنی های گروه تمرين بود که به نظر می رسد با توجه به ماهیت پروتکل تحقیق نتیجه ای قابل انتظار باشد. افزایش Vo<sub>2max</sub> پس از تمرين تناوبی شدید، احتمالاً به دلیل افزایش حجم خون، پلاسمما و فعالیت آنزیم های اکسیدانتیو میتوکندریایی است. افزایش Vo<sub>2max</sub> در افراد مبتدى، به دلیل بهبود حمل و تحويل اکسیژن به عضلات اسکلتی است که احتمالاً از طریق افزایش حجم ضربه ای، چگالی مویرگی و میتوکندریایی و افزایش برداشت اکسیژن توسط عضلات فعال رخ می دهد(۱۵). از جمله محدودیت های این تحقیق عدم کنترل تغذیه و خواب آزمودنی ها بود که پیشنهاد می شود این محدودیت در پژوهش های آتی در کنترل محقق درآید.

بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود از تمرينات تناوبی شدید، با رعایت اصل تنوع و شدت تمرينات، به عنوان روش موثر در کاهش درصد چربی، آنزیم کبدی ALT و افزایش میزان Vo<sub>2max</sub> پسران چاق و دارای اضافه وزن استفاده شود. با این حال برای

نشان داد تفاوت معناداری بین آنزیم های کبدی گروه تمرين و گروه کنترل وجود ندارد(۲۷). نتایج تحقیقات مذکور با نتایج تحقیق حاضر هم راستا است. آمينو ترانسفرازها در سرم طبیعی، فعالیت اندکی دارند و در اثر تمرينات برونگرا و رقابت های استقاماتی، کوتاه مدت و شدید و حتی ورزش هایی که در آن ها وزن بدن تحمل نمی شود، مقادیر آنژیم های فوق افزایش می یابد(۲۸). چندین فرضیه از جمله فرضیه هیپوکسی، استرس گرمایی و همولیز، ضایعات سلوی ایجاد شده توسط انجام فعالیت بدنی ناشی از فرآیندهای مکانیکی و یا تغییر در نفوذپذیری غشا بعد از انجام فعالیت برای توجیه افزایش فعالیت این آنزیم ها وجود دارد(۲۹). یکی از اندام های حیاتی درگیر در فعالیت های ورزشی گوناگون، کبد است که ممکن است میزان آنزیم های آن پس از ورزش افزایش یابد(۲۶). فعالیت بدنی به ویژه اگر شدید و طولانی باشد، بر فعالیت آنزیم ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد(۲۹). رابطه دقیق تری با تجمع چربی در کبد دارد. افزایش ALT پلاسما حتی بدون وجود کبد چرب در افراد چاق نیز مشاهده شده است(۲۳). احتمال دارد کاهش معنادار غلظت آنزیم ALT در گروه تمرين مطالعه حاضر به دلیل کاهش درصد چربی بدن و هم چنین گنجاندن فاصله استراحتی بین سه های تمرينی باشد.

با این حال نتایج تحقیق داودی(۱۳۹۱)، نشان داد در پی هشت هفته تمرينات استقاماتی بر روی پارانشیم کبد و آنزیم های کبدی مردان مبتلا به کبد چرب، کاهش معناداری در سطوح همه آنزیم های کبدی گروه آزمایش وجود دارد(۲۸). هالثورث و همکاران(۲۰۱۱)، گزارش کردند هشت هفته تمرين مقاومتی موجب کاهش محتوای چربی کبد در افراد چاق مبتلا به کبد چرب می شود. با این حال تغییر معناداری در ALT پلاسما پس از هشت هفته تمرين مقاومتی مشاهده نشد(۲۹).

با این که معمولاً انتظار می رود تمرين ورزشی منظم، میزان آنزیم های کبدی را کاهش دهد، ممکن است به دلیل تفاوت در ویژگی های فردی مثل تفاوت سنی، شرایط آمادگی جسمانی آزمودنی ها، وجود سطوح پایه بالاتر یا طبیعی آنزیم های ALP و AST و ALT

تحقیق ما را یاری کردن، اعلام می دارند.  
تاییدیه اخلاقی: پژوهش حاضر  
برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش  
فعالیت بدنی و تندرستی به شماره کد اخلاق  
IR.IAUETB.1395.52005  
دانشگاه آزاد واحد  
تهران شرق می باشد.

دستیابی به نتایج مطلوب دوره مداخله باید طولانی تر باشد.

### سپاسگزاری

پژوهشگران بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از آزمودنی های تحقیق و مسئولان محترم آزمایشگاه پژوهشگاه رویان که در اجرای پروتکل

### References

- 1.Collings PJ, Wijndaele K, Corder K, Westgate K, Ridgway CL, Sharp SJ, et al. Objectively measured physical activity and longitudinal changes in adolescent body fatness an observational cohort study. *Pediatr Obes* 2016; 11: 107-14. doi: 10.1111/ijpo.12031
- 2.James J, Thomas P,Cavan D, Kerr D. Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks cluster randomised controlled trial. *BMJ* 2004;22:1237. doi:10 .1136/bmj.38077
- 3.Kliegman R, Stanton B, Joseph ST, Schor N. Nelson textbook of pediatrics ebook. Elsevier Health Sci Publication.2015;P:86-98.
- 4.Laimer M, Ebenbichler CF, Kaser S, Sandhofer A, Weiss H, Nehoda H, et al. Weight loss increases soluble leptin receptor levels and the soluble receptor bound fraction of leptin. *Obes Res*2002;10:597-601. doi: 10.1038/oby.2002.81
- 5.Bouassida A , Chamari K, Zaouali M, Feki Y, Zbidi A. Review on leptin and adiponectin responses and adaptations to acute and chronic exercise. *Br J Sports Med* 2010; 44: 620-30. doi: 10.1136/bjsm.2008.046151
- 6.Karacabey K. The effect of exercise on leptin, insulin cortisol and lipid profiles in obese children. *J Int Med Res*2009; 37: 1472-78. doi: 10.1177/147323000903700523
7. Marcinko K, Sikkema SR, Samaan MC, Kemp BE, Fullerton MD, Steinberg GR. High intensity interval training improves liver and adipose tissue insulin sensitivity. *Mol Metab* 2015 ;4: 903-15. doi: 10.1016/j.molmet.2015.09.006
- 8.Qin L, Xiang Y, Song Z, Jing R, Hu C, Howard ST. Erythropoietin as a possible mechanism for the effects of intermittent hypoxia on bodyweight serum glucose and leptin. *Regul Pept*2010; 165: 168-73. doi: 10.1016/j.regpep.2010.07.163
9. Lowndes J, Zoeller RF, Caplan JD, Kyriazis GA, Moyna NM, Seip RL, et al. Leptin responses to long term cardiorespiratory exercise training without concomitant weight loss a prospective study. *J Sport Med Phys Fit* 2008; 48:391-7.
- 10.Rodriguez B, Torres DM, Harrison SA. Physical activity an essential component of lifestyle modification in NAFLD. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*2012; 9: 726-731. doi: 10.1038/nrgastro.2012.200
11. Dielen FM, Veer C, Buurman WA, Greve JW. Leptin and soluble leptin receptor levels in obese and weight losing individuals. *J Clin Endocrinol Metab*2002; 87: 1708-16. doi: 10.1210/jcem.87.4.8381
12. Slentz CA , Bateman LA, Willis LH, Shields AT, Tanner CJ, Piner LW, et al. Effects of aerobic vs. resistance training on visceral and liver fat stores liver enzymes and insulin resistance by HOMA in overweight adults from STRRIDE AT/RT. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2011; 301: 1033-39. doi: 10.1152/ajpendo.00291.2011
- 13.Shaw K, Gennat H, Orourke P, Delmar C. Exercise for overweight or obesity. *Coch* *Dat Sys Rev*2006;18:3817. doi: 10.1002/14651858.CD003817
- 14.Pagano M, Gauvreau K. Principles of biostatistics. Chapman Hall Publication.2018;P:122-32.
- 15.Plowman SA, Smith DL. Exercise physiology for health fitness and performance. Lip Williams Wilkins Publication. 2013;P:513-29.
- 16.Gibala MJ, Little JP, Macdonald MJ, Hawley JA. Physiological adaptations to low volume high intensity interval training in health and disease. *J*

- Physiol2012;590:1077-84. doi: 10.1113/jphysiol.2011.224725
- 17.Cureton TK. Interpretation of the oxygen intake test. Am Correct Ther J 1973;27: 17-23.
18. Astrand PO, Rodahl K, Dahl HA, Stromme SB. Textbook of work physiology.1<sup>th</sup> ed. Hum Kinet Publication.2003;P: 412-76.
19. Hulver MW, Houmard JA. Plasma leptin and exercise recent findings. Sports Med 2003; 33: 473-82. doi: 10.2165/00007256-200333070-00001
20. Monikh Kh, Kashef M, Azad A, Ghasemnian A. [Effects of 6 weeks resistance training on Body Composition, serum Leptin and muscle strength in non - athletic men]. Horizon Med Sci2015;21:135-140. (Persian) doi: 10.18869/acadpub.hms.21.2.135
- 21.Kazemi A , Eslami R, Ghayedali M, Ghanbarzadeh M. Effects of 6 weeks of low volume high intensity interval training on serum levels of leptin glucose and body fat in young wrestlers ]. SJKU 2015;20:70-7. (Persian) doi: 10.22102/20.2.70
- 22.Trapp EG, Chisholm DJ, Freund J, Boucher SH. The effects of high intensity intermittent exercise training on fat loss and fasting insulin levels of young women. Int J Obes Lond 2008; 32: 684-91. doi: 10.1038/sj.ijo.0803781
- 23.Tartibain B,Sharifi H, Ebrahemitorkmani B. [The effect of 12 week high intensity interval training on lung function serum leptin level and lipid profiles in inactive obese Men]. Daneshvar Med 2016;24:23-30.(Persian)
- 24.Bahram ME, Mogharnasi M. [The effect of twelve weeks high intensity training interval on leptin levels and obesity dependent factors among female students suffering overweight]. Biol Sport Sci2015;6: 451-465 . (Persian) doi: 10.22059/JSB.2015.53220
- 25.Jafari S, Mahmoodi A, Mobseri S, Sharghi L. [ The effect of sprint interval training on serum levels of leptin and LDL and HDL lipoproteins in overweight inactive male adolescents. Physiol Manage Res Sports 2016; 8:105-117.( Persian)
- 26.Shamsoddini A, Sobhani V, GhamarChehreh ME, Alavian SM, Zaree A. Effect of aerobic and resistance exercise training on liver enzymes and hepatic fat in Iranian Men with nonalcoholic fatty liver disease. Hepat Mon2015; 15: 31434. doi: 10.5812/hepatmon.31434
- 27.Bijeh N, Moazami M, Ahmadi A, Samadpour F, Zabihi AR. [ Effect of six months of aerobic exercise training on serum leptin cortisol insulin and glucose levels in thin middle aged Women. Kowsar Med J 2011;16:53-59. (Persian)
- 28.Davoodi M, Moosavi H, Nikbakht M.[The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and liver enzymes AST ALT of fat liver patients].J Shahrekord Uni Med Sci 2012; 14:84-90.(Persian)
- 29.Hallsworth K, Fattakhova G, Hollingsworth KG, Thoma C, Moore S, Taylor R, et al. Resistance exercise reduces liver fat and its mediators in non alcoholic fatty liver disease independent of weight loss. Gut 2011; 60: 1278-83. doi: 10.1136/gut.2011.242073
- 30.Tjonna AE, Stolen TO, Bye A, Volden M, Slordahl SA, Odegard R,etal. Aerobic interval training reduces cardiovascular risk factors more than a multitreatment approach in overweight adolescents. Clin Sci Lond 2009; 116: 317-326. doi: 10.1042/CS20080249



## Effect of High Intensity Interval Training on the Level of Leptin and Liver Enzymes in Obese and Overweight Males

Hosseini M<sup>1\*</sup>, Naderi S<sup>2</sup>, Mousavisadati K<sup>3</sup>, Rayahimalayeri S<sup>4</sup>

(Received: November 4, 2018)

Accepted: February 16, 2019)

### Abstract

**Introduction:** Obesity is a complex disorder, which is characterized by excessive accumulation of adipose tissue. Leptin is a peptide hormone, which is basically secreted by adipose tissue and is effective in the regulation of body weight and fat. The purpose of this study was to investigate the effect of high-intensity interval training on the level of Leptin and liver enzymes in obese and overweight males.

**Materials & Methods:** In this semi-experimental study, 22 males with the mean age, height, weight, and body mass index of 12-14 years,  $164.43 \pm 5.11$  cm,  $74.02 \pm 12.34$  kg, and  $29.27 \pm 4.09$ , respectively, were selected voluntarily and randomly divided into experimental ( $n=11$ ) and control groups ( $n=11$ ). The experimental group was subjected to 8 weeks training program (three 40-min sessions each week) which included 10 sets of cycling on a cycle ergometer for 60 seconds with 80 % intensity of the reserve heart rate. Blood samples were taken 24 and 48 hours before and after the training, respectively, in a fasting condition. Leptin, Aspartate aminotransferase (AST), Alanine aminotransferase (ALT), and Alkaline

phosphatase (ALP) were measured using specific methods. Body fat percentage, body max index, and maximum volume of oxygen were evaluated before and after the training. ANOVA was utilized to analyze data.

**Finding:** According to the results, there was a decrease in the levels of ALT and body fat percentage as well as an increase in the maximum volume of oxygen in the experimental group, compared to the control group ( $P<0.05$ ). Moreover, the levels of Leptin, AST, and ALT decreased; however, the difference was not statistically significant ( $P>0.05$ ). **Ethics code:** IR.IAUETB.1395.52005

**Discussion & Conclusions:** High-intensity interval training on a cycle ergometer can be an appropriate exercise strategy to reduce the plasma concentration of ALT and body fat percentage in obese and overweight males. However, the intervention should be longer to achieve desired results.

**Keywords:** Interval training, Leptin, Obese males

1. Dept of Exercise Physiology, Faculty of Human Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2. Dept of Motion Behavior, Faculty of Human Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

\*Corresponding author Email: mhbisadi@yahoo.com