

کاهش بیان ژن های COX-2 , $\text{IL-1}\beta$, $\text{TNF-}\alpha$ و PGE2 در کندروسیت های مفصلی و مونوپلیسیت/ماکروفاز توسط عصاره آبی $\text{Alhagi maurorum L.}$

حسین مقصودی^{۱*}، سمانه حاج الهیاری^۱، عبدالمجید ناروئی^۱

(۱) گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور، واحد ری، شهر ری، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۹

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

چکیده

مقدمه: امروزه بیماری استئوآرتیت(آرتروز) را یک بیماری دژنراتیو نمی دانند با توجه به عوارض جانبی مانند زخم های پیتیک، مسمومیت های کبدی و عوارض کلیوی ناشی از درمان داروهای کورتون و غیر استروئیدی، استفاده از گیاهان دارویی به عنوان یک درمان جایگزین پیشنهاد می شود. گیاه خارشتر *Alhagi maurorum L.* به طور معمول در طب سنتی به عنوان یک درمان برای دردهای روماتیسمی استفاده می شود. بنا بر این تحقیق با هدف اندازه گیری کاهش بیان ژن های $\text{TNF-}\alpha$, $\text{IL-1}\beta$, PGE2 و COX-2 در خارشتر *Alhagi maurorum L.* انجام گرفت.

مواد و روش ها: عصاره آبی گیاه خار شتر از مرکز ذخایر ژنتیکی تهیه گردید. برای تهیه سلول ها مفصل و مایع مفصلی متاکارپ اندام حرکتی قدامی گوساله ۸ ماهه هلشتاین کاملاً سالم، بالا فاصله بعد از کشتار داخل کیسه استریل به آزمایشگاه ارسال گردید. سلول های THP-1 به صورت فلاسکی حاوی 6×10^6 و 60 میلی لیتر محیط کشت غنی شده از انستیتو پاستور تهیه گردید. هر یک از انواع سلول ها در شرایط مناسب کشت داده شد و viability آن ها با روش تربیان بلو ارزیابی شد و پس از تکثیر و به منظور افزایش سطح سایتوکین ها به وسیله لیپولی ساکارید(LPS) تیمار شدند. بعد از کشت مجدد سلول ها در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد در انکوباتور CO_2 دار با رطوبت 90 درصد برای مراحل بعدی نگهداری شد. پس از جداسازی RNA و تهیه cDNA و PCR & RT-PCR و سپس با استفاده از روش Real Time-PCR به بررسی میزان بیان ژن های این گیاه مورد نظر پرداخته شد.

یافته های پژوهش: بیان ژن COX-2 به میزان $56/59$ درصد توسط عصاره آبی گیاه خار شتر کاهش یافت. بیان ژن $\text{IL-1}\beta$ به میزان 50 درصد توسط عصاره آبی گیاه خار شتر کاهش یافت. بیان ژن $\text{TNF-}\alpha$ به میزان $51/86$ درصد توسط عصاره آبی گیاه خار شتر کاهش یافت و تولید PGE-2 در اثر عصاره آبی خارشتر به ترتیب به میزان 48 درصد و 52 درصد کاهش یافت.

بحث و نتیجه گیری: عصاره آبی گیاه خار شتر منجر به کاهش بیان ژن COX-2 و iNOS در سلول های سایتوپلیسیت تحریک شده

واژه های کلیدی: عصاره آبی گیاه خارشتر، اوستئوآرتیت، سایتوکین ها، کندروسیت، مونوپلیسیت، ماکروفاز

* نویسنده مسئول: گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور، واحد ری، شهر ری، تهران، ایران

Email: hosseini_m2002@yahoo.com

Copyright © 2019 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits copy and redistribute the material, in any medium or format, provided the original work is properly cited.

مقدمه

آرتروز شایع ترین بیماری مفصلی انسان در دنیا است و به عنوان مثال شیوع آرتروز زانو در ایران در سنین ۱۵-۸۲ در حدود ۱۶ درصد گزارش شده است(۱) مشخصه آرتروز فرسایش غضروف بین مفصلی و تحریک استخوان سازی در استخوان زیر غضروف است. مشخص شده است که این بیماری نه تنها یک بیماری دژنراتیو می باشد بلکه درجاتی از التهاب سینوویوم نیز در مفاصل بروز می کند. مشخص شده است در طی پروسه بیماری کندروسیت ها، سینوویوسیت ها فعال شده و سلول های مونونوکلئار (مونوپلیوцит و ماکروفاز) نیز در مفصل تجمع می یابند(۲). این سلول های فعال شده سیتوکین های التهابی شامل: TNF- α , iL-1 β , iNOS موجب افزایش تولید NO می شوند(۳). و این مواد پیش التهابی با مکانیسم های شناخته شده ای(۴) مانند: تحریک سنتر متالوبروتئینازها و مهار تولید مهارکننده بافتی متالوبروتئینازها، تحریک آپوپتوز کندروسیت ها(۵)، و مهار سنتز پروتئوکلیکان ها در افزایش تخریب غضروف نقش ایفا می کنند(۶).

سالانه میلیون ها نفر از مبتلایان به آرتروز برای تسکین درد ناشی از بیماری مجبور به استفاده از داروهای ضد درد به خصوص ضدالتهاب های غیر استروئیدی مانند (ایبوپروفن، دیکلوفناک سدیم و ناپروکسین) و استروئیدها می شوند. داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی دارای عوارض گوارشی و کلیوی می باشند و استروئیدها نیز دارای عوارضی شامل ابتلا به دیابت، فشارخون بالا و پوکی استخوان می باشند. شیوع بالای آرتروز به خصوص آرتروز زانو حجم بالای مصرف داروهای سنتیک و میزان بالای عوارض جانبی این داروها منجر به تحملی هزینه های بسیار زیاد در بودجه بهداشت و درمان کشورها می گردد(۷). بنا بر این بعد از مشخص شدن نقش التهاب در پاتوتیز اوتستوارتیت در طی سال های اخیر بسیاری از محققین در تلاش اند تا نقش ضد التهاب انواع گونه های گیاهان دارویی را مشخص نموده تا شناسن از داروهای ضد درد و ضد

التهابی با عوارض جانبی کمتر را برای بیماران فراهم آورند.

خارشتر یا اشتراک غاز با نام علمی L. Alhagi imaurorum گیاهی دارویی و از خانواده پروانه داران بدون کرک، سبزرنگ، و یکی از بخش های شمار می رود. گل های بیضی تا سرپوشیده ای می باشند. Alhagi با نام فارسی خارشتر، به طور معمول در طب سنتی به عنوان یک درمان برای دردهای روماتیسمی استفاده می شود(۸). اغلب انسان های گیاهی استخراج شده از گیاهان دارای خواص ضدقارچی، ضدانگل، ضدباقتری می باشند(۹). خارشتر دارای دو گونه به نام های (B.M) A.graecorum Boiss و A.pseudoalhagi باشد(۱۰). ماده موثری گیاه دارای خاصیت مسهل و مدر است (زرگری) جوشانده اندام هوایی آن برای معالجه عفونت های روده کاربرد دارد(۱۱) این گیاه باعث تحریک سیستم عصبی مرکزی شده و فعالیت مغز و قلب را افزایش می دهد(۱۲). این گیاه حاوی شش فلاونوئید گلیکوزید اصلی و حاوی ترکیبات استرونول ها و اسیدهای چرب و آلکالوئید می باشد(۱۳).

هدف از این مطالعه بررسی نقش ضد التهاب گیاه خارشتر از طریق تاثیر بر بیان زن TNF- α , iL-1 β COX-2, iNOS در سلول های کندروسیت (carpometacarpal CMC) جدا شده از مفصل گوواله هشت ماهه نزد هلشتاین و تولید PGE2, NO در سلول های THP-1 به عنوان مدلی شبیه به انفیلتراسیون سلولی مونوپلیوцит و ماکروفاز در مفصل آرتروزی می باشد.

مواد و روش ها

کشت سلولی کندروسیت ها و THP-1. برای جداسازی سلول های کندروسیت از مفصل (carpometacarpal CMC) گوواله هشت ماهه سالم استفاده گردید. ابتدا کنديل خارجي مفصل مورد نظر، توسط کورت در اندازه های کمتر از ۱ میلی متر برداشته شد و پس از دو نوبت شستشو با بافر PBS، Collagenase pH7.2, 1 Molar Type II سانتی گراد نگهداری و سپس سلول ها توسط فیلتر

تعداد بیشتر، میزان رنگ ایجاد شده بیشتر است. جذب نوری رنگ ارغوانی ظاهر شده در طول موج nm ۴۹۰-۵۴۰ اندازه گیری می شود(۱۵).

گروه های مورد مطالعه: سلول های غضروفی مورد مطالعه در این بررسی در هفت گروه مورد بررسی(جدول شماره ۱) قرار گرفتند. گروه اول: به منظور اندازه گیری سطح بیان ژن های مورد نظر در حالت نرمال فقط واجد سلول های غضروفی، گروه دوم: به منظور تاثیر عصاره بر بیان ژن های مورد نظر در سلول های تحریک نشده شامل سلول های غضروفی و عصاره گیاه خارشتر، گروه سوم: شامل سلول های غضروفی تحریک شده توسط LPS به منظور ایجاد مدلی شبیه استوآرتیت، گروه چهارم: به منظور تاثیر عصاره گیاه خارشتر در مدلی شبیه بیماری، شامل سلول های غضروفی به علاوه LPS و عصاره گیاه خارشتر، گروه پنجم: به منظور این که آیا به عنوان پلاسبو تاثیری بر بیان ژن های مورد مطالعه دارد یا خیر، و شامل سلول های غضروفی به علاوه LPSS و PB سلول های غضروفی به علاوه LPS گروه ششم و هفتم: برای مقایسه تاثیر عصاره گیاه خار گروه شتر با داروهای رایج در درمان استوآرتیت از دگراماتازون (گروه ۶) و NSAID (گروه ۷) در مدلی شبیه بیماری استوآرتیت استفاده شد و این دو گروه شامل سلول های غضروفی به علاوه LPS و دگراماتازون (گروه ۶) و NSAID (گروه ۷).

استریل جدا گردید و برای پاساژ(Subculture) به فلاسک مخصوص انتقال پیدا کرد و تا زمانی که ۸۵ درصد حجم فلاسک توسط لایه تک سلولی پوشانده شود، در انکوباتور با شرایط CO₂ ۵٪، دما، ۳۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نگهداری شد. سپس برای شمارش سلول ها از محلول تریپسین ۰/۲۵ درصد و برای شمارش سلولی از تریپان بلو ۰/۴ درصد استفاده شد(۱۴).

سلول های THP-1 (به دو صورت چسبنده Adherent و غیر چسبنده Non-adherent تقسیم می شوند) تهیه شده از انستیتو پاستور(Pasteur Institute, Iran) از انتقال به آزمایشگاه با رسیدن به تراکم بالای ۸۵ درصد سلول های معلق در محیط کشت جدا و پس از شمارش با تریپان بلو به میزان لازم به پلیت ها انتقال داده شد.

تعیین سایتو توکسیتی توسط MTTassey بلوه: جهت بررسی اثر سایتو توکسیتی در عصاره آبی گیاه خارشتر و تعیین LC50 از روش رنگ سنجی استفاده شد. پودر MTT یک نمک تترازولیوم محلول در آب نرمالی است که این محلول در محیط کشت فاقد فلرد یا بافر PBS حل می شود و ترکیب زردرنگ ایجاد می کند. اساس این تست شکستن نمک MTT توسط آنزیم سوکسینات دهیدروژناز (SDH) میتوکندریابی زنده است. نتیجه این حالت ایجاد بلورهای نامحلول فرمازان ارغوانی رنگ است که توسط DMSO به حالت محلول در می آید. هر چه سلول ها فعال تر و

جدول شماره ۱. مشخصات گروه های مورد بررسی

گروه	سینکروپی سیستم	عصاره	LPS	PBS	دگراماتازون	NSAID
۱	+ve	-ve	-ve	-ve	-ve	-ve
۲	+ve	+ve	-ve	-ve	-ve	-ve
۳	+ve	-ve	+ve	-ve	-ve	-ve
۴	+ve	+ve	+ve	-ve	-ve	-ve
۵	+ve		+ve	+ve	-ve	-ve
۶	+ve		+ve	-ve	+ve	-ve
۷	+ve		+ve	-ve	-ve	+ve

(Iran) استفاده شد. نتایج به دست آمده از (CT) (Iran) استاندارد و ۲- روش Pffafi method مورد ارزیابی قرار گرفت.

های حاصله از RT-PCR اعداد شمارشی بوده ct و معنی دار بودن آن ها ابتدا توسط ANOVA تعیین گردید و در مرحله دوم توسط روش Student's REST-2000 و New- maneKeuls test ارزیابی قرار گرفت. در پایان برای تعیین میزان بیان ژن های مربوطه از روش ($2^{-\Delta\Delta Ct}$) Pfaffi روشی که از اختلاف سطح بیان بین ژن اصلی (COX-2, TN-F α , iL-1 β , iNOS) و ژن خانه دار (GAPDH) حاصل می شود.

اندازه گیری میزان تولید نیتریت توسط روش کلریومتری: با استفاده از سدیم نیتریت در غلظت های مختلف منحنی استاندارد رسم شد. سوپر ناتانت محیط کشت سلولی (۱۰۰۸) با (۱۰۰۸) معرف D Systems, Minneapolis, MN, &Ragent R (USA) در یک پلیت ۹۶ خانه ته صاف در اتاق تاریک گذاشته می شود سپس OD آن ها در طول موج ۵۴۰nm اندازه گیری شد و با استفاده از منحنی استاندارد بر اساس چگالی نوری نسبت به لگاریتم غلظت، میزان تولید NO مشخص شد(۱۷).

اندازه گیری میزان تولید PGE-2 با استفاده از کیت (Cinna Gen company, Iran) Invetrogen برای اندازه گیری سطوح PGE-2 ترشح شده در سوپر ناتانت مایع کشت سلولی بر طبق پروتکل شرکت سازنده از محلول استاندارد-2 PGE و غلظت های مشخص آن برای تهیه منحنی استاندارد گردید. در نهایت میزان OD بالافاصله پس از انجام آزمایش توسط الایزا ریدر در طول موج ۴۵۰nm اندازه گیری شد و با استفاده از فرمول تهیه شده از ترکیب استاندارد و منحنی رسم شده (بر اساس چگالی نوری نسبت به لگاریتم غلظت) توسط خودمان مشخص شد(۱۸).

آنالیز آماری: تمامی داده ها به عنوان میانگین $SD \pm 1$ بیان شده است. آنالیز آماری با استفاده از آنالیز یک سویه واریانس (ANOVA)، نرم افزار Student- Newman REST version 2000

LPS به منظور فراهم کردن شرایطی شبیه به بیماری و افزایش بیان سایتوکین های پیش التهابی از LPS به میزان ۲۰ ng/ml ۶×۱۰ سلول را در محیط کشت، کشت می دهیم پس از ۷۲ ساعت میزان ۱۰۰ ng LPS به محیط اضافه شد. سری اول پلیت ها به مدت ۲۴ ساعت به منظور بیان سایتوکین های پیش التهابی مانند COX-2, iNOS, TNF- α در انکوباتور CO2 نگهداری شد. سری دوم به مدت یک ساعت در انکوباتور به منظور تغییرات پروستاگلندین و NO قرار گرفت(۱۶). جداسازی RNA با استفاده از معرف (Trizol) (Invitrogen, Cinna Gen company, Iran) نهایت برای تعیین غلظت RNA از روش اسپکتروفوتومتری (Aldrich, USA) استفاده گردید که در صورت وجود آلدگی DNA، از آنزیم DNase برای از بین بدن DNA اضافی استفاده می شود. برای تبدیل RNA به cDNA از کیت ۲ step RT-PCR (company, USA) بر اساس پروتکل مربوطه استفاده گردید. در انتها بر روی cDNA، با انجام PCR غلظت نمونه تولید شده افزایش پیدا کرد.

سترنتر cDNA : برای هر نمونه ۱ μ g از RNA (توسط کیت RT-PCR ۲ Cinna Gen) به cDNA تبدیل (company, Iran) در شرایط ۴۲ درجه سانتی گراد به مدت ۶۰ دقیقه و حرارت ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه (به منظور قطع سنتز cDNA) انجام شد.

PCR Semiquantitative با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای هر کدام از سایتوکین ها مورد مطالعه و نتایج آن در نمودار شماره ۳ آورده شده است و ژن GAPDH به عنوان ژن خانه دار استفاده گردید. شرایط استاندارد PCR انجام شد و فرآورده PCR در آگارز ژل ۱/۵ درصد همراه با اتیدیوم بروماید ۵ μ g/ml چک شد.


Quantitative Real time PCR PCR در زمان واقعی با استفاده از همان پرایمرهایی که برای کیفی استفاده گردید، انجام شد و از evergreen عناوی مستر میکس کارخانه سیناکلون (sinaclon,

استفاده می شود و هم چنین گروه هفتم که از داروی ضد التهابی غیر استورئیدی NSAID مانند آیبوروفن به عنوان داروی اصلی در درمان مبتلایان به تورم مفصل استفاده می شود، کاهش بسیار قابل توجهی داشته اند. کاهش ۳۶/۵۹ درصد توسط عصاره آبی گیاه خارشتر در سطح معنی داری قرار گرفته است. این کاهش توسط آنالیز آماری ANOVA بررسی قرار گرفت (۲۵) و در سطح معنی دار ۰/۰۱۶ با احتساب $P<0.05$ مورد تایید قرار گرفت. استفاده از نرم افزار REST Vol.2009، میزان کاهش بیان سایتوکین مورد نظر در مقایسه با گروه سوم که از به عنوان تیمار استفاده شده بود و گروه ششم و هفتم که به ترتیب بعد از تیمار با LPS از دگزاماتازون و آیبوروفن برای درمان استفاده شده بود، قابل توجه بود. این نتایج با نتایج سایر محققین که کاهش بیان COX-2 در تحقیق خود به دست آورده بودند کاملاً مطابقت دارد (۲۲) (نمودار شماره ۱).

SPSS vol.2000 kelus test اجرا شده است (۱۹). برای آنالیز CT، $P<0.001$ ، به شکل آماری معنی دار در نظر گرفته شده است.

یافته های پژوهش


اثر عصاره آبی گیاه خارشتر بر بیان COX-2 و تولید PG در سلول های کندروسیت گاوی: عصاره آبی گیاه خارشتر تغییری را در بیان آنزیم COX-2 در سلول های گروه ۲ ندارد ولی در گروه ۳ با افزایش بیان ۱۰۰ درصد همراه می باشد و این افزایش بیان در گروه ۴ با تغییر مخالف روپرور شده به بیانی دیگر باعث کاهش بیان آنزیم COX-2 در سلول های تحریک شده توسط LPS به میزان ۳۶/۵۹ درصد شده است. این تغییر با معنی است. لازم به ذکر است در گروه ۵ که از پلاسبو برای درمان استفاده شده بود هیچ تغییری در میزان بیان ژن مورد نظر ایجاد نگردید. میزان بیان سایتوکین مورد نظر در گروه ششم که از دگزاماتازون به عنوان داروی اصلی در درمان مبتلایان به تورم مفصل



نمودار شماره ۱. تاثیر عصاره آبی گیاه خارشتر بر بیان سایتوکاین های پیش التهابی در کندروسیت های گاو
موثره به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شدند. سپس به مدت یک ساعت با LPS فعال شدند. میزان بیان COX-2 و TNF- α و IL-1 β و iNOS با استفاده از روش Student's New-maneKeuls test با ارزویت داده شده است ($n=3$)

شرکت Invitrogen انجام پذیرفت. کاهش تولید پروستاگلاندین در مقایسه با گروه های ۳ و ۴ معنی دار می باشد (نمودار شماره ۲).

برآورد میزان تولید PGE2 به روش ایمینواسی (ELISA) و با استفاده از رسم منحنی استاندارد برای غلظت های متفاوت از محلول استاندارد پروستاگلاندین و فرمول ارائه شده توسط



نمودار شماره ۲. تاثیر عصاره خارشتر به میزان تولید PG در سلول های THP-1، سلول های THP-1 با ماده موثره به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شدند.

سپس به مدت ۲۴ ساعت با LPS فعال شدند. میزان تولید PG با استفاده از الایزا تعیین گردید (mean±1 SD, n=3).


میزان بیان ژن مورد نظر ایجاد نگردید. میزان بیان سایتوکین مورد نظر در گروه ششم که از دگزامتاژون به عنوان داروی اصلی در درمان مبتلایان به تورم مفصل استفاده می شود و هم چنین گروه هفتم که از داروی ضد التهابی غیر استورئیدی NSAID مانند ایبوپروفن به عنوان داروی اصلی در درمان مبتلایان به تورم مفصل استفاده می شود، کاهش بسیار قابل توجهی داشته اند. کاهش $51/86$ درصد توسط عصاره آبی گیاه خارشتر در سطح معنی داری قرار گرفته است. این کاهش توسط آنالیز آماری ANOVA مورد بررسی قرار گرفت و در سطح معنی دار $0/320$ با احتساب $P<0.05$ مورد تایید قرار گرفت. استفاده از نرم افزار REST Vol.2009، میزان کاهش بیان سایتوکین مورد نظر در مقایسه با گروه سوم که از LPS به عنوان تیمار استفاده شده بود و گروه ششم و هفتم که به ترتیب بعد از تیمار با LPS از دگزامتاژون و ایبوپروفن برای درمان استفاده شده بود، قابل توجه بود.

اثر عصاره آبی گیاه خارشتر بر بیان iNOS و تولید NO در سلول های کندروسیت گاوی: عصاره آبی گیاه خارشتر تغییری را در بیان آنزیم iNOS در سلول های گروه ۲ ندارد ولی در گروه ۳ با افزایش بیان در گروه 100 درصد همراه می باشد و این آنزیم در سلول های تحریک شده توسط LPS به میزان $34/73$ درصدشده است این تغییر معنی دار است. لازم به ذکر است در گروه 5 که از پلاسبو برای درمان استفاده شده بود هیچ تغییری در میزان بیان ژن مورد نظر ایجاد نگردید. میزان بیان سایتوکین مورد نظر در گروه ششم که از دگزامتاژون به عنوان داروی اصلی در درمان مبتلایان به تورم مفصل استفاده می شود و هم چنین گروه هفتم که از داروی ضد التهابی غیر استورئیدی NSAID مانند ایبوپروفن به عنوان داروی اصلی در درمان مبتلایان به تورم مفصل استفاده می شود، کاهش بسیار قابل توجهی داشته اند. کاهش 50 درصد توسط عصاره آبی گیاه خارشتر در سطح معنی داری قرار گرفته است. این کاهش توسط آنالیز آماری ANOVA مورد بررسی قرار گرفت و در سطح معنی دار $0/0028$ با احتساب $P<0.001$ مورد تایید قرار گرفت. استفاده از نرم افزار REST Vol.2009، میزان کاهش بیان سایتوکین مورد نظر در مقایسه با گروه سوم که از LPS به عنوان تیمار استفاده شده بود و گروه ششم و هفتم که به ترتیب بعد از تیمار با LPS از دگزامتاژون و ایبوپروفن برای درمان استفاده شده بود، قابل توجه بود.

اثر عصاره آبی گیاه خارشتر بر بیان TNF- α در سلول های کندروسیت گاوی: عصاره آبی گیاه خارشتر تغییری را در بیان آنزیم TN-F α در سلول های گروه ۲ ندارد ولی در گروه 3 با افزایش بیان آنزیم TN-F α در سلول های تحریک شده توسط LPS به میزان $51/86$ درصد شده است. این تغییر معنی دار است. لازم به ذکر است در گروه 5 که از پلاسبو برای درمان استفاده شده بود هیچ تغییری در سطح معنی داری قرار گرفته است. این کاهش توسط آنالیز آماری

برآورد میزان تولید NO به روش اسکتروفومتری و با استفاده از رسم منحنی استاندارد برای غلظت های متفاوت از محلول استاندارد نیتریت اکساید انجام پذیرفت و نتایج به شرح نمودار شماره ۳ ارائه شده است و بیانگر کاهش قابل توجه در میزان تولید نیتریت اکساید در مقایسه با گروه های ۳ و ۴ می باشد(نمودار شماره ۳).


ANOVA مورد بررسی قرار گرفت و در سطح معنی دار $P<0.05$ با احتساب مورد تایید قرار گرفت. استفاده از نرم افزار REST Vol.2009، میزان کاهش بیان سایتوکین مورد نظر در مقایسه با گروه سوم که از LPS به عنوان تیمار استفاده شده بود و گروه ششم و هفتم که به ترتیب بعد از تیمار با LPS از دگرمتازون و ایبوپروفن برای درمان استفاده شده بود، قابل توجه بود.



نمودار شماره ۳. تاثیر عصاره خارشتر به میزان تولید NO در سلول های THP-1 با استفاده از کلوریمتری، سلول های THP-1 با ماده موثره به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شدند. سپس به مدت ۲۴ ساعت با LPS فعال شدند. میزان تولید NO با استفاده از منحنی استاندارد تعیین گردید (mean \pm 1 SD, n=3)

که از داروی ضد التهابی غیر استورئیدی NSAID مانند ایبوپروفن به عنوان داروی اصلی در درمان مبتلایان به تورم مفصل استفاده می شود، کاهش بسیار قابل توجهی داشته اند. کاهش درصد توسط عصاره آبی گیاه خارشتر در سطح معنی داری قرار گرفته است. این کاهش توسط آنالیز آماری ANOVA مورد بررسی قرار گرفت و در سطح معنی دار $P<0.05$ با احتساب $P<0.05$ مورد تایید قرار گرفت. استفاده از نرم افزار REST Vol.2009، میزان کاهش بیان سایتوکین مورد نظر در مقایسه با گروه سوم که از LPS به عنوان تیمار استفاده شده بود و گروه چهارم و پنجم که به ترتیب بعد از تیمار با LPS از دگرمتازون و ایبوپروفن برای درمان استفاده شده بود، قابل توجه بود(نمودار شماره ۴).

تاثیر عصاره آبی گیاه خارشتر بر روی $TN-F\alpha$ و $iL-1\beta$ در سلول های THP-1 عصاره آبی گیاه خارشتر تغییری را در بیان آنزیم $iL-1\beta$ و $TNF\alpha$ در سلول های گروه ۲ ندارد ولی در گروه ۳ با افزایش بیان ۱۰۰ درصد همراه می باشد و این افزایش بیان در گروه ششم با تغییر مخالف روپرورد شده به بیانی دیگر باعث کاهش بیان آنزیم $iL-1\beta$ و $TNF\alpha$ در سلول های تحریک شده توسط LPS به میزان ۵۲ درصد شده است این تغییر معنی دار است. لازم به ذکر است در گروه هفتم که از پلاسیو برای درمان استفاده شده بود هیچ تغییری در میزان بیان ژن مورد نظر ایجاد نگردید. میزان بیان سایتوکین مورد نظر در گروه چهارم که از دگرمتازون به عنوان داروی اصلی در درمان مبتلایان به تورم مفصل استفاده می شود و هم چنین گروه پنجم



نمودار شماره ۴. تاثیر عصاره خارشتر بر بیان ژن سایتوکین ها در سلول های RT-PCR با استفاده از THP-1 با ماده TNF- α و iL- β فعال شدن. سپس به مدت یک ساعت با LPS میزان بیان TNF- α و iL- β با استفاده از روش (student's e New-maneKeuls) نشان داده شده است (mean \pm SD, n=3)

ساینوفیال درایجاد فیبروز و استئوفیت نقش داشتند(۲۶)

در یک مطالعه دیگر در سگ های مبتلا به استئوآرتربیت یک رابطه مثبت بین تراکم جمعیت ماکروفازها، طول مدت بیماری و شدت بیماری پیدا شد(۲۷). مطالعات هم چین ثابت کردند که ماکروفازها یک منبع اصلی از سایتوکین های پیش التهابی هستند که بالاترین سطح را در بافت ساینوفیال بیماران استئوآرتربیتی دارند. این نتایج در مجموع پیشنهاد دهنده نقش ماکروفازها برای ایجاد و حفظ التهاب ساینوفیال در مفاصل مبتلا به استئوآرتربیت می باشد. در این مطالعه ما اثر عصاره آبی گیاه خارشتر را روی کندروسیت های گاوی جدا شده و سلول های THP-1 بررسی کردیم. سلول های THP-1 به عنوان مدل جایگزین مونوسیت/ماکروفاز در مطالعات بر روی مدیاتورهای پیش التهابی به طور شایعی به کار می رود(۲۸) این سلول ها به سرعت تکثیر شده و می توانند تعداد بسیار زیادی سلول زنده برای تجزیه و تحلیل در اختیار ما قرار دهند. مشاهدات ما که اثر ساپرس کننده عصاره آبی گیاه خارشتر را بر روی این نوع سلول ها نشان می دهد پیشنهاد می کند که همین اثر ضد التهابی را روی ماکروفازهای ساینوفیال داشته باشد.

کندروسیت ها به عنوان تنها جزء سلولی غضروف مفصلی، در پاسخ به آسیب بافتی بیان ژن واسطه های پیش التهابی را افزایش می دهند(۲۹). کندروسیت های

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه ما برای اولین بار مشخص کردیم که اثرات ضد التهابی عصاره آبی گیاه خارشتر نه تنها در کندروسیت ها بلکه در منوسيت ها و ماکروفازهای بافتی هم دیده می شود. ما ثابت کردیم که عصاره آبی گیاه خارشتر بیان ژن سایتوکین THP-1 های پیش التهابی سرکوب می کند. علاوه بر این بیان ژن iNOS, COX-2, IL-1 β , در کندروسیت های کشت شده را نیز کاهش می دهد. و نتیجه مطالعه تجربی که توسط امیری و همکاران در سال ۲۰۱۱ انجام شده و استفاده از گیاه مورد نظر برای کاهش درد ناشی از بیماری را توصیه کرده تایید می کند. این یافته پیشنهاد کننده اثر عصاره آبی خارشتر بر انواع متعددی از سلول ها است که در التهاب نقش دارند و بنا بر این احتمال این که اثرات سودمندی را در مفاصل مبتلا به استئوآرتربیت داشته باشد زیاد است. Batani در سال ۱۹۹۶ (۲۵) اثرات ضد روماتیسم و مشکلات گوارشی را برای این گیاه بیان کردند.

تخريب غضروف در استئوآرتربیت همراه با التهاب در غضروف، غشاء ساینوفیال و بافت استخوان است. مطالعات مختلف اثرات زیان بار ماکروفازهای ساینوفیال را در مفاصل ملتهب تائید کرده است. در یک بررسی انجام شده بر روی موش ماکروفازهای

می دهد برای اولین بار این مطالعه مشخص کرد که عصاره آبی گیاه خارستر به عنوان یک مهارکننده قوی سایتوکین ها، بیان ژن COX-2 و iNOS عمل می کند به طوری که تولید PGE-2 و نیتریت در THP-1 سرکوب می کند. تحقیقات قبلی نشان داد که این واسطه ها در پاتوزن استئوارتیریت مهم هستند و این کاهش در واسطه ها با بهبود غضروف های آسیب دیده همراه است(۵۸).

مطالعه آزمایشگاهی ما نشان داد که عصاره آبی گیاه خارستر به کاهش بیان و تولید چنین واسطه های التهابی در سلول ها کندروسیت و منوسيت کمک می کند. منوسيت/ماکروفازها که به عنوان سلول های ایمنی موضعی در بافت ساینوویال(بافت ساینوویال دارای دو نوع سلول، فیبروبلاست typeII و ماکروفاز typeI وجود دارد) نقش بسیار اساسی در بیماری استئوارتیریت بازی می کنند. کندروسیت ها تنها جزء اصلی غضروف مغلصی هستند و توانایی تغییرات ظاهری(phenotype modulation) را دارند این مسائل باعث می شود که سلول های منوسيت/ماکروفاز و کندروسیت نقش بسیار مهمی در پیشرفت بیماری داشته باشند.

در مطالعه حاضر نتیجه گیری شد که اثرات ضد التهابی عصاره آبی گیاه خارستر محدود به سلول های غضروفی نیست بلکه شامل سلول های THP-1 مرتبط با غشا ساینوویال هم می شود. هم چنین ثابت شد که عصاره آبی گیاه خارستر در یک مدل THP-1 تحریک شده با LPS بیان ژن سایتوکین های پیش التهابی را سرکوب می کند. در نتیجه با توجه به نقش این مواد در پیشرفت بیماری گیاه خارستر می تواند داروی موثری برای استئوارتیریت بوده و به عنوان جایگزین داروهای استروئیدی و غیر استروئیدی مطرح شود. پرسشی که مطرح می شود و پاسخ آن بسیاری از مشکلات درمانی استئوارتیریت را حل خواهد نمود این است که آیا اطلاعات in vitro همه اثرات دیده شده در بیماری استئوارتیریت باقی مانده در آزمایشات مکرر را توضیح می دهد؟ برای رسیدن به این پاسخ باید نقش عصاره آبی خارستر برای کاهش پیش التهاب در انواع سلول های بافتی چندگانه مورد بررسی قرار گیرد

گاوی از هضم بافت غضروفی به دست آمدند و در پاسازهای متعدد فنتوپ اولیه خود را حفظ کردند(۳۰). علاوه بر این نقش حساسی که COX-2 و iNOS در بیماریزایی استئوارتیریت دارند به طور گسترده ای در کندروسیت های گاوی مورد مطالعه قرار گرفت(۳۱) مشخص شده که سایتوکین ها آنزیم های تجزیه کننده را در بافت غضروفی و بافت ساینوویال فعال می کنند بنا بر این سرکوب بیان ژن سایتوکین ها برای کاهش پیشرفت آسیب های غضروف ضروری است. IL-1 β و TNF- α ، سایتوکین ها تنظیم کننده اولیه سیر پیشرفت بیماریزایی استئوارتیریت هستند(۲۹). مطالعات نشان دادند که سطوح بالای IL-1 β و TNF- α به طور غیر طبیعی در مایع ساینوویال، ساینوویوم و بافت غضروف بیماران استئوارتیریت وجود دارد(۸). در مطالعات In Vitro هر دو سایتوکین IL-1 β و TNF- α ترشح پروستاگلینین را تحریک کرده و فعالیت پروتئیناز تجزیه کننده ماتریکس مانند کلارژنаз، ژلاتیناز، پروتئوگلیکاناز، استرومایزین و پلاسمینوژن فعال را افزایش می دهد(۸). اگر چه IL-1 β از نظر فیزیولوژیکی مهم تر از TNF- α است. مطالعات بر روی مدل حیوانی پیشنهاد می دهد که سایتوکین ها به طور سینزیزیکی عمل کرده و تخریب غضروف را تحریک می کنند که این اثر بیشتر از آسیب مشاهده شده توسط هر یک از دو سایتوکین به تنهایی است(۳۲). عصاره آبی گیاه خارستر سرکوب(Downregulation) بیان ژن های IL-1 β در کندروسیت و TNF- α را در THP-1 تایید می کند که حدس می زنیم این عمل فرآیند تجزیه و از بین رفتن غضروف را کاهش دهد. علاوه بر آنزیم های تجزیه کننده ماتریکس، IL-1 β و TNF- α هم چنین سنتز آنزیم های COX-2 و iNOS را القا می کنند. نتیجه القا COX-2 و iNOS در سطوح بالای NO و PGE-2 منجر به تخریب غضروف مهار سنتر ماتریکس و آپوپتوزیس کندروسیت می شود(۳۳). ثابت شده کاهش تولید NO و PGE-2 درد و التهاب ناشی از علائم استئوارتیریت را کاهش می دهد(۵۷). مطالعه ما تاکید کرد که عصاره آبی گیاه خارستر بیان ژن COX-2 و iNOS را سرکوب کرده و یا کاهش

مطالعات بیشتر بر روی موش پیشنهاد می شود.

References

- 1.Davatchi F, Jamshidi AR, Banihashemi AT, Gholami J, Forouzanfar MH, Akhlaghi M, et al. WHO-ILAR copcord study stage 1 urban study in Iran. *J Rheumatol*2008; 35:1384-90.
- 2.Dicesare PE, Abramson SB. Pathogenesis of osteoarthritis. Kelley text book of rheumatology. 7th ed. Philadelphia Elsevier Saunders Publication 2005:1493-513
- 3.Goldring MB. The role of the chondrocyte in osteoarthritis. *Arth Rheum J Am College Rheumatol*2000; 43:1916-26. doi: 10.1002/1529-0131(200009)43:9<1916
- 4.Melchiorri C, Meliconi R, Frizziero L, Silvestri T, Pulsatelli L, Mazzetti I, et al. Enhanced and coordinated in vivo expression of inflammatory cytokines and nitric oxide synthase by chondrocytes from patients with osteoarthritis. *Arthr Rheum*1998; 41:2165-74.
- 5.Sandell LJ, Aigner T. Articular cartilage and changes in arthritis cell biology of osteoarthritis. *ArthRes Therap* 2001; 3:107. doi.org/10.1186/ar148
- 6.Khanna D, Fitzgerald JD, Khanna PP, Bae S, Singh MK, Neogi T, et al. Systematic nonpharmacologic and pharmacologic therapeutic approaches to hyperuricemia. *Arth Care Res* 2012; 64:1431-46. doi.org/10.1002/acr.21772
- 7.Klippel JH, Stone JH, White PH. 1th ed. Primer on the rheumatic diseases. Springer Sci Busi Med Publication.2008; P.23.
- 8.Alsnafi AE. Therapeutic properties of medicinal plants a review of plants with hypolipidemic, hemostatic fibrinolytic and anticoagulant effects. *Asian J Pharmaceut Sci Technol* 2015; 5:271-84.
- 9.Brown M. In TIME-II investigators intravenous NPA for the treatment of infracting myocardium early a double blind comparison of single bolus lanoteplase vs accelerated alteplase for the treatment of patients with acute myocardial infarction. *Eur Heart J*2000; 21:2005-13. doi:10.1053/euhj.2000.2498
- 10.Zojaegifer M. [New species of Liliaceae in Iran]. *Iranian Botan J* 2001; 22: 65-7. (Persian)
- 11.Qureshi R, Razabhatti G. Ethnobotany of plants used by the Thari people of Nara desert Pakistan. *Fitoterapia*2008; 79:468-73. doi:10.1016/j.fitote.2008.03.010
- 12.Rahman MA, Mossa JS, Alsaid MS, Alyahya MA. Medicinal plant diversity in the flora of Saudi Arabia a report on seven plant families. *Fitoterapia* 2004; 75:149-61. doi:10.1016/j.fitote.2003.12.012
- 13.Awaad AS, Maitland DJ, Soliman GA. Hepatoprotective activity of Schouwia thebica Webb. *Bioorg Med Chem Lett* 2006; 16:4624-8.doi.org/10.1016/j.bmcl.2006.06.011
- 14.Maghsoudi H, Hallajzadeh J, Rezaeipour M. Evaluation of the effect of polyphenol of escin compared with ibuprofen and dexamethasone in synoviocyte model for osteoarthritis an invitro study. *Clin Rheumatol* 2018; 37:2471-8.
- 15.Maghsoudi H, Hajallahyari S. Down regulation of COX-2, IL-1 β and TNF- α in cynoviocyte by essential oil of *Fraxinus excelsior*. *Int J Con Res Rev*2018; 9:20192-203.doi.org/10.15520/ijcrr/2018/9/03/463
- 16.Au RY, Altalib TK, Au AY, Phan PV, Frondoza CG. Avocado soybean unsaponifiables suppress TNF- α , IL-1 β , ke می تواند نقش بالقوه آن را به عنوان یک روش دیگر یا تکمیلی برای داروهای غیر استروئیدی سنتی تکمیل کند. البته در این راستا

- COX-2 iNOS gene expression, and prostaglandin E2 and nitric oxide production in articular chondrocytes and monocyte macrophages. *Osteoarthr Cart* 2007; 30; 15:1249-55 doi.10.1016/j.joca.2007.07.009
- 17.Kovacs M, Kiss A, Gonczi M, Miskolczi G, Seprenyi G, Kaszaki J, et al. Effect of sodium nitrite on ischaemia and reperfusion induced arrhythmias in anaesthetized dogs is protein S-nitrosylation involved? *Plos One*2015; 10: 0122243 doi.org/10.1371/journal.pone.0122243
- 18.Murad F. Cyclic guanosine monophosphate as a mediator of vasodilatation. *J Clin Invest* 1986; 78:1-5.
- 19.Kohr MJ, Sun J, Aponte A, Wang G, Gucek M, Murphy E et al. Simultaneous measurement of protein oxidation and S-nitrosylation during preconditioning and ischemia reperfusion injury with resin-assisted capture. *Circ Res*2011; 108:418-426.10.1161/circresaha.110.232173
- 20.Brown GC. Regulation of mitochondrial respiration by nitric oxide inhibition of cytochrome c oxidase. *Biochimica and Biophysica Acta* 2001; 1504:46-57.
- 21.Dorak MT. Real time PCR. 2thed. Taylor Francis Publication. 2006; P.144-9.
- 22.Alsnafi AE. Therapeutic properties of medicinal plants a review of their immunological effects. *Asian J Pharmaceut Res*2015;5208-16.doi:10.4103/phrev.phrev-48-17
- 23.Sarkar S, Buha D. Effect of ripe fruit pulp extract of *Cucurbita pepo* Linn. *Indian J Exp Biol* 2008; 46:639-45.
- 24.Awaad AS, Aljaber NA. Antioxidant natural plant RPMP Ethnomedicine. *Source Mech*2010; 27:1-35.
- 25.Batani D, Bossi S, Benuzzi A, Koenig M, Faral B, Boudenne JM. Optical smoothing for shock-wave generation application to the measurement of equationsof state. *Las Part Beam*1996;14:211-23.doi.org/10.1017/S0263034600009940
- 26.Bлом AB, Lent PL, Holthuysen AE, PM, Roth J, Rooijen N, Berg WB. Synovial lining macrophages mediate osteophyte formation during experimental osteoarthritis. *Osteoarthr Cart*2004; 12:627-35.doi.org/10.1016/j.joca.2004.03.003
- 27.Benito MJ, Veale DJ, Fitzgerald O, Berg WB, Bresnihan B. Synovial tissue inflammation in early and late osteoarthritis. *Annal Rheum Dis* 2005; 1; 64:1263-7. doi.org/10.1136/ard.2004.025270
- 28.Hambleton J, Weinstein SL, Lem L, Franco AL. Activation of C-Jun N-terminal kinase in bacterial lipopolysaccharide stimulated macrophages. *Proce National Acad Sci* 1996; 2; 93:2774-8.
- 29.Aigner T, Kurz B, Fukui N, Sandell L. Roles of chondrocytes in thepathogenesis of osteoarthritis. *Curr Opin Rheumatol*2002; 14:578-84.
- 30.Chan PS, Caron JP, Orth MW. Effect of glucosamine and chondroitin sulfate on regulation of gene expression of proteolytic enzymes and their inhibitors in interleukin1challenged bovine articular cartilage explants. *Am J Vet Res*2005; 1; 66:1870-6.doi.org/10.2460/ajvr.2005.66.1870
- 31.Orth MW, Peters TL, Hawkins JN. Inhibition of articular cartilage degradation by glucosamine-HCl and chondroitin sulphate. *Equ Vet J*2002; 34:224-9. doi.org/10.1111/j.2042-3306.2002.tb05423.x
- 32.Lotz M. The role of nitric oxide in articular cartilage damage. *Rheum Dis Clin North Am*1999; 25:269-82. doi.org/10.1016/S0889-857X (05)70067-3
- 33.Soria MA, Largo R, Santillana J, Pernaute O, Calvo E, Hernandez M, Egido J, Beaumont G. Long term NSAID treatment inhibits COX-2 synthesis in the knee synovial membrane of patients with osteoarthritis differential proinflammatory cytokine profile between celecoxib and aceclofenac. *Annal Rheum Dis*2006; 1; 65:998-1005.doi.org/10.1136/ard.2005.046920



Reduced TNF- α , IL-1 β and COX-2 Expressions and Decreased Production Rate of PGE2 and NO in Articular Chondrocytes of Monocyte/Macrophage using the Aqueous Extract Alhagi Maurorum L.

Maghsoudi H^{1*}, Hajalahayari S¹, Narouie A¹

(Received: February 5, 2018)

Accepted: June 30, 2018)

Abstract

Introduction: Nowadays, osteoarthritis is not considered as a degenerative disease. Regarding the side effects, such as peptic ulcers, liver toxicity, and renal complications due to the use of corticosteroids and non-steroid drugs, it is recommended to utilize medicinal plants as an alternative treatment. *Alhagi Maurorum*. L is commonly used in traditional medicine as a treatment for rheumatic diseases. Therefore, this study aimed to evaluate the reduction of TNF- α , IL-1 β , and COX-2 gene expressions and decreased production rate of PGE2 and NO in chondrocytes of monocyte/macrophages by the aqueous extract of *Alhagi maurorum*.L.

Materials & Methods: The aqueous extract of *Alhagi maurorum*. L was prepared from genetic reserves. For the preparation of the cells, the joint and the subcutaneous fluid of the anatomical metacarpal of the 8-month-old fully healthy Holstein calf were sent in a sterile bag to the laboratory immediately after the slaughter. The THP-1 cells were prepared in a flask containing 6×10^6 and 60 ml of enriched culture media from Pasteur Institute. Each cell type was cultured in appropriate conditions and the viability was evaluated by trypan blue. After

proliferation, they were treated with lipopolysaccharide to increase the level of cytokines. After re-culture of the cells at 37 ° C in a CO2-incubator with a moisture content of 90%, they were stored for the next steps. After the RNA priming and cDNA preparation, RT-PCR and PCR were performed and then the real-time-polymerase chain reaction method was used to determine the expression of the desired genes.

Findings: According to the results, the COX-2, IL-1 β , and TNF- α gene expressions reduced by 36.59%, 50%, and 51.86%, respectively, using the aqueous extract of *Alhagi maurorum*. L. In addition, there was a reduction in the production rate of No and PGE-2 by 48% and 52%, respectively.

Discussion & Conclusions: The aqueous extracts of *Alhagi maurorum*. L reduced CoX-2 and iNOS gene expression in LPS-stimulated synoviocyte cells. In addition, there was a decrease in the production of NO and PGE2 in THP-1 cells.

Keywords: Aqueous extract of *Alhagi maurorum*. L, Chondrocyte, Cytocines, Osteoarthritis, Macrophage, Monocyte

1. Dept of Biotechnology, Ray Branch, Payame Noor University, Ray, Tehran, Iran

*Corresponding author Email: hossein_m2002@yahoo.com