

سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های (IgG و IgM) ضد توکسوپلازما در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز پزشکی الزهرا(س) تبریز

عبدالحسین دلیمی اصل^{۱*}، مهدی ارشد^۱

(۱) گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ پذیرش: ۹۰/۳/۱۷

تاریخ دریافت: ۸۹/۴/۹

چکیده

مقدمه: ایمنی مادران نسبت به عفونت توکسوپلازماگوندی در طول دوره بارداری دارای اهمیت فراوانی است. زنان غیر ایمن در دوره بارداری ممکن است در معرض خطر ابتلا به توکسوپلازما قرار گیرند. انگل قادر است از طریق جفت به جنین منتقل شده و عوارض شدیدی در جنین ایجاد نماید. هدف از مطالعه حاضر بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به توکسوپلازما در زنان باردار تبریز است.

مواد و روش ها: از زنان باردار ۱۸-۳۵ ساله مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) تبریز در طول یک سال مجموعاً ۳۰۰ نمونه خون گرفته شد. تیتراژ آنتی بادی های IgG و IgM سرم ها با روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات دموگرافیکی زنان نیز از طریق پرسش نامه اخذ گردید.

یافته های پژوهش: در ۲۶/۳ درصد خانم های تحت مطالعه، تیتراژ مثبت IgG و در ۰/۳۳ درصد آن ها تیتراژ مثبت IgM تشخیص داده شد. با ازدیاد سن افراد، فراوانی تیتراژ مثبت IgG افزایش نشان داد. بالاترین تیتراژ در گروه سنی ۳۱-۳۵ با ۷۸/۹ درصد مشاهده شد. علاوه بر این ۹۷/۴۶ درصد زنان دارای تیتراژ آنتی بادی بر علیه توکسوپلازما سابقه تماس با گربه داشته اند.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که ۷۳/۷ درصد زنان باردار در تبریز فاقد آنتی بادی بر علیه توکسوپلازما بوده اند، لذا رعایت اصول بهداشتی در تغذیه و تماس و مواجهه با گربه، برای آن ها کاملاً ضروری است و توصیه می شود این گونه خانم ها حداقل یک بار و به خصوص در سه ماهه اول بارداری مورد آزمایش آلودگی به توکسوپلازما قرار گیرند.

واژه های کلیدی: توکسوپلازما گوندی، IgG و IgM، زنان باردار، تبریز

* نویسنده مسئول: گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه

یکی از متداول ترین آلودگی های انگلی انسان و سایر جانوران خونگرم، آلودگی با توکسوپلازماگوندی است. توکسوپلازماگوندی تک یاخته ای از شاخه اپی کمپلکسا است و آلودگی به این تک یاخته از سراسر دنیا گزارش شده است. این انگل علاوه بر انسان تعداد زیادی از حیوانات پستاندار و هم چنین گونه های مختلف پرندگان را آلوده می سازد و قادر است در طیف وسیعی از سلولهای میزبان تکثیر شود. تخمین زده می شود که بیش از ۵۰۰ میلیون نفر از مردم در سراسر دنیا به این انگل آلوده باشند، (۱). به طور کلی انسان از دو راه اکتسابی و مادرزادی به توکسوپلازماسموزیس مبتلا می گردد. عفونت توکسوپلازمایی ممکن است حاد یا مزمن، با علامت و یا بدون علامت باشد. عوارض و علائم بیماری عمدتاً در مرحله حاد بروز می کند و به دنبال فعال شدن سیستم ایمنی میزبان، تکثیر انگل کنترل شده و کیست های نسجی در بافت های میزبان تشکیل می گردد.

اگرچه توکسوپلازماسموزیس اکتسابی در افراد دارای سیستم ایمنی سالم، بیماری خفیف یا بدون علائم را ایجاد می کند ولی در افراد دارای اختلال در سیستم ایمنی، عوارض و علائم شدید و حتی مرگ را باعث می شود. از طرفی در افرادی که به نقص سیستم ایمنی دچار می شوند و یا داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند، آلودگی مزمن ممکن است مجدداً فعال شده و عوارض شدید و کشنده ای مانند آنسفانیت، میوکاردیت، پنومونی ایجاد نماید. (۲)

تضعیف سیستم ایمنی ناشی از معالجات پزشکی منجر به بروز موارد بیشتری از توکسوپلازماسموزیس به خصوص در دریافت کنندگان پیوند عضو می شود. در مبتلایان به ایدز حدود ۳۰ درصد موارد مرگ و میر در اثر توکسوپلازماسموزیس می باشد و یکی از علل مرگ و میر در این گونه بیماران آنسفانیت توکسوپلازمایی گزارش شده است، (۲). توکسوپلازماسموزیس مادرزادی در دوران بارداری رخ می دهد مادران اگر در طی دوره بارداری نسبت به توکسوپلازما ایمن نباشند و در آن دوره به توکسوپلازماسموزیس مبتلا شوند انگل از جفت به جنین

منتقل شده و ممکن است عوارض شدیدی در جنین ایجاد نماید. در این زمینه مطالعات نشان می دهد که امکان انتقال آلودگی از مادر به جنین نزدیک به ۵۰ درصد است. تشخیص زود هنگام (در مراحل اولیه یا حاد) آلودگی مادر در زمان بارداری حائز اهمیت می باشد زیرا عفونت های کشنده عمدتاً به دنبال آلودگی از توکسوپلازماسموزیس حاد مادر (توکسوپلازماسموزیس مادرزادی) بروز می کند. (۱)

در ایران نیز در سال های اخیر مطالعات متعددی در مورد آلودگی به این انگل در زنان نقاط مختلف کشور گزارش شده است، (۱۷-۳). تشخیص بیماری معمولاً به روش های مختلف سرولوژیکی صورت می گیرد. تکنیک ELISA از جمله روش های بسیار حساس برای تعیین میزان تیتراژ IgG و IgM علیه توکسوپلازما است که امروزه کاربرد وسیعی در آزمایشگاه های کشور دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های ضد توکسوپلازما در زنان باردار تبریز بوده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی-مقطعی ۳۰۰ نفر از زنان باردار ۱۸-۳۵ ساله مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) تبریز شرکت کردند، پس از توجیه و اخذ رضایت از آنان در طول یک سال به صورت تصادفی ساده مجموعاً ۳۰۰ نمونه خون گرفته شد. حجم نمونه با توجه به میزان شیوع آنتی بادی توکسوپلازما گزارش شده در منطقه (۲۱/۸ درصد) محاسبه گردید، (۳). پس از خون گیری و جدا سازی سرم، تیتراژ آنتی بادی های IgG و IgM با روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان نیز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد.

برای انجام آزمایش الایزا از کیت تشخیص توکسوپلازماسموزیس شرکت ایتالیائی Radim طبق روش زیر استفاده شد. ابتدا سرم ها با رقت ۱:۳۰۰ با ماده رقیق کننده رقیق شد. از استانداردها ۱۰۰ میکرولیتر و از نمونه های رقیق شده ۱۰۰ میکرولیتر در چاهک های مورد نظر ریخته و پس از پوشاندن چاهک ها در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت

تشخیص داده شد. بر طبق جدول شماره ۱ با بالا رفتن سن افراد، فراوانی مثبت و مطلق تیترا مثبت IgG افزایش یافته است به طوری که اختلاف تیترا آنتی بادی بین گروه های سنی مختلف کاملاً معنی دار بود. ($P < 0.05$)

طبق نتایج به دست آمده از مجموع گروه های سنی مختلف، گروه سنی ۲۰-۱۸ با تعداد ۴ نفر (۶/۶۷ درصد) دارای کمترین و گروه سنی ۳۱-۳۵ با تعداد ۱۵ نفر (۷۸/۹۵ درصد) دارای بیشترین تیترا مثبت آنتی بادی IgG بوده اند و فقط یک نفر (۵/۲۶ درصد) در گروه سنی ۳۱-۳۵ دارای تیترا مثبت IgM گردید. (جدول و نمودار شماره ۱) از کل افراد تحت مطالعه، ۲۳۵ نفر در معرض تماس با گربه قرار داشتند که نتایج تیترا آنتی بادی IgG در ۸۱ نفر (۳۲/۷۶ درصد) آن ها مثبت تشخیص داده شد، (جدول و نمودار شماره ۲). هم چنین از ۶۵ نفری که در معرض تماس با گربه قرار نداشتند، تیترا آنتی بادی در ۲ نفر مثبت (۳/۰۷ درصد) گردید، (جدول شماره ۲). از طرفی ۹۷/۴۶ درصد زنان دارای تیترا آنتی بادی بر علیه توکسوپلازما سابقه تماس با گربه داشته اند.


یک ساعت قرار داده شد. با ۳۵۰ میکرولیتر از محلول شستشو، چاهک ها را چهار بار شستشو داده و کاملاً خشک شد. سپس از محلول آنزیم کونژوگه ۱۰۰ میکرولیتر به هر چاهک اضافه کرده و پس از پوشاندن چاهک ها در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت قرار داده شد و مجدداً با ۳۵۰ میکرولیتر از محلول شستشو، چاهک ها چهار بار شستشو داده شد. در مرحله آخر ۱۰۰ میکرولیتر از محلول سوبسترای آماده (معرف رنگی) را اضافه کرده و به مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد و پس از ۲۰ دقیقه ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده را اضافه کرده و تغییر رنگ محلول از آبی به زرد با دستگاه ELISA با طول موج ۴۵۰ نانومتر خوانده شد. طبق دستورالعمل سازنده کیت، OD بالاتر از ۳۰ واحد بین المللی به عنوان سرم مثبت در نظر گرفته شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های توصیفی و کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش

در ۲۶/۳۳ درصد خانم های تحت مطالعه، تیترا مثبت IgG و در ۰/۳۳ درصد آن ها تیترا مثبت IgM

جدول شماره ۱. فراوانی نسبی و مطلق تیترا مثبت و منفی IgM, IgG در سرم خانم های باردار
مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء تبریز


گروه سنی	تعداد آزمایش	نتایج تیترا آنتی بادی IgG			نتایج تیترا آنتی بادی IgM		
		تعداد مثبت	درصد مثبت	تعداد منفی	تعداد مثبت	درصد مثبت	تعداد منفی
۱۸-۲۰	۶۰	۴	۶/۶۷	۵۶	۹۳/۳۳	۰	۰
۲۱-۲۵	۱۴۹	۳۰	۲۰/۱۳	۱۱۹	۷۹/۸۷	۰	۰
۲۶-۳۰	۷۲	۳۰	۴۱/۶۷	۴۲	۵۸/۳۳	۰	۰
۳۱-۳۵	۱۹	۱۵	۷۸/۹۵	۴	۲۱/۰۵	۱	۵/۲۶
مجموع	۳۰۰	۷۹	۲۶/۳۳	۲۲۱	۷۳/۶۷	۱	۰/۳۳



نمودار شماره ۱. درصد تیتتر مثبت IgG بر علیه توکسوپلازما گوندی در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء تبریز بر حسب سن

جدول شماره ۲. فراوانی نسبی و مطلق تیتتر مثبت IgG در زنان باردار در تبریز در ارتباط با مواجهه با گربه

نتایج IgG				تعداد	مواجهه با گربه
درصد منفی	تعداد منفی	درصد مثبت	تعداد مثبت		
۶۷/۲۴	۱۵۸	۳۲/۷۶	۷۷	۲۳۵	داشته
۹۶/۹۳	۶۳	۳/۰۷	۲	۶۵	نداشته



نمودار شماره ۲. درصد تیتتر مثبت IgG در زنان باردار در تبریز در ارتباط با مواجهه با گربه

بحث و نتیجه گیری

آلودگی به توکسوپلاسم‌اگوندی شیوع بالایی در سراسر دنیا دارد. خوردن غذا و یا آب آلوده به اووسیست‌های دفع شده از گربه و یا خوردن گوشت نیم پز حاوی کیست‌های نسجی دو راه اصلی انتقال انگل به انسان می‌باشند. علاوه بر این انسان ممکن است به طور مادرزادی آلوده شود. هر چند که کنترل انتشار اووسیست سبب محدود شدن انتقال آلودگی به انسان و حیوان می‌شود ولی این امر در مورد گربه‌های وحشی و ولگرد عملی نیست. مواجهه با گربه تأثیر مهمی در ایجاد بیماری و بالا رفتن تیتراژ آنتی بادی دارد. در مطالعه حاضر اختلاف معنی داری بین تیتراژ آنتی بادی خانم‌های دارای مواجهه با گربه و آن‌هایی که مواجهه نداشتند مشاهده شد بدین ترتیب که خانم‌هایی که در تماس با گربه بودند بیش از ده برابر خانم‌های فاقد تماس دارای تیتراژ آنتی بادی مثبت بودند لذا نقش گربه در این میان بسیار حائز اهمیت است.

ایمنی مادران نسبت به عفونت توکسوپلاسم‌اگوندی در طی دوره بارداری دارای اهمیت فراوانی است. زنان غیر ایمن در دوره بارداری ممکن است در معرض خطر ابتلا به توکسوپلاسموز قرار گیرند. انگل قادر است از طریق جفت به جنین منتقل شده و عوارض شدیدی در جنین ایجاد نماید. میزان شیوع توکسوپلاسموز در زنان مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت گزارش شده است. این میزان در نروژ، دانمارک و فنلاند به ترتیب ۱۰/۹ درصد و ۲۷/۴ و ۲۰/۳ درصد گزارش شده است، (۲۰-۱۸). معمولاً در مناطق جنوبی و گرمسیر میزان آلودگی به توکسوپلاسموز بیشتر است، (۲۱) که این موضوع مربوط به فراهم بودن شرایط بقای اووسیست انگل در طبیعت است، (۲۲، ۲۳). عادات غذایی و شیوه دامداری نیز در انتشار بیماری نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

مطالعات انجام شده در مناطق سردسیر و خشک کشورهای سوئد، آمریکا و نروژ گواه بر پایین بودن میزان شیوع این بیماری در بین زنان مناطق مذکور است، (۲۴-۲۶). در مطالعه حاضر با توجه به سردسیر

بودن منطقه آذربایجان فقط ۲۶/۳ درصد زنان باردار دارای تیتراژ مثبت آنتی بادی IgG بوده اند.

در مطالعات متعددی رابطه معنی داری بین افزایش تیتراژی بادی و افزایش سن را نشان می‌دهد، (۳۰-۲۷). در مطالعه حاضر فراوانی تیتراژ آنتی بادی مثبت IgG با افزایش سن دارای سیر صعودی معنی دار است، به نحوی که گروه سنی ۳۵-۳۰ سال بیش از یازده برابر گروه سنی ۲۰-۱۸ دارای تیتراژ آنتی بادی مثبت IgG بودند.

آزمایش‌های سرولوژیکی انجام شده در ایران نیز نشان می‌دهد که میزان آلودگی توکسوپلاسمایی در زنان مناطق مختلف ایران متفاوت است. طبق تحقیقات انجام شده بین سن، مکان زندگی (شهری یا روستایی)، تحصیلات، سابقه نگهداری و تماس با گربه و حیوانات اهلی، مصرف سبزیجات خام و نوع آب مصرفی و موارد مثبت IgG رابطه معنی داری وجود دارد. طبق بررسی‌های انجام شده با استفاده از روش IFA، در ۲۱/۸ درصد دختران دبیرستانی شهرستان جلفا، در ۷۴/۶ درصد خانم‌های معرفی شده جهت انجام آزمایشات قبل از ازدواج در استان مازندران، در ۶۸ درصد زنان باردار شهر تهران، در ۴۰ درصد خانم‌های با سابقه سقط یا مرگ جنین مراجعه کننده به درمانگاه‌های زنان شهرستان ساری، در ۴۹/۸ درصد زنان باردار ساکن شهر زاهدان، در ۶۱ درصد زنان باردار کاشان، در ۳۲/۲ درصد خانم‌های باردار خمینی شهر، در ۳۳/۵ درصد زنان باردار شکم اول در شهر همدان، در ۵۴ درصد زنان باردار مشهد، در ۳۴/۷ درصد زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهر اردبیل جهت انجام آزمایش‌های قبل از ازدواج و در ۷۱ درصد زنان باردار در شهر ساری و ۴۸ درصد زنان باردار رفسنجان گزارش شده است، (۱۴-۳). گروهی از محققین از روش الایزا برای تعیین IgG و IgM استفاده نموده اند و به ترتیب میزان IgM و IgG ضد توکسوپلاسم در مطالعات آن‌ها بدین صورت بوده است: در زنان مراجعه کننده برای مشاوره ازدواج گرگان ۴۸/۳ درصد و ۱۱/۷ درصد، در خانم‌های مراجعه کننده جهت مشاوره ازدواج در شهرستان بابل ۶۴ درصد و

در مطالعه حاضر نیز ۷/۷۳ درصد زنان باردار تبریز فاقد آنتی بادی بر علیه توکسوپلازما بودند لذا در گروه زنان حساس قرار دارند از طرفی ۴۶/۹۷ درصد زنان دارای تیتراژ آنتی بادی بر علیه توکسوپلازما، سابقه تماس با گربه داشته اند و این نشان دهنده خطر نسبی گربه در انتقال آلودگی در این استان است. لذا در صورت عدم رعایت اصول تماس و مواجهه با گربه خطر ابتلا در زنان حساس وجود دارد. به همین جهت توصیه می شود این گونه خانم ها حداقل یک بار و به خصوص در سه ماهه اول بارداری مورد آزمایش توکسوپلازما قرار گیرند تا در صورت اثبات آلودگی نسبت به پیش گیری به موقع از ابتلای جنین جلوگیری به عمل آید.

۱۲ درصد و در زنان حامله بوشهر ۸/۳۷ درصد و ۷/۵ درصد گزارش نموده اند. (۱۷-۱۵)
در برخی از کشورهای جهان برای پیشگیری از خطرات توکسوپلازما مادرزادی، انجام آزمایش های قبل از بارداری را ضروری می دانند. ضرورت انجام این آزمایش ها بستگی به میزان حساسیت زنان در مراحل قبل از بارداری است. در اتریش که ۳/۶۳ درصد زنان باردار نسبت به توکسوپلازما حساس هستند به علت بالا بودن میزان حساسیت، زنان باردار هر ۳ ماه یک بار تحت آزمایش قرار می گیرند، (۳۱). در فرانسه که میزان زنان باردار حساس بین ۴۴-۲۸ درصد است، این آزمایش هر ماه یک بار در دوران بارداری صورت می گیرد. (۳۲)

References

- 1-Dubey JP. Toxoplasmosis. In: Collier L, Balows A, Sussman M. editors. Topley and Wilson's microbiology and microbial infection. Arnold Co-published in the USA by Oxford university press 1998.p.303-18.
- 2-Frenkel JK. Transmission of toxoplasmosis and the role of immunity in limiting, transmission and illness. JAVMS 1996; 233-40.
- 3-Falah A, Navazesh J, Koshavar H, Mehdipour Zare N. Epidemiological survey on Toxoplasma infection in female high school students. Fertil and Infertility 2005; 6:261-69.(Persian)
- 4-Ajami A, Sharif M, Safar MJ. Serological survey on toxoplasmosis in women refereed for pre marital screening test in Mazandaran province in 1999. J Mazandaran Univer Med Sci 2001;11:51-6.(Persian)
- 5-Gharavi MJ. Sero epidemiological study on toxoplasmosis in pregnant women in Tehran. Hakim 2002;5:91-8.(Persian)
- 6-Sharif M, Ajami A. Serological survey on toxoplasmosis in women suffering from abortion or dead fetus refereed to women clinics in Sari city during 1987-88. J Mazandaran Univer Med Sci 2000;10:13-8.(Persian)
- 7-Zangiabadi M, Salehi M, Khazaei HA, Khoshideh M. Serological survey on toxoplasmosis in pregnant women. Tabib E Shargh 2001;3:149-53.(Persian)
- 8-Arbabi M, Talari SA. The prevalence of toxoplasmosis in meat industry workers and pregnant women in Kashan. Feyz 2002; 6:28-38.(Persian)
- 9-Talari SA, Hejazi SH, Rasti S, Shadzi Sh. Sero epidemiology of Toxoplasma gondii in pregnant women refereed to Ashrafi Isfahani Hospital in Khomini city during 1998-2000. Feyz 2003;6:32-7.(Persian)
- 10-Falah M, Matini M, Taherkhani H, Rabiei S, Hajiloei M. Sero epidemiology of Toxoplasma gondii in pregnant women in Hamadan during 2003-2004. J Hamadan Univer Med Sci 2006;13:33-7.(Persian)
- 11-Fata A, Elahi SR, Berenji F, Zare R, Shahrodi MJ, Ashrafi Abian H. Comparison of Immunoflorescent and Immunoperoxidase methods for diagnosis of toxoplasmosis in 200 pregnant women. Med J Mashhad Facu 2001;44:16-21.(Persian)
- 12-Daryani A, Sagha M. Sero epidemiology of Toxoplasma gondii in girls refereed to health center laboratory for pre marital screening test in Ardabil city. J Ardabil Univer Med Sci 2004;4:19-25.(Persian)
- 13-Saffar M, Ajami A. The prevalence of toxoplasmosis in pregnant women in Sari city. Journal of Mazandaran Univer Med Sci 1999;24:1-5.(Persian)
- 14-Abdi J, Shojaee S, Mirzaee A, Keshavarz H. Seroprevalence of toxoplasmosis in pregnant women in Ilam province, Iran. Iranian J Parasitol 2008;3:34-7.

- 15-Saeidi M, Bakhshandeh NS, Ghaemi A, Hedayet Mofidi SM, Kohsar F, Behnampour N. Sero epidemiology of Toxoplasma antibodies in women referred to marriage consultancy bureau. *J Gorgan Univer Med Sci* 2002;4:64-71.(Persian)
- 16-Yosefi MR, Sefidgar SAA, Maliji Gh, Mostafazadeh A, Hasanjani MR, Roshan MR, et al. Sero epidemiology of Toxoplasma antibodies in women referred to marriage consultancy bureau in Babol city. *Iranian J Inf Dis Trop Med* 2005;10:31-3.(Persian)
- 17-Foladvand MA, Jaffari SM. The prevalence of Toxoplasma antibodies in pregnant women in Booshehr city. *Iranian South Med J* 2000;3:113-16.(Persian)
- 18-Jenum PA, kapperud G, Stray- Pedersen B, Melby KK. Prevalence of Toxoplasma gondii specific immunoglobulin G antibodies among pregnant women in Norway. *Epidemiol Infect* 1998;120:87-92.
- 19-Lebech M, Larsen SO, Petersen E. Prevalence, incidence and geographical distribution of Toxoplasma antibodies in pregnant women in Denmark. *Scand J Infect Dis* 1993;25:751-6.
- 20-Lappalainen M, Koskela P, Hedman K, et al. Incidence of primary Toxoplasma infections during pregnancy in Southern Finland: A prospective cohort study. *Scand J Infect Dis* 1992; 24:97-104.
- 21-Logar J, Novak-Antolic Z, Zore A, Cerar V, Likar M. Incidence of congenital toxoplasmosis in the Republic of Slovenia. *Scand J Infect Dis* 1992;24:105-8.
- 22-Ho-Yen Do, Chatterton JMW. Congenital toxoplasmosis. Why and how to screen. *Rew Med Microbiol* 1990;1:229-35.
- 23-Remington JS, McLeod R, Desmonts G. Toxoplasmosis. In: Remington JS, Klein JO, eds. *Infectious Diseases of the fetus and newborn infant*, 4th ed Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1995:140-267.
- 24-Ljungstrom I, Gille E, Nokes J, Linder E, Forsgren M. Sero-epidemiology of Toxoplasma gondii among pregnant women in different parts of Sweden. *Eur J Epidemiol* 1995;11:149-56.
- 25-Feldman HA. A nationwide serum survey of United states military recruits, 1962. VI. Toxoplasma antibodies. *Am J Epidemiol* 1965;81:385-91.
- 26-Stray-Pedersen B, Lorentzen-Styr A.M. The prevalence of Toxoplasma antibodies among 11,736 pregnant women in Norway. *Scand J Infect Dis* 1979;11:159-95.
- 27-Ashburn D. History and general epidemiology. In: *Human toxoplasmosis*. HO-Yen DO, Joss AWL, editors. Oxford: Oxford Medical publications, 1992.p.1-25.
- 28-Beattie CP. The ecology of toxoplasmosis. *Ecol Dis* 1982;1:13-20.
- 29-Chatterton JMW. Pregnancy In: *Human toxoplasmosis* HO-Yen DO, Joss AWL, editors. Oxford: Oxford Medical Publications, 1992.p.144-83.
- 30-Desmonts G, Couvreur J. Toxoplasmosis in pregnancy and its transmission to the fetus. *Bull NY Acad Med* 1974;50:146-59.
- 31-Aspöck H, Pollak A. Prevention of prenatal toxoplasmosis by serological screening of pregnant women in Austria. *Scand J Infect Dis* 1992; Suppl 84:34-7.
- 32-Thulliez P. Screening programme for congenital toxoplasmosis in France. *Scand J Infect Dis* 1992; Suppl 84:43-5.

Sero-epidemiology of Toxoplasma Infection in Pregnant Women Referred to Al Zahra Hospital in Tabriz

Dalimiasl A^{1*}, Arshad M¹

(Received: 30 Jun. 2010

Accepted: 7 Jun. 2011)

Abstract

Introduction: Immunity to *Toxoplasma gondii* infection is known to be a critical point for women during pregnancy. Non immune pregnant women may at risk to be infected with the parasite. The parasite can be transmitted via placenta and causes adverse effects in fetus. The main objective of the present work was to study sero-epidemiology of *Toxoplasma* infection in pregnant women referred to Al Zahra hospital in Tabriz.

Materials & Methods: Totally 300 blood samples were collected from 18-35 years pregnant women referred to Al-Zahra hospital in Tabriz during one year. The sera were tested for IgG and IgM titration with ELISA kits. In addition, demographic characteristics of the women were obtained through appropriate questionnaires.

Findings: Positive IgG and IgM titers were identified in the sera of 26.33% and 0.33% of the pregnant women, respectively. The higher frequency of positive titers was associated with older age. In addition, 97.46% of the women with positive titer had a history of contact with cats.

Discussion & Conclusion: Regarding the prevalence rate of 73.33% in non-immune pregnant women in Tabriz, the preventive measurements in nutrition and contact with cats should be considered by the women. We recommend the sera of the pregnant women should be monitored for *Toxoplasma* infection at least once a year, particularly during the first trimesters of pregnancy.

Keywords: toxoplasma gondii, IgG, IgM, pregnant women, Tabriz

1. Dept of Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
* (corresponding author)