

بررسی خصوصیات سایکومتریک پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

رضا ولیزاده^{*}، فروزان کاوری زاده^۱، مسعود یاسمی^۲، محمد رسول یاسمی^۳، میلاد رشیدی‌بیگی^۴، حامد توان^۵

(۱) گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

(۲) گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

(۳) کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

تاریخ پذیرش: ۹۳/۷/۸

تاریخ دریافت: ۹۳/۲/۱۳

چکیده

مقدمه: پرسشنامه سلامت عمومی برای شناسایی اختلالات روانی به کار برده می‌شود، هدف این مطالعه تعیین خصوصیات سایکومتریک پرسشنامه سلامت عمومی فرم ۲۸ سوالی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه متداول‌ژیک بر روی ۱۱۸ نفر از دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر ایلام که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند صورت گرفت. در این مطالعه از پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی استفاده شد. برای تعیین روابط پرسشنامه از روش روابط سازه (تحلیل عاملی) و برای تعیین پایایی آن از روش همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد.

یافته‌های پژوهش: پرسشنامه سلامت عمومی از شش عامل مستقل تشکیل شده است که به ترتیب عامل اول بیماری سرد در نمره ($14/221 \pm 2/884$)، عامل دوم بی خوابی نمره ($12/419 \pm 2/484$)، عامل سوم لذت از زندگی نمره ($10/451 \pm 2/090$)، عامل چهارم سلامتی نمره ($10/387 \pm 2/076$)، عامل پنجم احساس بی ارزشی نمره ($9/960 \pm 1/992$) و عامل ششم اقدام به خودکشی نمره ($8/423 \pm 1/685$) را کسب کرده‌اند. هم چنین ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد ۶۹ درصد به دست آمد.

بحث و نتیجه گیری: فاکتور اول از پرسشنامه سلامت عمومی شامل سوالات (۲-۶)، فاکتور دوم (۸-۱۰)، فاکتور سوم (۱۸-۲۱)، فاکتور چهارم (۷)، فاکتور پنجم (۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۲) و فاکتور ششم شامل سوالات (۲۷، ۲۸) بوده‌اند.

واژه‌های کلیدی: سلامت عمومی، تحلیل عاملی، خصوصیات سایکومتریک، ایلام

*نویسنده مسئول: کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

Email: Hamedtavan@gmail.com

مقدمه

افسردگی(۷ سوال) می باشد،(۶). تحلیل عاملی اعم از اکتشافی و تاییدی و محاسبه آلفای کرونباخ، از جمله راه هایی هستند که برای اندازه گیری روابطی سازه و نیز اندازه گیری پایایی ثبات درونی مورد استفاده قرار می گیرند. تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس روابط بین گویه ها، متغیرهای پنهان یا اندازه گیری نشده را ارائه و برای آن ها تولید فرضیه می کند. در تحلیل عاملی تاییدی فرضیه های مربوط به ساختار متغیرها مورد آزمون قرار می گیرند،(۶). هدف مطالعه حاضر تعیین خصوصیات سایکومتریک پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ-28) می باشد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع مطالعات متداول‌ژیک است. جامعه پژوهش را دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانه ادب، ابتدایی شهید علی اشرف نعمتی، ابتدایی دخترانه تزکیه و راهنمایی دخترانه نمونه مرضیه شهر ایلام در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ بوده است. دلایل انتخاب مدارس به این صورت بوده است که این مدارس در مرکز شهر قرار دارند و بیشتر اشاره را شامل می شود. نمونه در پژوهش حاضر طبق جدول مورگان ۱۱۸ نفر از دانش آموزان مذکور می باشد و نمونه گیری به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انجام شد. در این روش دانش آموزان ششم ابتدایی، دوم راهنمایی و سوم راهنمایی به عنوان یک خوشه و قرار گرفتن در هر یک از کلاس ها به عنوان یک طبقه لحاظ شدند. در ادامه با استفاده از فهرست دانش آموزان هر کلاس به عنوان چارچوب نمونه گیری، انتخاب نمونه به روش تصادفی ساده صورت گرفت. برای اندازه گیری سلامت عمومی دانش آموزان از پرسش نامه ۲۸ سوالی سلامت عمومی(GHQ-28) استفاده شد. این پرسش نامه در دیگر مطالعات نیز استفاده شده است.(۵،۳،۲)

پرسش نامه سلامت عمومی: در این مطالعه با استفاده از روش دلفی متغیرهای سلامت عمومی طی ۳ مرحله تبادل اطلاعات بین محقق و ۱۰ نفر از صاحب نظران در حوزه سلامت عمومی مشخص شدند و پیش فرضی بر اساس نظرات نهایی صاحب نظران این بود که هر کدام از عوامل اصلی تشکیل دهنده سلامت عمومی با زیر مجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد که جهت تایید این پیش فرض از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که تحلیل عاملی تاییدی برآش ساختار ۶ عاملی پرسش نامه را تایید کرد.

سلامتی را طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط بیماری یا ناقص بودن تعریف می کنند، فرد دارای سلامت روانی از سه ویژگی عمده از جمله احساس راحتی، احساس درست نسبت به دیگران و قدرت تأمین نیازهای زندگی برخوردار است،(۱). در این سال ها به دلیل صنعتی شدن و مهاجرت، نیمی از مردم جهان در شهرها و حومه آن زندگی می کنند و باعث تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی شده و استرس ها و مشکلات روانی اجتماعی افزایش پیدا کرده است،(۱). اختلالات روانی دانش آموزان، مشکلات فراوانی در زندگی ایجاد می کند و می تواند خانواده، مدرسه و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. اختلالات روانی باعث افت تحصیلی دانش آموزان و هم چنین اختلال در رشد شناختی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان می شود،(۲). بهداشت روانی حالت خاصی از روان است که سبب بهبود رشد و کمال شخصیت انسان می گردد و به فرد کمک می کند که با خود و دیگران سازگاری داشته باشد،(۳). در یک مطالعه گزارش شده است که دانشجویان و دانش آموزان پسر و دختر از منابع مختلفی استرس دریافت می کنند و نحوه واکنش آن ها به استرس با یکدیگر متفاوت است،(۴). نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که بین سطح اضطراب پنهان و آشکار و میزان پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد،(۵،۴). رابطه بین سلامت عمومی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اما مقدار و شدت این ارتباط متفاوت بوده است،(۴). دانش آموزان بخش عظیمی از جمعیت جامعه ما را تشکیل می دهند و این گروه گردانندگان جامعه فردا خواهد بود. یکی از شروط موفقیت نظام آموزش و پرورش برخوردار بودن دانش آموزانی سالم است و وجود مشکلات روانی و جسمی در امر آموزش دانش آموزان تاثیر جوی داشته و افت تحصیلی و گاهی ترک تحصیل را به دنبال دارد. بنا بر این توجه به تأمین سلامت روانی دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و سلامت روانی فرد بخش اساسی و مهم در تأمین سلامت جسمانی است. ابزاری که برای اندازه گیری سلامت عمومی استفاده می شود پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ-28) که شامل ۲۸ سوال(حیطه علائم فیزیکی ۷ سوال، علائم اضطراب ۷ سوال)، کارکرد اجتماعی(۷ سوال)، علائم

یافته های پژوهش

میانگین سن دانش آموزان پسر ۱۱/۹ سال(انحراف معیار ۱/۹۸) و میانگین سن دانش آموزان دختر ۱۲/۱ سال(انحراف معیار ۱/۸۸) بود. در جدول شماره ۱ اطلاعات توصیفی از ۶ عامل پرسشنامه سلامت عمومی آمده است. برای کل سوالات ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۶ آمده است. برای یک از عامل های پرسشنامه سلامت عمومی در جدول شماره ۲ نشان داده شده است. در جدول شماره ۳ ساختار عوامل مفروضی که تحت آزمون قرار گرفته اند، نشان داده شده است. در این جدول ۴ متغیر پنهان، دسته بندی های علائم فیزیکی، علائم اضطراب، کارکرد اجتماعی، علائم افسردگی نشان داده شده است که تعداد متغیرهای مشاهده شده ۲۸ عدد معادل ۰/۲۸ گویی ابزار بود.

گویه ۱، ۳ و ۵ روی حیطه علائم فیزیکی، گویه ۸ و ۱۰ روی حیطه علائم اضطراب، گویه ۱۵، ۱۶، ۱۹ و ۲۰ روی حیطه کارکرد اجتماعی و گویه ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ روی علائم افسردگی مقادیر کمتر از ۰/۱ داشتند. آماره های برازش پیشنهاد می کنند که این گروه بهترین برازش را برای داده ها فراهم کرده است($CFI=0/93$) و $RMSEA=0/08$ ، چرا که هر دوی این آماره ها دارای مقادیر مطلوب هستند. در جدول شماره ۴ سطح معناداری و همبستگی سوالات پرسشنامه آورده شده است. در جدول شماره ۵ نام فاکتور مورد استفاده تحلیل عاملی پرسشنامه سلامت عمومی آورده شده است که نشان می دهد این پرسشنامه از ۶ فاکتور تشکیل شده است که هر کدام دارای نام اختصاصی اند.

برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی سازه(تحلیل عاملی) و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش روایی سازه(تحلیل عاملی) و برای تعیین پایایی آن از روش همسانی درونی(ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد. پایایی پرسشنامه با قرار دادن پرسشنامه نهایی در اختیار ۱۰ نفر از دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانه ادب انجام گرفت و بعد از یک هفته مجدداً به همین ۱۰ نفر داده شد، با توجه به این که پاسخ های داده شده به همدیگر نزدیک بودند پایایی پرسشنامه نیز تایید شد، ضمناً این ۱۰ نفر در پژوهش شرکت نکردند. در این مطالعه از پرسشنامه ۲۸ سوالی سلامت عمومی به روش دلفی استفاده شده است که ۷ سوال آن علائم فیزیکی، ۷ سوال علائم اضطراب، ۷ سوال کارکرد اجتماعی، ۷ سوال علائم افسردگی را اندازه گیری می کرد. سوالات بر اساس مقیاس لیکرت ۴ گزینه ای تنظیم شده بودند. روایی سازه ۴ حیطه پرسشنامه EQS سوالی سلامت عمومی با نرم افزار چند متغیره vol.6.1 با برآورد حداقل درست نمایی تجزیه و تحلیل شد.

مهم ترین سوال مدنظر، روایی محتوا بود، بدین منظور که آیا این پرسشنامه واقعاً مفهوم سلامت عمومی را اندازه گیری می کند یا نه؟ این فرضیه که آیا ساختار ۶ عاملی به روش تحلیل عاملی تایید می شود یا نه، و نیز روایی ساختار (Construct Validity) مورد آزمون قرار گرفت. برای ارزشیابی برازش عاملی از محدود کاری، شاخص مقایسه ای برازش (CFI) و جذر میانگین محدوده خطای تقریب (RMSEA) استفاده شد.

جدول شماره ۱. اطلاعات توصیفی مربوط به عوامل و امتیاز کل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

عوامل	کمترین امتیاز	بیشترین امتیاز	میانگین	انحراف معیار
بعد جسمانی	.	۱۸	۶/۷۲	۴/۱۹۴
اضطراب	.	۲۰	۸/۲۲	۴/۷۳۵
بعد اجتماعی	.	۱۸	۶/۸۰	۷/۸۳۹
بعد افسردگی	.	۲۱	۶/۷۸	۵/۴۳۷
امتیاز کل	۱	۷۲	۲۸/۵۲	۱۵/۲۲۴

جدول شماره ۲. آلفای کرونباخ پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-28)

آلفای کرونباخ	عوامل
۰/۵۶۹	بعد جسمانی
۰/۶۴۴	اضطراب
۰/۵۹۵	کارکرد اجتماعی
۰/۶۹۶	بعد افسرده‌گی

جدول شماره ۳. تحلیل عاملی تاییدی پرسش نامه سلامت عمومی

حیطه‌ها	سوالات سلامت عمومی	سطح معناداری	همبستگی
علائم	۱. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کاملاً خوب و سالم هستید؟	۰/۰۰۲	۰/۶۶
فیزیکی	۲. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروی تقویتی نیاز دارید؟	۰/۱۵	۰/۶۳
اضطراب	۳. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟	۰/۰۰۷	۰/۶۸
	۴. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید؟	۰/۱۷	۰/۶۱
	۵. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید؟	۰/۰۰۱	۰/۷۵
	۶. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستعمال بسته اید یا این که فشاری به سرتان وارد می‌شود	۰/۲۲	۰/۵۸
	۷. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقت‌ها بدنتان داغ و یا سرد می‌شود؟	۰/۱۸	۰/۶۳
علائم	۸. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بخوابی شده باشید؟	۰/۰۹	۰/۵۹
اضطراب	۹. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شب‌ها وسط خواب بیدار می‌شوید؟	۰/۰۳۱	۰/۶۶
	۱۰. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائمًا تحت فشار هستید؟	۰/۰۰۱	۰/۷۶
	۱۱. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلق شده اید؟	۰/۱۰	۰/۶۴
	۱۲. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بیرون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید؟	۰/۱۷	۰/۶۱
	۱۳. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاری از توانایی شما خارج است؟	۰/۱۲	۰/۷۹
	۱۴. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصی هستید و دلشوره دارید؟	۰/۱۱	۰/۷۱
کارکرد اجتماعی	۱۵. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟	۰/۰۷	۰/۶۲
	۱۶. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت بیشتری را صرف انجام کارها نمایید؟	۰/۰۸	۰/۶۱
	۱۷. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به طور کلی احساس کرده اید که کارها را به خوبی انجام می‌دهید؟	۰/۱۱	۰/۵۵
	۱۸. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می‌کنید؟	۰/۲۲	۰/۵۹
	۱۹. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده دارید؟	۰/۰۰۱	۰/۷۹
	۲۰. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانایی تضمیم گیری درباره مسائل را داشته اید؟	۰/۰۰۶	۰/۷۱
	۲۱. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیت‌های روزمره زندگی لذت برید؟	۰/۱۶	۰/۶۵
علائم	۲۲. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟	۰/۰۰۹	۰/۶۱
افسرده‌گی	۲۳. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اساس کرده اید که زندگی کاملاً نامید کننده است؟	۰/۰۰۱	۰/۶۳
	۲۴. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟	۰/۰۸	۰/۶۶
	۲۵. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مسئله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟	۰/۰۹	۰/۶۱
	۲۶. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی‌توانید کاری انجام دهید؟	۰/۱۵	۰/۵۹
	۲۷. آیا از یک ماه گذشته تا امروز به این نتیجه رسیده اید که ای کاش مرده بودید و کلاً از شر زندگی خلاص می‌شدید؟	۰/۱۹	۰/۶۰
	۲۸. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید؟	۰/۱۳	۰/۶۹

جدول شماره ۴. همبستگی بین عامل‌های پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

عوامل	بعد جسمانی	اضطراب	بعد اجتماعی	بعد افسردگی
بعد جسمانی	۱	.۰/۶۰۶	۱	
اضطراب		.۰/۵۴۳		.۰/۷۰۳
بعد اجتماعی			.۰/۴۸۹	.۰/۵۰۹
بعد افسردگی				۱

جدول شماره ۵. نام مورد استفاده در فاکتور تحلیل عاملی پرسشنامه سلامت عمومی

نام فاکتور	شماره سوال	نام مورد استفاده در فاکتور	کل	درصد واریانس	فرآوانی تجمی
۱	۶،۵،۴،۳،۲	بیماری و سر درد	۲/۸۴	۱۴/۲۲	۱۴/۲۲
۲	۱۰ و ۹،۸	بی خوابی	۲/۴۸	۱۲/۴۱	۲۶/۶۴
۳	۲۱ و ۲۰،۱۹،۱۸	لذت از زندگی	۲/۰۹۰	۱۰/۴۵	۳۷/۰۹
۴	۷ و ۱	سلامتی	۲/۰۷۶	۱۰/۳۸	۴۷/۴۶
۵	۲۶ و ۲۵،۲۴،۲۲	احساس بی ارزشی	۱/۹۹	۹/۹۶	۵۷/۹۳
۶	۲۸ و ۲۷	اقیام به خودکشی	۱/۶۸	۸/۴۲	۶۵/۸۵

بحث و نتیجه گیری

گیرید ولی بر خلاف آماره CFI هر چه به صفر نزدیک تر باشد مطلوب تر است و مقادیر کمتر از ۰/۱ نشان دهنده خوبی برآورده است. مقادیر آلفای کرونباخ بالا بیانگر ثبات درونی می باشد. در مطالعه حاضر برای همه عامل‌های سلامت عمومی، آلفای کرونباخ بیشتر از ۰/۵۹ بود و بیانگر این است که پرسشنامه مورد بررسی دارای ثبات درونی رضایت‌بخشی برای دانش آموزان است. بازگیری گویی ها روی عامل‌های ۶ گانه یعنی تایید ساختار نظری و اصلی پرسشنامه می باشد. مقادیر خطاهای باقی مانده یا خطاهای اندازه گیری پایین بودند. در واقع این نوع خطاهای ذاتی است که تا حدی در همه ابزارهای تحقیقی وجود دارد و با ساختارهای پنهان زمینه ارتباطی ندارد. در کل این مقادیر پایین باقی مانده به نوعی تاییدکننده این است که هر چند ماهیت سوالات تا حدودی ذهنی بود، اما ابزار مورد بررسی، پایا و روا بوده و اگر در دفعات مختلف از این ابزار استفاده شود، نتایج یکسانی را فراهم می کنند. بالا بودن ضرایب همبستگی بین عامل‌ها نشان دهنده وایسته بودن آن‌ها به هم می باشد. علی‌رغم این که این مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه را مشخص کرده بود ولی چندین محدودیت وجود داشت اول این که میزان جواب‌های واقع گرایانه دانش آموزان چون که پرسشنامه‌ها بعد از ترم اول یعنی پایان امتحانات توزیع شده بودند و شاید بر نحوه پاسخ‌گویی دانش آموزان تاثیر گذاشته باشد. یکی

مطالعه حاضر نشان داد که پرسشنامه سلامت عمومی می تواند به عنوان یک ابزار روا و پایا برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص شناسایی اختلالات روانی مورد استفاده قرار گیرد. برای تعیین روایی سازه و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی، از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده شد. تحلیل عاملی تاییدی در پی پاسخ به این پرسشنامه است که روابط مفروض یا پیش‌بینی شده بین متغیرها تا چه اندازه با روابط موجود داده‌های واقعی مشاهده هم خوانی دارد؟ آن‌چه که رویکرد تحلیل عاملی را از سایر بررسی‌های سنتی ثبات داخلی متمایز می کند این است که در تحلیل عاملی تاییدی خطای اندازه گیری بررسی می شود و پایایی آزمون-پس از آزمون از طریق ثبات خطای اندازه گیری نسبتاً کم به دست آمده از تحلیل عاملی صورت گرفته است.^(۶) در این مطالعه نشان می دهد که پذیره‌های تحلیل عاملی تاییدی احراز شده‌اند. برای ارزشیابی برآوردهای شاخص مقایسه‌ای برآوردهای (CFI) و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEA) استفاده شد. شاخص مقایسه‌ای برآوردهای (CFI) معمولاً دامنه بین صفر و یک داشته و مقادیر بیشتر از ۰/۹۰ نشان دهنده خوبی برآورده است. استفاده از آماره CFI بر آماره هایی مانند شاخص نیکویی برآوردهای (GFI) و شاخص تدریجی برآوردهای (IFI) ترجیح دارد. آماره RMSEA هم دامنه بین صفر تا یک را در بر می

دانشجویان و دیگر گروه‌های سنی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

سپاسگزاری

از تمامی عزیزانی که در انجام این مطالعه به ما یاری رساندند به خصوص همکاران دانشگاه علوم پزشکی ایلام تشکر و قدردانی می‌گردد.

دیگر از محدودیت‌های مطالعه تعداد حجم نمونه مطالعه بوده است که به دلیل تعداد کم دانش آموزان در این مدارس بوده است.

پرسش نامه سلامت عمومی می‌تواند به عنوان ابزاری روا و پایا برای دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد. این پرسش نامه می‌تواند به یک راهنمای عملی برای اندازه‌گیری و تعیین سطح سلامت عمومی افراد باشد. در پایان توصیه می‌شود که روابی و پایابی پرسش نامه در

References

- 1.Zare S, Shabani N, BabaeiHeydarami A, Asghari M, Aminizadeh R, Nazemorroaya V, et al. [Investigation of the relationship between general health and workers' sleep quality and work industries co Sirjan.] J Ilam Uni Med Sci 2013 ; 21:112-9.(Persian)
- 2.Tavakolizadeh J, EbrahimiQavam S, Farrokhi N, Golzari M.[A study on the efficacy of teaching self-regulated learning strategies on mentalhealth in boys studying in second grade of junior-high school in mashhad.] J Fundament Ment Health 2011; 13: 250-9. (Persian)
- 3.Amin-Khandaghi M, Pakmehr H. [The relationship between students' critical thinking and mental health Inmashhad University of medical sciences.] J Fundament Mental Health 2011; 13: 114-23. (Persian)
- 4.Delaram M,Salehian T, Froozandeh N, Alidoosti M. [Comparison of general health in droupout andnon-droupout students of shahrekorduniversity of medical sciences.] J Ilam Uni Med Sci 2011; 20:1-8. (Persian)
- 5.Noorbala AA, BagheriYazdi SA , Yasamy MT, Mohammad K. Mental health survey of the adult population iniran. Br J Psychiatry 2004;184:70-3.
- 6.Aubi E, Shadnoush M, Nazarzadeh M, Bidel Z, Ranaei A, Delpisheh A. [Translation and assessment of validity andreliability of the health-promoting lifestyle questionnaire, using factor analysis.] Pejouhandeh 2012; 17:114-20. (Persian)



Psychometric Properties of the General Health Questionnaire (GHQ -28)

Valizade R¹, Kawarizadeh F², Yasemi M³, Rasool-Yasemi M³, Rashidbeigi M³, Tavan H^{3}*

(Received: May 3, 2014)

Accepted: September 30, 2014)

Abstract

Introduction: The General Health Questionnaire (GHQ) is used to detect mental disorders. The aim of this study was to determine the psychometric properties of the 28 questions version of the General Health Questionnaire (GHQ -28).

Materials & Methods: In a methodological study, 118 secondary school students in the city of Ilam were selected through random sampling method. In this study, the 28 questions version of the General Health Questionnaire was used. Construct validity was used to determine the validity and internal consistency (Cronbach's alpha coefficient) was used to determine the reliability.

Finding: The GHQ is composed of six factors, The first factor is headache with the score of (14.22 ± 2.88) , the second

factor is insomnia with the score of (12.42 ± 2.48) , the third factor is joy of life with the score of (10.45 ± 2.09) , the fourth factor is health with the score of (10.387 ± 2.08) , the fifth factor is feelings of worthlessness with the score of (9.96 ± 1.99) and the sixth factor is suicide attempt with the score of (8.42 ± 1.68) , respectively. Cronbach's alpha coefficient for the scale was found to be 69%.

Discussion & Conclusion: The first factor of GHQ included questions, the second factor included questions, the third factor included questions, the fourth factor included questions, the fifth factor included questions and the sixth factor included questions.

Keywords: General healthQuestionnaire (GHQ), factor analysis, psycho-metric properties, Ilam

1. Dept of Psychiatry, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

2. Dept of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. Student Research Committee, Ilam University of medical Sciences, Ilam, Iran

* Corresponding author