

بررسی وضعیت سلامت سالمدان ساکن استان ایلام در سال ۱۳۹۰-۹۱

رضا بیرانوند^{۱*}، شبم شکوهی^۲، مهران بابانزاد^۱، میثم بهزادی فر^۱، علی دل پیشه^۳

- (۱) گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
- (۲) کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
- (۳) مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تاریخ پذیرش: ۹۲/۱/۲۰

تاریخ دریافت: ۹۱/۸/۱۹

چکیده

مقدمه: شایع ترین علل بیماری و مرگ و میر در سنین سالخوردگی بیماری‌های غیر مسری از جمله بیماری‌های قلبی-عروقی، پرفشاری خون، سکته و دیابت می‌باشد، این در حالی است که بسیاری از این بیماری‌ها قابل پیشگیری هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی بیماری‌های جسمی، روانی و حوادث در سالمدان استان ایلام انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی ۱۰۱۲ نفر به صورت تصادفی و از طریق نمونه گیری خوشه ای وارد مطالعه گردیدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته صورت پذیرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS vol.16 و آزمون‌های آماری کای دو و t مستقل داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌های پژوهش: میانگین شاخص توده بدنی واحدهای مورد مطالعه $4/48 \pm 4/25$ کیلوگرم بر مترمربع و ۵۵/۲ درصد افراد دارای میانگین توده بدنی بالاتر از حد طبیعی بودند. شیوع بیماری‌ها و مشکلات جسمی و روانی افراد تحت مطالعه شامل سابقه آرتربیت ۷۲/۸ (درصد)، فشارخون ۵۳ (درصد)، مشکل بینایی (۴۹/۸ درصد)، سابقه بیماری‌های عفونی (۴۳/۹ درصد)، اختلال خواب (۴۰/۱ درصد)، بیماری قلبی (۳۶/۱ درصد)، مشکل ادراری (۳۰/۶ درصد)، سابقه بیماری‌های روحی (۲۴/۶ درصد)، مشکل تنفسی (۲۲/۵ درصد)، دیابت (۱۴/۸ درصد)، سکته مغزی (۱۲/۶ درصد) بود. سقوط از ارتفاع با ۱۸ درصد مهم ترین سوانح و حوادث را به خود اختصاص داده است.

بحث و نتیجه گیری: شیوع بیماری‌های غیر واگیر از جمله آرتربیت و پرفشاری خون در بین سالمدان، برای سلامت عمومی جامعه نگران کننده است. غربالگری و آموزش بهداشت برای این گروه سنی توصیه می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: استان ایلام، سالمدان، وضعیت سلامت

*نویسنده مسئول: گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Email: alidelpisheh@yahoo.com

مقدمه

عروقی(بیماری های عروق کرونر قلب)، پرفشاری خون، سکته، دیابت، سرطان، بیماری های انسدادی مزمن ریه، بیماری های عضلات و مفاصل نظیر آرتربیت و استئومیلت، بیماری های اعصاب و روان نظیر دمانس و افسردگی، اختلالات بینایی، شنوایی، بی اختیاری ادراری و مشکلات دندانی می باشند.^(۱)

از جمله مهم ترین اختلالات دوران سالمدانی، بیماری های قلبی-عروقی است. این بیماری علت اصلی مرگ در افراد ۶۵ ساله و بالاتر در هر دو جنس،^(۱،۱۵،۱۶) و مسئول بخش بزرگی از بار بیماری ها و ناتوانی در جامعه می باشد.^(۱۶) دیابت نیز یکی دیگر از بیماری های شایع در دوران سالمدانی است و میزان شیوع آن در افراد بالای ۶۵ سال در سرتاسر جهان ۲۵-۴۰ درصد برآورد شده است.^(۱۷) حدود سه چهارم از بیماران دیابتی بیش از ۵۰ سال سن دارند.^(۱)

در حدود یک سوم از افراد بالای ۶۰ سال دارای یک ناتوانی در سیستم شنوایی خود هستند. حدود ۳۳ درصد از افراد ۷۵-۸۴ ساله و حدود نیمی از افراد بالای ۸۵ سال دچار ناشنوایی می باشند. با افزایش سن، میزان بینایی نیز کاهش می یابد و انعطاف پذیری چشم کم می شود. همین طور اختلالات بینایی جدی مانند آب مروارید، گلوکوم و کوری ۷-۱۵ درصد از افراد مسن را تحت تاثیر قرار می دهد.^(۱۸) شایع ترین عامل واحد محدودیت فعالیت و بی حرکتی سالمدان، خدمات ناشی از افتادن می باشد. از جمله شایع ترین علل سقوط سالمدان را ضعف عضلات تشکیل می دهد.^(۱)

جهت دستیابی به سلامت سالمدان و تامین نیازهای این گروه سنی، اولین گام شناسایی وضع موجود می باشد. بنا بر این مطالعه حاضر با هدف شناسایی وضعیت سلامت، بیماری و نیز تعیین شیوع بیماری های شایع سالمدان ساکن در استان ایلام صورت پذیرفته است.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد ۱۰۱۲ نفر از سالمدان ساکن استان ایلام در سال ۹۰-۹۱ مورد مطالعه قرار گرفتند. معیار ورود به مطالعه مطابق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، داشتن سن ۶۰ سال و بالاتر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و جمعیت سالمدان استان ایلام بر اساس آخرین آمارها در هنگام اجرای طرح، با ۹۵ درصد اطمینان و حداقل خطای ۵ درصد با استفاده از نرم افزار StatCalc تحت برنامه Epi-info

پیشی جمعیت اشاره به کاهش نسبت کودکان و افراد جوان و افزایش نسبت افراد ۶۰ ساله و بیشتر دارد.^(۱،۲) تقریباً در تمامی کشورهای جهان به دلیل کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، نسبت افراد بالای ۶۰ سال سریع تر از هر گروه سنی دیگر در حال افزایش است.^(۳-۸) اگر چه جمعیت کشورهای پیشرونه بیش از یک قرن است که به پیشی گراییده شده است، این روند در کشورهای در حال توسعه اخیراً آغاز شده است.^(۹) بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ تعداد کل سالمدان دنیا حدود ۷۰ میلیون نفر برآورد شده است و پیش بینی می شود که این رقم در ۴۰ سال آینده به ۲ برابر افزایش یابد. این در حالی است که ۵۲ درصد این میزان در کشورهای آسیایی سکونت داشته و حدود ۴۰ درصد کل جمعیت سالمدان در کشورهای پیشرونه به سر می برند.^(۱۰) در سال ۲۰۰۰، تقریباً ۱۰ درصد از مردم جهان، ۶۰ سال و بیشتر سن داشتند. تا سال ۲۰۵۰ با توجه به روند فعلی رشد جمعیت در سنین مختلف این میزان به ۲۰ درصد خواهد رسید. بیشتر افزایش جمعیت سالخوردهان در کشورهای کمتر توسعه یافته رخ می دهد.^(۱۱) در این کشورها، جمعیت افراد سالخورده از ۴۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۱/۷ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت.^(۱۱،۱۲) هر ساله ۱/۷ درصد به جمعیت جهان افزوده می شود اما این افزایش برای جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر ۲/۵ درصد است و پیش بینی می شود که ربع قرن دیگر ۱/۲ میلیارد نفر(حدود ۱۴ درصد) از ساکنان کره زمین را افراد ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل دهند. کشور ایران هم از این تغییر جمعیتی بی نصیب نبوده است. شاخص های آماری نشان می دهد که در فاصله ۲۰ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۵ به میانه سنی جمعیت کشور ۱۰ سال افزوده خواهد شد.^(۱۳)

برخلاف سنین کودکی، شایع ترین عوامل مولد بیماری و مرگ در سنین سالخوردهان را بیماری های غیر مسری تشکیل می دهند و این در حالی است که بسیاری از این بیماری ها قابل پیشگیری هستند و بروز بعضی از آن ها را می توان به تعویق اندخت.^(۱) تقریباً ۷۵ درصد از سالمدان ۶۵ ساله و بالاتر دچار حداقل یک بیماری مزمن هستند و حدود ۵۰ درصد از آن به دو بیماری مزمن مبتلا هستند.^(۱۴)

مهم ترین بیماری های مزمن دوران سالخوردهانی در سطح جهان شامل بیماری های قلبی-

اندازه گیری قد، وزن، نیض، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بعد از مصاحبه با سالمدان و تکمیل پرسش نامه صورت می گرفت. اندازه گیری قد برای سالمدانی که می توانستد به راحتی بایستند و بدون قوز در کمر یا پاها بودند؛ در حالت ایستاده و نزدیک به دیوار با استفاده از متر نواری انجام می شد اما برای سایر سالمدان که قادر به ایستادن نبودند، با استفاده از مقیاس اندازه گیری شاخص توده بدنی، ابتدا فاصله فوقانی زانو تا کف پا اندازه گیری و سپس بر اساس راهنمای آن بر حسب این فاصله، سن و جنس سالمند، قد واقعی وی اندازه گیری می شد. وزن سالمدان با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقیق ۱۰۰ گرم، حداقل لباس و بدون کفش اندازه گیری شد. اندازه گیری فشارخون نیز از دست راست، در حالت نشسته و بعد از ۳۰ دقیقه استراحت و تکمیل پرسش نامه صورت پذیرفت.

داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۶.0 و نیز آزمون های توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد فراوانی، میانگین، میانه و انحراف معیار و هم چنین آزمون های تحلیلی کای دو و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش

در مجموع ۱۰۱۲ سالمند شامل ۶۱۲ نفر مرد (۵/۰) درصد) و ۴۰۰ نفر زن (۵/۳۹) درصد) وارد مطالعه گردیدند. (جدول شماره ۱) میانگین سنی افراد تحت بررسی ۷۰/۱ \pm ۸/۰۲ سال بود. بیشتر سالمدان مورد مطالعه در گروه سنی ۶۹-۶۵ سال (۱/۳۰) درصد) بودند. بیش از یک سوم واحدهای مورد مطالعه (۸/۳۵) درصد) بازنیسته دستگاه های دولتی و غیردولتی بودند. از سالمدان مورد مطالعه ۴/۵۱ درصد در مناطق شهری و ۶/۴۸ درصد در مناطق روستایی ساکن بودند. از نظر جنسیت، اختلاف معنی داری در شهرستان های هشت گانه مشاهده نشد. (P=0.2) (جدول شماره ۲).

در مطالعه حاضر، ۱/۳۶ درصد از سالمدان سابقه ابتنای به بیماری های قلبی و ۵۳ درصد دارای سابقه پرفشاری خون بودند. میانگین فشارخون سیستولیک ۰/۳۳۳ با انحراف معیار ۳/۳۸ و میانگین فشارخون دیاستولیک ۱/۱۱ با انحراف معیار ۰/۱۱ میلی متر جیوه بود. در مجموع ۸/۱۴ درصد از سالمدان مورد مطالعه بنا به تشخیص پزشک مربوطه، مبتلا به دیابت بودند. هم چنین ۲/۵۵ درصد دارای میانگین توده بدنی بالاتر از حد طبیعی

۱۴۰۰ نفر تعیین گردید. از این تعداد ۱۲/۱۰ نفر در نهایت وارد مطالعه گردیده و بنا بر این میزان مشارکت در مطالعه ۲۸/۷۲ درصد بوده است.

گردآوری داده ها با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفت. روایی این پرسش نامه با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت. جهت تایید پایابی، ۱۵ نفر از سالمدان شهر ایلام به طور تصادفی در یکی از محلات مرکز شهر انتخاب گردیدند و مصاحبه با آنان صورت پذیرفت که با نظر مشاور آماری و همکاران طرح، تعدادی از سوالات پرسش نامه مورد بازنگری قرار گرفت. آلفای کرونباخ به دست آمده برای این پرسش نامه ۷۸ درصد بود. این پرسش نامه شامل دو بخش اصلی حاوی سوالاتی در خصوص وضعیت دموگرافیک مانند سن، جنس، سواد، وضعیت تا هل، درآمد و شغل در بخش اول و نیز سوالاتی در خصوص سابقه ابتنای به بیماری های مزمن نظیر بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و فشارخون در بخش دوم بود.

روش نمونه گیری در این مطالعه ترکیبی از روش های نمونه گیری خوش ای و تصادفی ساده بود. در این روش، هر شهرستان به عنوان یک خوش در نظر گرفته شد سپس با توجه به نقشه شهری و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جغرافیائی از هر یک از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکزی در هر یک از شهرستان های (خوش) ها، تابعه استان ایلام شامل ایلام، ایوان، آبدانان، دره شهر، دهلران، شیروان چرداول، مهران و ملکشاهی، یک خیابان به صورت تصادفی از لیست خیابان های آن ناحیه، (۵) منطقه (جغرافیایی) انتخاب و پژوهشگر با مراجعه به درب منازل واقع در آن خیابان در صورت حضور فرد واجد شرایط شرکت در مطالعه تا تکمیل سقف در نظر گرفته شده برای هر خوش از ایشان دعوت به عمل آورده، پرسش نامه تکمیل می شد و اندازه گیری های مورد نیاز صورت می گرفت. مراجعته به درب منازل از ابتدای خیابان مورد نظر شروع شده و تا آن جا ادامه می یافت که حجم نمونه مورد نیاز کامل شود. در شرایطی که در یک خانوار دو نفر یا بیشتر سالمند وجود داشت؛ به طور تصادفی یک نفر از آنان انتخاب و وارد مطالعه می گردید. در صورتی که فرد واجد شرایط شرکت در مطالعه در خانه مورد مراجعت حضور نداشت ضمن عذرخواهی و تشکر به خانه بعدی مراجعت می شد. مصاحبه با نمونه ها با کسب رضایت کنی از خانواده و خود سالمند صورت می گرفت.

یا لنز، ۱۲/۹ درصد از عصاء، ۳/۵ درصد از سمعک، ۱/۸ درصد از واکر، ۱ درصد از ویلچر و ۰/۵ درصد از چوب زیر بغل به عنوان وسائل کمک حرکتی استفاده می کردند. نزدیک به نیمی از سالمندان مورد مطالعه(۴۴/۹ درصد) فاقد دندان و ۴۲/۴ درصد از دندان مصنوعی استفاده می کردند. از نظر وضعیت حس شناوی، بیش از یک چهارم سالمندان مورد مطالعه(۱/۲۵ درصد) از عارضه سنگینی گوش رنج می بردن، ۱/۴ درصد از آنان از سمعک استفاده می کردند، ۲۴/۴ درصد دچار وزوزگوش بودند و ۲۵/۸ درصد دچار عدم تعادل در راه رفتن بودند. به علاوه ۲۹/۳ درصد نیز در هنگام مطالعه دچار سرگیجه می شدند.

از نظر وضعیت حس بینائی، ۴۹/۸ درصد از سالمندان تحت بررسی دچار مشکل بینایی بودند که تنها ۳۴ درصد آن ها از عینک استفاده می کردند. ضمناً ۶۰ درصد از افراد مورد مطالعه دچار مشکل بینایی بودند به نحوی که با استفاده از عینک، وضعیت دید آن ها بهتر می شد. اکثر سالمندان دچار نقص بینایی(۹/۳۶ درصد) از لنز داخل چشمی چه رفع نقص استفاده می کردند. هم چنین تقریباً یک پنجم(۹/۱۸ درصد) از واحدهای پژوهش، دچار تاری دید در هر دو چشم و ۱۷/۱ درصد دچار تاری دید در یک چشم بودند.

در این مطالعه نیاز به دندان بیشترین فراوانی نیازمندی به اعضاء مصنوعی را در سالمندان مورد مطالعه به خود اختصاص داد(۴/۳۲ درصد). بعد از آن به ترتیب نیاز به عینک و یا لنز با(۶/۱۶ درصد) و نیاز به سمعک با(۱/۹ درصد) بیشترین نیازمندی سالمندان به وسایل کمکی را به خود اختصاص دادند.(جدول شماره ۴)

مقایسه واحدهای مورد مطالعه بر حسب جنسیت نشان داد که اختلاف معنی داری بین مردان و زنان سالمند مورد مطالعه از نظر استفاده از عینک، عصاء، چوب زیر بغل مشاهده نگردید($P>0.05$). با این وجود زنان سالمند به طور معنی داری بیشتر از مردان از ویلچر استفاده می کردند($CI=1/0.9-4/38; P=0.0001$). هم چنین اختلاف معنی داری بین مردان و زنان سالمند مورد مطالعه از نظر استفاده از دندان مصنوعی مشاهده شد به نحوی که در جنس مونث، بیشتر استفاده می کردند($OR=1/8; CI=1/39-2/33; P=0.0001$).

بودند. میانگین شاخص توده بدنی واحدهای مورد مطالعه ۲۵/۷۲ با انحراف معیار ۴/۴۸ کیلوگرم بر مترمربع بود. از نظر شیوع بیماری های عفونی، ۴۳/۹ درصد از سالمندان مورد پژوهش، سابقه ابتلا به بیماری های عفونی داشتند. بیشترین عفونت ها شامل عفونت ریوی و گوش میانی بود. در مجموع ۳۰/۶ درصد دچار مشکل ادراری و از جمله سوزش ادرار و ۲۹/۱ درصد سابقه سنگ کلیه داشتند. در مطالعه حاضر، ۲۲/۵ درصد از افراد تحت مطالعه دچار مشکل تنفسی بودند.

از نظر وضعیت هضم و جذب سیستم گوارشی، بخش عمده ای از سالمندان مورد مطالعه اظهار داشتند که مشکل خاصی نداشته اند(۶۴/۸ درصد) با این حال ۲۴/۸ درصد از آن ها دچار بیوست بودند، ۳/۴ درصد دچار بیوست توازن با علائم هموروئید، ۱/۸ درصد صرفًا علائم هموروئید داشتند و ۵/۱ درصد دچار اسهال بوده اند. نزدیک به ۳ درصد از سالمندان تحت بررسی دچار انواع مختلف اسهال(خونی، آبکی و یا چرکی) بودند.

در حدود یک چهارم از سالمندان ۲۵/۹ درصد دچار لرزش در دست و سر بوده اند. به علاوه ۴۵/۹ درصد از سالمندان در طول روز احساس سرگیجه، دچار احساس خشکی پا و یا شکسته شدن ناخن و ناراحتی لای انگشتان پا و ۴۰ درصد نیز دچار دلشوره و استرس بوده اند. در مجموع ۱۸/۲ درصد از وضعیت جسمی خود ناراضی و ۴۶/۸ درصد دچار فراموشی در درجات مختلف، ۱/۴ درصد دچار اختلال خواب و ۵۱/۱ درصد دچار کمردرد بوده اند.

از نظر فراوانی سابقه دردهای اسکلتی-عضلانی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ۴۵/۳ درصد از افراد مورد پژوهش سابقه جراحی، ۷۲/۸ درصد سابقه آرتربیت، ۶۴/۶ درصد سابقه درد اسکلتی و ۱۲/۶ درصد سابقه سکته مغزی داشتند.

افتادن از ارتفاع(۱۸ درصد) بیشترین فراوانی سوانح و حوادث را تشکیل داده است. بعد از آن به ترتیب مسمومیت با دارو(۱/۶ درصد)، سوختگی(۴/۲ درصد)، حوادث ترافیکی(۴ درصد)، مسمومیت با گاز(۱/۲ درصد) بیشترین سوانح و حوادث را به خود اختصاص داده است.(جدول شماره ۳)

در مطالعه حاضر ۴۵/۵ درصد از افراد مورد مطالعه از دندان مصنوعی، تقریباً یک چهارم(۹/۴ درصد) از عینک

جدول شماره ۱. اطلاعات دموگرافیک سالمندان استان ایلام شرکت کننده در مطالعه در سال ۹۰-۹۱

درصد (تعداد)	نام متغیر
39/5(400)	زن
60/5(612)	مرد
51/4(520)	شهر
48/6(492)	روستا
19/0(191)	شاغل
81/0(814)	بیکار
69/7(700)	وضعیت تأهل
27/9(280)	بدون همسر به دلیل فوت همسر
1/2(12)	بدون همسر به دلیل طلاق
0/3(3)	هرگز ازدواج نکرده
1/0(10)	زندگی دور از همسر
61/4(617)	سطح تحصیلات
21/0(211)	بی سواد
6/3(63)	نهضت سوادآموزی
5/3(53)	فقط در حد خواندن
6/1(61)	دیپلمستان
	دیپلم و بالاتر

جدول شماره ۲. شیوع بیماری‌ها و مشکلات جسمی شایع در سالمندان استان ایلام به تفکیک شهرستان‌های تابعه در سال ۹۱-۹۰

P	شهرستان(تعداد(درصد))								نام بیماری
	ملکشاهی	شیروان	دره شهر	دهلران	مهران	آبدانان	ایوان	ایلام	
0/2	41(11/8)	33(9/5)	44(12/7)	32(9/2)	39(11/2)	37(10/7)	45(13/0)	76(21/9)	قلبی-عروقی
0/049	14(9/9)	12(8/5)	17(12/1)	20(14/2)	11(7/8)	23(16/3)	12(8/5)	32(22/7)	دیابت
0/03	13(8/2)	12(7/5)	22(13/8)	13(8/2)	15(9/4)	22(13/8)	19(11/9)	43(27/0)	اعتياد به سیگار
0/2	65(12/8)	53(10/4)	56(11/0)	46(9/0)	59(11/6)	52(10/2)	64(12/6)	114(22/4)	پرفساری خون
0/3	56(14/6)	48(12/5)	36(9/4)	45(11/7)	45(11/7)	34(8/9)	41(10/7)	79(20/6)	اختلال خواب
0/2	26(12/0)	18(8/3)	31(14/4)	17(7/9)	23(10/6)	28(13/0)	21(9/7)	52(24/1)	تنفسی
0/8	20(11/7)	15(8/8)	21(12/3)	14(8/2)	24(14/0)	16(9/4)	22(12/9)	39(22/8)	سابقه حمله قلبی
0/00	42(9/8)	34(7/9)	62(14/5)	31(7/2)	44(10/3)	55(12/9)	52(12/1)	108(25/2)	سابقه بیماری‌های عفونی
0/01	108(15/3)	90(12/8)	70(9/9)	72(10/2)	83(11/8)	62(8/8)	76(10/8)	144(20/4)	آرتربیت
0/6	47(16/5)	39(13/7)	33(11/6)	27(9/5)	31(10/9)	28(9/9)	24(8/5)	55(19/4)	سابقه سنگ کلیه
1/00	17(13/9)	13(10/7)	14(11/5)	13(10/7)	14(11/5)	13(10/7)	12(9/8)	26(21/3)	سابقه سکته مغزی

جدول شماره ۳. اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث در سالمندان استان ایلام شرکت کننده در مطالعه در سال ۹۱-۱۳۹۰

سوانح و حوادث	درصد(فراوانی)
افتادن از ارتفاع	18/0(176)
حوادث ترافیکی	4/0(39)
سوختگی	4/3(42)
مسومیت با گاز یا نفت، سم و ...	1/2(12)
مسومیت با غذا یا دارو	6/1(60)

جدول شماره ۴. فراوانی استفاده وسایل کمکی سالمندان استان ایلام شرکت کننده در مطالعه در سال ۹۱-۱۳۹۰

استفاده از وسایل کمکی	درصد(فراوانی)
عينک و لنز	24/9(244)
عصا	13/9(136)
چوب زیر بغل	0/5(5)
واکر	1/8(18)
وبلجر	1/0(10)
سمعک	3/5(34)
دندان مصنوعی	45/5(445)

کمتر از مطالعه حاضر می باشد. هم چنین در مطالعه حسینی و همکاران در بابل(۱۳۸۵-۸۶)، شیوع بیماری های قلبی-عروقی ۲۹/۶ درصد گزارش گردید،(۲۲)، که از مطالعه حاضر کمتر بود. در مطالعه جفتایی و همکاران در کاشان(۱۳۸۳)، نزدیک به نیمی از سالمندان مبتلا به بیماری قلبی-عروقی بوده اند،(۲۳)، که باز هم نسبت به مطالعه حاضر شیوع بیشتری دارد. میانگین فشارخون سیستولیک افراد مورد مطالعه ۱۳۳/۰۳۸ با انحراف معیار ۲۳/۳۸ و میانگین فشارخون دیاستولیک این افراد برابر ۷۶/۱۱ با انحراف معیار ۱۱/۰۲ بود. در مطالعه عزیزی و همکاران(۱۳۸۲) با عنوان قند و لیپید تهران، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک زنان بیشتر از مردان بود،(۲۴). پرفشاری خون از عوامل موثر بر بروز بیماری های مزمن است بنا بر این غربالگری و شناسایی افراد مبتلا به فشارخون و درمان آن می تواند در پیشگیری از بعضی

بحث و نتیجه گیری

در مطالعه حاضر، ۳۶/۱ درصد از سالمندان مورد مطالعه سابقه ابتلا به بیماری های قلبی را داشته اند و ۵۳ درصد از آن ها دارای سابقه فشارخون بالا هم بوده اند. در مطالعه شریفی راد و همکاران(۱۳۸۵) در اصفهان ۳۲/۲ درصد از سالمندان به بیماری قلبی مبتلا بوده اند که میزان آن از مطالعه حاضر کمتر می باشد،(۱۹). درستی و علوی(۱۳۸۳) که ۱۶۹۴ نفر از سالمندان ساکن اصفهان را مورد مطالعه قرار داده بودند شیوع بیماری قلبی را ۲۶/۴ درصد گزارش کردند،(۲۰). در مطالعه توتونچی و همکاران(۱۳۸۳)، بیماری های قلبی و فشارخون به ترتیب ۳۷ درصد و ۴۱/۵ درصد سالمندان را گرفتار کرده بود،(۲۱)، که البته شیوع فشارخون در مطالعه ما بیشتر می باشد. در مطالعه درستی و همکاران در اصفهان(۱۳۸۶)، شیوع بیماری های قلبی-عروقی ۲۶/۴ درصد گزارش شد،(۲۰)، که بسیار

ریوی بودند،(۲۳). نزدیک به یک چهارم از سالمدان مورد پژوهش(۲۳/۸ درصد) دچار مشکل شناخت زمان، ۲۲/۸ درصد دچار مشکل شناخت مکان، ۲۲/۲ درصد دچار مشکل شناخت اشخاص، ۲۵/۹ درصد دچار لرزش در دست و سر بوده اند. به علاوه ۴۵/۹ درصد از سالمدان مورد پژوهش در طول روز احساس سرگیجه، ۴۰/۱ درصد احساس خشکی پا و یا شکسته شدن ناخن و ناراحتی لای انگشتان پا و ۴۰ درصد دچار دلشوره و استرس بوده اند. در مجموع ۱۸/۲ درصد از افراد تحت بررسی از وضعیت جسمی خود ناراضی و ۴۶/۸ درصد از سالمدان مورد مطالعه به درجات مختلف دچار فراموشی، ۴۰/۱ درصد دچار اختلال خواب و ۵۱/۱ درصد دچار کمردرد بوده اند. مطالعه جفتایی و همکاران در شهر کاشان نشان داد که ۵ درصد از سالمدان تحت بررسی دچار اختلالات شناختی شدید، ۴۷/۵ درصد دچار اختلالات شناختی متوسط و ۳۶ درصد دچار اختلالات شناختی خفیف بودند.(۲۳)

از نظر فراوانی سابقه دردهای اسکلتی عضلانی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ۴۵/۳ درصد از افراد مورد پژوهش سابقه جراحی، ۷۲/۸ درصد سابقه درد مفاصل، ۶۴/۶ درصد سابقه درد اسکلتی و ۱۲/۶ درصد سابقه سکته مغزی داشتند. در مطالعه اکبری کامرانی و همکاران ۵۴/۶ درصد از افراد تحت بررسی دچار مشکلات اسکلتی عضلانی بودند،(۲۵). در مطالعه منظوری و همکاران نیز ۳۸ درصد از سالمدان تحت بررسی از درد شدید مفاصل و اندام ها رنج می برند.(۲۶)

افتادن از ارتفاع(۱۸ درصد) بیشترین فراوانی سوانح و حوادث را در سالمدان مورد مطالعه به خود اختصاص داده بود. بعد از آن به ترتیب مسمومیت با دارو(۱/۱ درصد)، سوختگی(۴/۲ درصد)، حوادث ترافیکی(۴ درصد)، مسمومیت با گاز(۱/۲ درصد) رخ داده بود. در مطالعه سالاروند و همکاران شیوع زمین خوردن ۲۴/۸ درصد گزارش گردیده است،(۲۷). در مطالعه تینینی و همکاران میزان شیوع زمین خوردن در بیش از یک سوم سالمدان ۶۵ ساله و بالاتر گزارش گردیده است،(۲۸). مصرف الکل به ویژه در سالمدان خطر زمین خوردن را به شدت افزایش می دهد. پژوهش های اخیر به نقش بی اختیاری و تکرار ادرار در زمین خوردن سالمدان اشاره نموده است،(۲۹). اگر چه به واسطه آموزه های دینی و فرهنگی خوشبختانه مصرف الکل در بین مسلمانان بسیار محدود بوده و میل به صفر می کند. مطالعه شوارتز و همکاران به نقش دیابت در میزان زمین خوردن به خصوص در بین زنان اشاره دارد به نحوی که

بیماری های مزمن موثر باشد. آموزش همگانی در خصوص رژیم غذایی، ورزش، استعمال سیگار، مقابله با استرس و فشارهای زندگی از مواردی است که از ابتلای افراد به پرفساری خون جلوگیری می کند.

در کل ۱۵ درصد از سالمدان مورد مطالعه بنا به تشخیص پزشک مربوطه، مبتلا به دیابت بودند. در مطالعه توتونچی و همکاران، ۱۵/۵ درصد مبتلا به دیابت بودند،(۲۱)، که تقریباً مشابه با مطالعه حاضر می باشد. شیوع دیابت در مطالعه درستی و همکاران در اصفهان ۱۷/۴ درصد گزارش شده است،(۲۰)، که اندکی بالاتر از مطالعه حاضر می باشد. تماشای تلویزیون به مدت زیاد در طول شبانه روز از عوامل موثر بر چاقی، دیابت و بیماری های قلبی است که در مطالعه درستی و همکاران،(۲۰)، ارتباط معنی داری را با شیوع دیابت داشته است.

در مجموع ۵۵/۲ درصد از افراد تحت بررسی دارای میانگین توده بدنی بالاتر از حد طبیعی بودند به این صورت که میانگین توده بدنی این افراد ۲۵/۷۲ با انحراف معیار ۴/۴۸ بود. در مطالعه عزیزی و همکاران در مطالعه قند و لیپید تهران نشان داده شد که شاخص توده بدنی زنان و مردان به ترتیب برابر $28/5 \pm 4/6$ و $26/1 \pm 3/9$ کیلوگرم بر متوجه بوده است و زنان بیشتر به اضافه وزن و چاقی مبتلا بوده اند.(۲۴)

از نظر وضعیت هضم و جذب سیستم گوارشی، بخش عمده ای از سالمدان مورد مطالعه اعلام کردند که مشکل خاصی نداشته اند(۶۴/۸ درصد). با این حال ۲۴/۸ درصد از آن ها دچار بیوست بودند، ۳/۴ درصد از آن ها دچار بیوست توان با علائم هموروئید بودند، ۱/۸ درصد صرفاً علائم هموروئید داشتند و ۵/۱ درصد دچار اسهال بوده اند. نزدیک به ۳ درصد از سالمدان تحت بررسی دچار انواع مختلف اسهال(خونی، آبکی و یا چركی) بودند. مطالعه ای که شیوع نشانه های فوق را در سطح کشور نشان دهد یافت نگردید.

از نظر شیوع بیماری های عفونی، ۴۳/۹ درصد از سالمدان مورد پژوهش، سابقه ابتلا به بیماری های عفونی(بیشترین عفونت ها شامل عفونت ریوی و گوش میانی) را ذکر کرده بودند. در مجموع ۳۰/۶ درصد دچار مشکل ادراری مشکل ادراری مربوط به سوزش ادرار بود) و ۲۹/۱ درصد سابقه سنگ کلیه داشتند. در مطالعه جفتایی و همکاران در کاشان مشاهده شد که ۳/۳ درصد از سالمدان دچار مشکلات کلیوی، ۳/۳ درصد از آن ها دچار عفونت گوش و حلق و بینی و ۵/۸ درصد دچار مشکلات

عواملی چون وضعیت اقتصادی بهتر افراد تحت مطالعه نسبت به مطالعه حاضر باشد. در مطالعه توتونچی ۴۴/۱۹ درصد از افراد تحت عمل جراحی کاتاراکت و ۳۰/۲۳ درصد از آن‌ها تحت عمل جراحی برای گلوكوم قرار گرفته بودند.(۲۱)

نزدیک به نیمی از سالمندان مورد مطالعه(۴۴/۹) درصد) فاقد دندان بوده اند و ۴۲/۴ درصد از دندان مصنوعی استفاده می‌کردند. در مطالعه ابراهیمی که بر روی افراد سالمند ساکن خانه سالمندان انجام گرفته است ۲۴ درصد از افراد فاقد دندان بودند و از لئه برای خوردن غذا استفاده می‌کردند،(۳۱)، که البته میزان آن از مطالعه حاضر کمتر است. علت این اختلاف شاید به این دلیل باشد که در مطالعه حاضر پاسخگویان نداشتن یک دندان یا بیشتر را به عنوان بی‌دندانی تلقی می‌کردند در حالی که در مطالعه ابراهیمی و همکاران ۲۴ درصد سالمندان مورد مطالعه هیچ دندان قابل استفاده ای نداشته اند. هم چنین در مطالعه ابراهیمی و همکاران ۵۷ درصد از زنان از دندان مصنوعی استفاده می‌کردند،(۳۱)، که بیشتر از مطالعه حاضر می‌باشد. مطالعه توتونچی و همکاران بر روی سالمندان تهرانی نشان داد که اکثریت نمونه‌ها(۹۷/۸۳ درصد) دارای دندان مصنوعی بوده اند،(۲۱)، که به نظر می‌رسد نقش حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) در تأمین نیازهای اولیه سالمندان بسیار موثر بوده است. البته ممکن است که سالمندان مورد مطالعه توتونچی و همکاران بسیار کمتر از دندان سالم و طبیعی برخوردار بوده اند. بنا بر این آموزش همگانی بهداشت دهان و دندان قبل از دوره سالمندی امری ضروری است. یک دلیل مهم برای پایین بودن میزان استفاده از دندان مصنوعی را می‌توان مشکلات اقتصادی سالمندان در استان ایلام دانست. با توجه به این که سالمندی با کاهش درآمد و از دست دادن شغل هموار است، تهیه دندان مصنوعی مورد نیاز آن‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. در مطالعه حاضر، ۴۲/۴ درصد از سالمندان دچار خشکی دهان، ۲۵/۲ درصد دچار بوی بد دهان، ۹/۲ درصد دچار لقی دندان و ۶/۹ درصد دچار خونریزی از لئه بودند. در مطالعه ای که بهاروند و همتی(۱۳۸۳-۸۴) بر روی خشکی دهان سالمندان آسایشگاه‌های تهران انجام دادند میزان شیوع خشکی دهان در زنان و مردان به ترتیب ۲۷/۹ درصد و ۱۸/۳ درصد گزارش گردید،(۳۲)، که بسیار کمتر از مطالعه حاضر بود. شرایط نمونه گیری در دو مطالعه و سایر بیماری‌های سالمندان را می‌توان از علل اختلاف بین نتایج دو مطالعه دانست. سالمندانی که دندان ندارند در خوردن گوشت و

میزان شیوع زمین خوردن به خصوص در میان زنانی که از انسولین استفاده می‌کرده اند بیشتر بوده است.(۳۰) در مطالعه حاضر ۴۵/۵ درصد از افراد مورد مطالعه از دندان مصنوعی، تقریباً یک چهارم(۴۴/۹ درصد) از عینک یا لنز، ۱۳/۹ درصد از عصا، ۳/۵ درصد از سمعک، ۱/۸ درصد از واکر، ۱ درصد از ویلچر و ۰/۵ درصد از چوب زیر بغل به عنوان وسائل کمک حرکتی استفاده می‌کردند. در مطالعه توتونچی و همکاران، ۶۷/۴۴ درصد از سالمندان مورد مطالعه از وسیله کمک حرکتی استفاده می‌کردند که ۶۱/۳۷ درصد از این افراد از عصا، ۹/۶۵ درصد از چوب زیر بغل، ۱۰/۱۱ درصد از واکر، ۱۸/۸۷ درصد از ویلچر، ۱۸/۶ درصد از اندام مصنوعی فوکانی و ۱۱/۶۲ درصد از اندام مصنوعی تحتانی استفاده می‌کردند.(۲۱)

از نظر وضعیت حس شنوایی، بیش از یک چهارم سالمندان مورد مطالعه(۲۵/۱ درصد) از عارضه سنگینی گوش رنج می‌برند، ۱/۴ درصد از آنان از سمعک استفاده می‌کردند، ۲۴/۴ درصد دچار وزوزگوش و ۲۵/۸ درصد دچار عدم تعادل در راه رفتن بودند. به علاوه ۲۹/۳ درصد نیز در هنگام مطالعه دچار سرگیجه می‌شوند. در مطالعه توتونچی و همکاران(۱۳۸۶)، ۳۴/۷۲ درصد سالمندان از سمعک استفاده می‌کردند،(۲۱)، که این میزان از مطالعه حاضر بالاتر بود و این امر می‌تواند به دو دلیل باشد یکی این که خرید سمعک برای سالمندان مطالعه حاضر از نظر اقتصادی مقدور نبوده و دوم این که در مطالعه توتونچی افراد بیشتری به ناشنوایی یا کم شنوایی مبتلا بوده اند. از دلایل عده بین این اختلاف می‌توان به آلدگی صوتی در شهرهای بزرگ اشاره نمود که روز به روز سیستم شنوایی افراد، به خصوص سالمندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از نظر وضعیت حس بینائی، ۴۹/۸ درصد از سالمندان تحت بررسی دچار مشکل بینایی بودند که تنها ۲۴ درصد آن‌ها از عینک استفاده می‌کردند. ضمناً ۶۰ درصد از افراد مورد مطالعه دچار مشکل بینایی بودند به نحوی که با استفاده از عینک، وضعیت دید آن‌ها بهتر می‌شود. اکثر سالمندان دچار نقص بینایی(۳۶/۹ درصد) از لنز داخل چشمی جهت رفع نقص استفاده می‌کردند. هم چنین تقریباً یک پنجم(۱۸/۹ درصد) از واحدهای پژوهش، دچار تاری دید در هر دو چشم و ۱۷/۱ درصد دچار تاری دید در یک چشم بودند. در مطالعه توتونچی و همکاران، ۷۵/۸۱ درصد از افراد تحت مطالعه از عینک استفاده می‌کردند که از میزان به دست آمده در مطالعه حاضر بیشتر است. بیشتر بودن استفاده از عینک در مطالعه توتونچی می‌تواند ناشی از

جمله پرفسناری خون، دیابت، بیماری های قلبی، سکته های مغزی، آرتربیت و... دارد، آموزش مداوم و ارائه دستورالعمل ها و رژیم های غذایی مناسب می تواند در حفظ و ارتقاء سلامت این گروه سنی بسیار مناسب باشد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از آقایان هادی پیمان و امین صید محمدی که ما را در انجام این طرح یاری رساندند و همین چنین از مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام که حمایت مالی طرح را بر عهده داشتند کمال تشک و قدردانی را داریم.

سایر پروتئین های حیوانی و حتی بعضی از میوه ها که دارای پروتئین لازم برای بدن هستند با مشکل مواجه می شوند و کسانی که دارای دندان لق یا خونریزی از لته هستند موجب آردگی خاطرشنان می گردد که نهایتاً موجب کاهش کیفیت زندگی آن ها می شود.

به عنوان نتیجه گیری نهائی می توان گفت که مشکلات شایع جسمی سالمدان استان ایلام از نظر تنوع تا حدود زیادی به مشکلات جسمی گزارش شده سالمدان از سایر نقاط کشور شباهت دارد. با توجه به این که $55/2$ درصد از سالمدان تحت بررسی در این مطالعه شاخص توده بدنی بالاتر از حد نرمال داشته اند و از آن جا که اضافه وزن و چاقی ارتباط مستقیم با اکثر بیماری های غیرواگیر از

References

- 1-Hatamti H, SM R. Elderly Health. Public Health. Second ed. Tehran: Arjomand; 2009.P.1836-93.
- 2-WHO. Active ageing a policy framework. Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster; 2008.
- 3-Hoseyni SH, Keshavarz SA, Amin A, Maleki M, Abkenar B. Non-dietary factors and nutritional status in elderly patients with heart failure salmand. J Elderly 2010; 5:14-8.
- 4-Hoseyni SH, Keshavarz SA, Amin A, Maleki M, Abkenar B. Causes of disease in elderly. J Elderly 2011;8:22-8.
- 5-Hasanpour DA, Masoodi R, Naderi Pour A, PK R. [The effect of exercise on quality of life of elderly people in Shahrekord city]. Salmand 2008;2:6-12.(Persian)
- 6-Sma Y. [Health Guideline for elderly people above 50 year]. First ed. Behzisri Organization; 2009.(Persian)
- 7-P. Rice D, LE C. Health of the elderly: policy issues and challenges. Health Affairs 1984;3:25-49.
- 8-Asefzadeh SG. [Study of Health-related characteristics of the elderly population in minor zone In Qazvin in order to design re-
- search interventions in 1386]. Salmand 2010;5:53-60.(Persian)
- 9-Kinsella K. Global aging: the challenge of success. Popul Bull 2005;1:32-7.
- 10-Alipour F, Sajadi H, Forozan A, Bigrarian A. [Quality of the elderly people's life living in zone 2 in Tehran]. Salmad 2009; 3:75-83.(Persian)
- 11-WHO. Gender, health and ageing. 2003.
- 12-Shidler SG. Population growth. J Human Trend 2011;5:55-60.
- 13-Mirzai M. [Demography of aged people in Iran based on censuses of population from 1335-1385 Salmand]. 2007;5:326-31. (Persian)
- 14-Linkoln BB. Preventing disability in the elderly with chronic disease. Agency Healthcare Res Qual 2002;3:31-5.
- 15-Kinsella K. Global growth: Human aging. Popul Bull 2010;2:38-42.
- 16-Lye M. General cardiology heart disease in the elderly. Heart 2000;84:560-6.
- 17-Bourdelle-Marchasson I, Helmer C, Fa-got-Campagna A, Dehail P. Disability and quality of life in elderly people with diabetes. Diabetes Metab 2007;33:66-74.
- 18-Smith S. Physical changes of aging. Fact Sheet. 2011;41:24-9.
- 19-Sharifirad GH, Mohebbi S. [Study of

- Coronary Heart Disease in elderly people with history of physical activity member of the retirement center 1385]. J Med Uni Gonabad 2007;12:54-9.(Persian)
- 20-Dorost A.[Relationship of nutritional status in elderly people with Coronary Heart Disease and Diabetes]. J Med Uni Tehran 2007;65:68-71.(Persian)
- 21-Ali T. [Prevalence of common chronic disease and some characteristics associated with disability in the elderly people covered by Tehran imam Khomeini relief committee and its influencing factors]. Payesh 2004;3:219-25.(Persian)
- 22-Hoseyni R, Zabihi A, Savadkohi S, Bijani A. [Prevalence of common Chronic Disease in elderly people in Amirkala Babol]. J Med Uni Babol 2008;10:68-75.(Persian)
- 23-Jaghtai MT. [Study of Health status of elderly people in Kashan]. Salmand 2006; 1;62-7.(Persian)
- 24-Azizi F, Emami H, Salehi P, FGhanbarian A, Mirmiran P. [Risk factors for coronary Heart Disease in the elderly people in Tehran]. Lipid Metab 2004;5:3-14.(Persian)
- 25-Aliabadi Ak. [Studies of prevalence rate of complain and rehabilitation needs of 150 aged people in geriatric research education and rehabilitation center]. Tavanbakhshi 2001;4:21-7.(Persian)
- 26-Manzori L, Anahita B. [Depression and its related factors in Isfahan elderly people]. Salmand 2010;4:43-8.(Persian)
- 27-Salarvand S., Birjandi M. Study of prevalence of Falling and its relationship with chronic disease in Khorrdamabad elderly people. J Med Uni Gonabad 2008;13:34-7.(Persian)
- 28-Meid T. preventing falls in elderly persons. New Eng J Med 2003;38:42-9.
- 29-Teo JH, Briffa NK, Devine A, Dhaliwal SS, Rild P. Sleep problems or urinary incontinence predict falls in elderly women? Auster J Physioth 2006;52:19-25.
- 30-Schwartz AV, Hiller TA, Selleyer DE, Gregg E, Keil E. Older women with diabetes has a higher risk of falls. Diabetes Care 2007;25:1749-54.
- 31-Ebrahimi MM, Vazairi Y. [Dental health and its relationship with Macronutrients and anthropometric parameters in elderly people living in khoban private nursing home in Tabriz]. J Med Uni Tabriz 2007;29:21-7. (Persian)
- 32-Baharvand M. Prevalence of symptoms of dry mouth and burning mouth syndrome in the elderly living in nursing homes in Tehran. Islamic Dent J Dentist Soc 2006; 18:86-91.



Assessment of Health Status in Elderly of Ilam Province

Beiranvand R^{1,2}, Shokoohi S^{1,2}, Babanejad M^{1,2}, Behzadifar M^{1,2}, Delpisheh A^{1,3*}

(Received: 9 Nov. 2012 Accepted: 9 Apr. 2013)

Abstract

Introduction: The most prevalent causes of death in elderly are preventable non-communicable diseases such as hypertension, coronary heart disease, diabetes and stroke. This study was conducted to determine the prevalence of accidental, physical and mental disorders in elderly living in Ilam province.

Materials & Methods: In a cross-sectional study, 1012 participants were recruited using cluster sampling. Data collected using a researcher designed questionnaire and were analyzed by SPSS-16 and Chi-square and independent T tests.

Findings: Mean body mass index of the participant was $25.72 \pm 4.48 \text{ kg/m}^2$ in which more than half (55.2%) were either overweight or obese. The most prevalent physical and mental disorders were; history of arth-

ritis (72.8%), blood pressure (53%), vision problem (49.8%), history of infectious disease (43.9%), sleep disorder (40.1%), heart disease (36.1 percent), urinary disorders (30.6%), history of mental illness (24.6%), respiratory disorders (22.5%), diabetes (14.8%) and stroke (12.6%), respectively. Falling from height with (18%) was the most important accident occurred among elderly.

Discussion & Conclusions: For the public health of society, the non-communicable diseases such as arthritis and hypertension are worrying. Screening and health education actions should be performed for this age group.

Key words: Ilam province, elderly, health and disease

1. Dept of Epidemiology, Faculty of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

2. Students Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

3. Research Centre for Prevention of Social & Psychosocial Injuries, Ilam, Iran

*(corresponding author)