

بررسی فراوانی ژنوتیپ‌های اشريشياکلی يوروپاتوژن مقاوم به چند دارو با استفاده از ژن‌های سيدروفوری iucD iucC iucB iucA و

*ريحانه آبروشن^۱، مرجان شاهايلى^۱

(۱) گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۵/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

چکیده

مقدمه: عفونت مجاری ادراری یکی از رایج‌ترین عفونت‌های باکتریایی در انسان است و مهم‌ترین عامل آن باکتری اشريشياکلی است؛ ازین‌رو، پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تنوع ژنوتیپ‌های اشريشياکلی يوروپاتوژنیک بر اساس ژن‌های iucD iucC iucB iucA انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش، از ۴ مرکز درمانی شهر شیراز، ۱۳۰ نمونه از پلیت‌های حاوی کشت مثبت عفونت‌های ادراری اشريشياکلی جمع‌آوری گردید و پس از تعیین هویت فنوتیپی و ژنوتیپی، ۱۰۰ اینزوله اشريشياکلی يوروپاتوژن جدا شد. استخراج ژنوم باکتری‌ها با استفاده از کیت صورت گرفت و پس از تأیید ژنتیکی جدایه‌ها با استفاده از rRNA ۱۶S، مقاومت و حساسیت آنتی‌بیوتیکی برای ۱۰ آنتی‌بیوتیک از ۹ کلاس با روش دیسک دیفیوژن بر اساس استاندارد CLSI انجام شد. بررسی فراوانی فاکتورهای ویرولانس (ژن iuc) با استفاده از روش مولکولی PCR و پرایمرهای اختصاصی صورت گرفت.

یافته‌های پژوهش: میزان شیوع برای ژن‌های iucA ۹۵ درصد، iucB ۶۰ درصد، iucC ۷۷ درصد و iucD ۹۲ درصد بدست آمد. میزان مقاومت به ۱۰ آنتی‌بیوتیک آریتروماسین، آپی‌سیلین، سفوتاکسیم، نالیدیکسیک اسید، تتراسیکلین، تری‌متوبریم-سولفامتوکسازول، سفپیم، آزترونام، جنتامایسین و نیتروفورانتوئین به ترتیب ۹۵ درصد، ۸۶ درصد، ۶۵ درصد، ۵۱ درصد، ۴۶ درصد، ۴۴ درصد و ۱۴ درصد ارزیابی شد؛ همچنین ۹۸ درصد نمونه‌ها مقاومت چنددارویی داشتند.

بحث و نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که شیوع بالای ژن‌های iuc در میان سویه‌های اشريشياکلی، بیانگر اهمیت این ژن در ایجاد بیماری و تنوع ژنتیکی باکتری است.

واژه‌های کلیدی: اشريشياکلی يوروپاتوژن، سيدروفور، ژن‌های iuc، MDR

* نویسنده مسئول: گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

Email: Shaheli87@yahoo.com

Copyright © 2019 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits copy and redistribute the material, in any medium or format, provided the original work is properly cited.

مقدمه

برای ایجاد عفونت مجاری ادراری، سیستم اکتساب آهن است که باکتری با کمک سیدروفورها، آهن را از محیط جذب می‌کند. ژن aer سیدروفور آئروبакتین را کد می‌کند. از سیدروفورهایی که عامل بیماری‌زایی باکتری اشريشیاکلی هستند، می‌توان به انترباکتین و آئروباكتین اشاره کرد که سیدروفور آئروباكتین توسط محصولات ژن‌های iucA, iucB, iucC, iucD تولید می‌شود (۷). بیوسنتر سیدروفور آئروباكتین به وسیله آنژیم‌های تولیدشده از ژن‌های iucA, iucB, iucC, iucD صورت می‌گیرد و گیرنده غشای خارجی ویژه‌ای جذب این سیدروفور را تسهیل می‌کند (۸). سیدروفور آئروباكتین خود از دو قسمت تشکیل شده است. محصولات ژن‌های iucB, iucD پس از تشکیل شدن توسط محصول ژن iucA که یک پروتئین ۶۳ کیلو دالتونی است، کاتالیز می‌شوند و سپس محصول ژن iucC که یک پروتئین ۶۲ کیلو دالتونی است، با اتصال به محصولات سنتزشده توسط ژن‌های دیگر، آئروباكتین نهایی را تولید می‌کنند. ژن iutA یک پروتئین ۷۴ کیلو دالتونی در غشای خارجی را مشخص می‌کند که به عنوان گیرنده کمپلکس آهن و آئروباكتین عمل می‌کند (۹). آئروباكتین به پروتئین غشای خارجی به نام FepA متصل شده است و به وسیله آن، در فضای پری‌پلاسمیک آزاد می‌گردد. پروتئین ۶۹ کیلو دالتونی Iha و کدشونده توسط ژن iha مستقر در جزیره‌ی پاتوژنیسته (PAI-II)، نوعی عامل ویرولانس با دو عملکرد است که هم به عنوان گیرنده سیدروفور و هم در پروتئین‌های غشای خارجی (Omp) به عنوان ادھسین عمل می‌کند (۱۰). با توجه به شیوع عفونت ادراری در جامعه، ضرورت انجام غربالگری بر اساس ژنوتیپ‌های خاص هر منطقه، تشخیص و درمان به موقع بیماران اهمیت بالایی دارد. با سهل‌انگاری در درمان این عفونت، مشکلات جبران‌ناپذیری در آینده برای بیمار رخ خواهد داد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی ژن‌های سیدروفوری iucB، iucA، iucC و iucD و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی اشريشیاکلی یوروپاتوژن صورت گرفته است.

باکتری اشريشیاکلی یک باسیل گرم منفی متحرك از خانواده انترباکتریاسه است و به عنوان یک باکتری بی‌هوای اختیاری شناخته شده است (۱). بعضی از نژادهای باکتری E.coli خطرناکند و می‌توانند سبب ایجاد بیماری‌های گوناگونی از جمله عفونت ادراری با استفاده از فاکتورهای ویرولانس خود شوند. سویه‌های مولد عفونت ادراری، اشريشیاکلی‌های یوروپاتوژن (UPEC) نام دارند (۲). اشريشیاکلی‌های یوروپاتوژن چندین عامل بیماری‌زا دارند که سبب استقرار و کلونیزه شدن باکتری در اپیتلیوم مخاطی می‌شود و به بافت‌های میزبان آسیب می‌رساند. اتصال باکتری به سلول‌های یوروپاتلیال، مرحله ضروری برای شروع و گسترش عفونت مجاری ادراری است. این فرایند به باکتری اجازه می‌دهد تا در برابر عملکرد شستشوی ادرار، تخلیه مثانه و فعل شدن مسیرهای انتقال پیام در میزبان مقاومت کند (۳). شدت عفونت ادراری به عواملی مانند حساسیت میزبان و وجود عوامل بیماری‌زایی در سویه‌های مولد عفونت بستگی دارد (۴). آهن ماده‌ای غذایی ضروری برای رشد باکتری‌ها است و به عنوان کوفاکتوری برای بسیاری از آنژیم‌ها به کار می‌رود؛ به همین سبب، کسب آهن برای باکتری E.coli اهمیت فراوان دارد. باکتری‌هایی که در بدن انسان کلونی تشکیل می‌دهند، برای تأمین آهن موردنیاز خود با مشکلی جدی روبرو هستند و آن، داخل سلولی بودن بیش از ۹۹/۹ درصد آهن بدن انسان است که از دسترس باکتری خارج است. علاوه بر این، آهن خارج سلولی که در پلاسما و مایع لنفاوی یافت می‌شود، به شدت در اتصال با ترانسفرین‌ها است (۵). باکتری‌ها از سیدروفورها برای کسب آهن، به‌منظور رشد و تکثیر خود استفاده می‌کنند. این موضوع در محدودیت آهن در مجاری ادراری اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا غلظت آهن در عفونت‌های خارج روده‌ای به علت عوامل میزبانی محدود می‌شود و بنابراین، کسب آهن برای رشد باکتری در چنین فضایی بسیار ضروری است (۶). از ویژگی‌های دیگر اشريشیاکلی یوروپاتوژنیک

مواد و روش‌ها

رفت و برگشت تهیه گردید. بدین منظور، محلول ذخیره با غلظت نهایی 100 pM و بر اساس حجم ارائه شده توسط شرکت سازنده تهیه گردید. با افزودن $10 \text{ میکرولیتر آب مقطر میکرولیتر از محلول ذخیره به } 90 \text{ میکرولیتر آب مقطر استریل رقیق و غلظت کاری } 10 \text{ پیکومول فراهم شد. هریک از ویال‌ها تا زمان مصرف در فریزر } -20^\circ\text{C} \text{ (پرمییر، انگلیس) درجه سانتی‌گراد نگهداری گردیدند. آزمون PCR واکنش در حجم } 25 \text{ میکرولیتر شامل } 12/5 \text{ میکرولیتر } 2\times \text{ Mastermix (یاخته صبا آرنا، ایران)، } 2/5 \text{ میکرولیتر } 10 \text{ pM ۴ میکرولیتر DNA Primer و } 6 \text{ میکرولیتر آب مقطر استریل انجام شد.}$

پس از انجام تست‌های بیوشیمیابی، به روش مولکولی PCR و با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن S_{16rRNA}، جنس نمونه‌های اشریشیاکلی ارزیابی گردید (جدول شماره ۱). شرایط مناسب برای انجام واکنش PCR جهت تکثیر ژن‌های مدنظر در دستگاه ترمال سایکلر (بیو رد، آمریکا) بهینه شد. برای کنترل مثبت از سویه ۱۳۳۸ PTCC و برای دیدن باندها از دستگاه ژل داک (ATP-SUV، ایران) استفاده گردید.

جداسازی سویه‌ها: در این پژوهش مقطعی توصیفی، درمجموع ۱۳۰ نمونه در طی ۴ ماه از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸، از آزمایشگاه دکتر تقیزادگان، آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان، آزمایشگاه درمانگاه فرزانگان و آزمایشگاه بیمارستان شهید دوران جمع‌آوری شد. نمونه‌ها مربوط به بیماران مبتلا یا مشکوک به عفونت ادراری بود که طی این چهار ماه، به این مرکز مراجعه کرده بودند. سویه‌های جداشده با استفاده از آزمون‌های بیوشیمیابی استاندارد از قبیل TSI، MR-VP، SIM، Urea، OD و LD (مرک، آلمان) برای تأیید فنوتیپی بررسی گردیدند.

استخراج DNA: استخراج DNA با استفاده از کیت استخراج DNA (یاخته صبا آرنا، ایران)، بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده صورت گرفت. پس از استخراج پرایمراهای مدنظر از مقالات معتبر و NCBI، پرایمراهای برای ساخت به شرکت سیناژن سفارش داده شد و بر اساس دستورالعمل آماده‌سازی پرایم، یک محلول ذخیره و یک محلول کاری برای هریک از پرایم‌رهای

جدول شماره ۱. توالی و مشخصات ژن 16S rRNA

منبع	توالی	طول	موقعیت	اندازه محصول	پرایم
(۱۱)	5'GGGAGTAAAGTTAACCTTGCTC3'	۲۵	۴۷۶-۴۵۲	۵۸۰	16S rRNA_F
(۱۱)	5'TTCCCGAAGGCACATTCT3'	۱۸	۱۰۱۸-۱۰۳۵	۵۸۰	16S rRNA_R
	5'TTCCCGAAGGCACCAATC3'	۱۸	۱۰۱۸-۱۰۳۵	۵۸۰	16S rRNA_R

سفوتاکسیم ($30 \mu\text{g}$ ، سفپیم ($30 \mu\text{g}$ ، آزترونام ($30 \mu\text{g}$ ، جنتامایسین ($10 \mu\text{g}$ ، آزیت‌رومایسین ($15 \mu\text{g}$ ، تراسایکلین ($30 \mu\text{g}$ ، نالیدیکسیک اسید ($30 \mu\text{g}$ ، تری‌متیپریم-سولفامتوکسازول ($1/25 \mu\text{g}$ ، $23/75 \mu\text{g}$ و نیتروفورانتوئین ($10 \mu\text{g}$ ، (پادتن طب، ایران) بررسی شد.

تجزیه و تحلیل آماری: در این مطالعه، نتایج به دست آمده پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند. از روش‌های تحلیلی شامل Chi-square و T-test برای تعیین روابط معنادار در سطح $P \leq 0.05$ در تحقیق حاضر استفاده شد.

در ادامه، واکنش PCR برای بررسی فراوانی ژن‌های iucA, iucB, iucC, iucD با استفاده از پرایمراهای مربوطه (سیناژن، ایران) بر روی نمونه‌ها انجام شد (جدول شماره ۲).

تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی: حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه‌ها، به روش انتشار دیسک (کربی بائی) بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار (مرک، آلمان) و بر اساس دستورالعمل‌های CLSI (and Laboratory Standards Institute) صورت پذیرفت.

مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های جداسازی شده با استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های آمپیسیلین ($10 \mu\text{g}$ ،

جدول شماره ۲. توالی و مشخصات پرایمرهای ژن‌های iuc


هدف	جهت‌گیری	توالی	(nt)	طول محصول (nt)	دماهی اتصال (°C)	منبع
iucA	F	5'CATCAGGCAGTTATCCTGTC3'	768	57		
	R	5'AGTCGTCCTCCTGCATTAC3'				
iucB	F	5'TTCACAGCGGATATGGAC3'	501	56	(۱۲)	
	R	5'CACTTGCTCCAGAAATAC3'				
iucC	F	5'AGACTGGGATTTGGTCAAC3'	721	57		
	R	5'AGACACCATCCTGCCTTC3'				
iucD	F	5'ACAAAAAGTTCTATCGCTTCC3'	771	56	(۱۳)	
	R	5'CCTGATCCAGATGATGCTC3'				

یافته‌های پژوهش


حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی: برای ارزیابی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی از ده آنتی‌بیوتیک آمپیسیلین، سفوتاکسیم، سفپیم، آزترونام، جنتامايسین، آزیترومايسین، تتراسایکلین، نالیدیکسیک اسید، تری‌متپریم-سولفامتوکسازول و نیتروفورانتوئین استفاده گردید که میزان مقاومت آن‌ها به ترتیب ۹۵ درصد، ۸۶ درصد، ۶۸ درصد، ۶۶ درصد، ۶۴ درصد، ۵۱ درصد، ۴۶ درصد، ۴۴ درصد بدست آمد؛ همچنین آنالیز آماری نشان داد ۹۸ درصد سویه‌ها مقاومت چنددارویی (MDR) دارند. شکل شماره ۵ فراوانی مقاومت و حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌های استفاده شده را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، جدایه‌های مطالعه شده به ۷۰ درصد از آنتی‌بیوتیک‌ها بیش از ۵۰ درصد مقاومت نشان داده‌اند. در جدول شماره ۳، درصد و تعداد ژنوتیپ‌های اشرييشياکلی یوروپاتوژن بر اساس ژن‌های فامیل iuc به تفکیک نشان داده شده است. حضور همزمان ژن‌ها در ردیف اول قابل مشاهده است و ۴۴ درصد از اشرييشياکلی یوروپاتوژن ایران کامل ژن را دارند. در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود که حضور داشتن یا نداشتن ایران‌های مطالعه شده، ارتباط ویژه‌ای با بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی ندارد و ارتباط مستقیمی میان این دو دیده نشد.

شناسایی فنوتیپی جدایه‌ها: از میان ۱۳۰ نمونه جدایشده از بیماران مشکوک یا مبتلا به عفونت ادراری، تعداد ۱۱۸ نمونه با بررسی آزمون‌های بیوشیمیایی به عنوان باکتری اشرييشياکلی تأیید شد. شناسایی ژنوتیپی جدایه‌ها: پس از انجام PCR بر روی ژن ۱۶S rRNA و الکتروفوروز در ژل ۲ درصد، ۱۰۰ نمونه بر اساس شکل شماره ۱، واجد باندهای ۵۸۰ جفت بازی بودند. با توجه به تست‌های فنوتیپی و ژنوتیپی، اشرييشياکلی بودن این ۱۰۰ نمونه تأیید گردید. پس از بررسی ژنوتیپی سویه‌ها با استفاده از ژن S ۱۶tRNA PCR با استفاده از پرایم‌رهای ژن‌های iuc برای تشخیص حضور و فراوانی این ژن‌ها انجام شد.


انجام واکنش زنجیره‌ای PCR برای ژن‌های سیلروفوری iuc: نتایج آزمون مولکولی PCR ژن‌ها (بر اساس شکل شماره ۲) نشان داد که از تعداد ۱۰۰ نمونه اشرييشياکلی یوروپاتوژن، ۹۵ نمونه ژن iucA، ۹۲ نمونه ژن iucB، تعداد ۷۲ نمونه ژن iucC و تعداد ۹۲ نمونه ژن iucD داشتند. این پراکندگی ژنی را می‌توان در شکل شماره ۳ مشاهده کرد. شکل شماره ۴ تفاوت میانگین فراوانی ژن‌های مطالعه شده را به صورت ستونی نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، میان حضور همزمان ژن iucD و iucA، iucC و iucD، iucA و iucC، iucB و iucC، iucD و iucB رابطه معناداری شکل گرفته است.




شکل شماره ۱. ژل الکتروفورز محصول PCR ژن ۱۶S rRNA (M: مارکر ۵۰ bp ladder, ۱: کنترل مثبت، ۲ تا ۷: نمونه مثبت)




شکل شماره ۲. ژل الکتروفورز محصول PCR ژن های iucA، iucB، iucC و iucD که M مارکر ۵۰ bp ladder و ۱ کنترل مثبت است. در iucA نمونه مثبت ۲-۶ و نمونه منفی ۷، در iucB نمونه مثبت ۷-۲ و نمونه منفی ۸ و ۹، در iucC نمونه مثبت ۵-۲ و نمونه منفی ۶ و ۷ و در iucD نمونه مثبت ۲-۶ و نمونه منفی ۷ و ۸ است.



شکل شماره ۳. نمودار درصد فراوانی ژن‌های مطالعه شده فامیل iuc (نمودار افقی اسامی ژن‌ها و نمودار عمومی درصد فراوانی ژن‌ها را نشان می‌دهد).



شکل شماره ۴. مقایسه میانگین و ارتباط معنادار حضور هم‌زمان ژن‌های مطالعه شده



شکل شماره ۵. فراوانی مقاومت و حساسیت آنتی‌بیوتیکی

جدول شماره ۳. تعیین ژنتیپ جدایه‌های اشریشیاکلی یوروپاتوژن بر اساس ژن iuc

iuc	درصد ایزوله‌های دارای ژن‌های فامیل	تعداد ایزوله‌های دارای ژن‌های فامیل	تعداد ژن	درصد
iucA, iucB, iucC, iucD	۴۴ درصد	۴	۴۴	۴
iucA, iucB, iucD	۳۷ درصد	۳	۱۰	۳
iucA, iucC, iucD			۲۷	
iucA, iucB	۱۳ درصد	۲	۳	
iucA, iucC			۱	
iucA, iucD			۸	
iucB, iucD			۱	
iucA	۵ درصد	۱	۲	
iucB			۱	
iucD			۲	
None	۱ درصد	.	۱	

جدول شماره ۴. مقایسه حضور داشتن یا نداشتن هم‌زمان ژن‌های iuc(A,B,C,D) با بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های مطالعه‌شده

عدم هم‌زمان ژن‌های iuc(A,B,C,D)	حضور هم‌زمان ژن‌های iuc(A,B,C,D)	مقابل	مقابل	مقابل
حساسیت	مقاومت	حساسیت	مقاومت	حساسیت
۱۴/۲۹ درصد	۸۵/۷۱ درصد	۱۲/۶۴ درصد	۶۵/۳۶ درصد	آمپی‌سیلین
۱۴/۲۹ درصد	۸۵/۷۱ درصد	۱۸/۱۹ درصد	۸۱/۸۱ درصد	سفوتاکسیم
۴۸/۲۱ درصد	۵۱/۷۹ درصد	۵۰ درصد	۵۰ درصد	سفپیم
۳۳/۹۳ درصد	۶۶/۰۷ درصد	۳۱/۸۲ درصد	۶۸/۱۸ درصد	آرتوونام
۳۷/۵ درصد	۶۷/۵ درصد	۳۱/۸۲ درصد	۶۸/۱۸ درصد	جنتاماپین
۵/۳۶ درصد	۹۴/۶۴ درصد	۴/۵۵ درصد	۹۵/۴۵ درصد	آریتروماپین
۱۹/۶۴ درصد	۸۰/۴۶ درصد	۲۷/۲۸ درصد	۷۲/۷۲ درصد	ترراسایکلین
۷/۱۴ درصد	۹۱/۸۶ درصد	۶/۸۲ درصد	۹۱/۱۸ درصد	نالیدیکسیک اسید
۳/۳۶ درصد	۶۹/۶۴ درصد	۳۱/۸۲ درصد	۶۸/۱۸ درصد	تری‌متوبیریم-سولفامتوکسازول
۸۰/۳۶ درصد	۱۹/۶۴ درصد	۸۴/۰۹ درصد	۱۵/۹۱ درصد	نیتروفورانتوئین
تعداد ۵۶ ایزوله				تعداد ۴۴ ایزوله

بحث و نتیجه‌گیری

میزان مقاومت به ۱۰ آنتی‌بیوتیک آریتروماپین، آمپی‌سیلین، سفوتاکسیم، نالیدیکسیک اسید، تراسایکلین، تری‌متوبیریم-سولفامتوکسازول، سفپیم، آرتوونام، جنتاماپین و نیتروفورانتوئین به ترتیب ۹۵ درصد، ۸۶ درصد، ۶۸ درصد، ۶۵ درصد، ۶۴ درصد، ۵۱ درصد، ۴۶ درصد، ۴۴ درصد و ۱۴ درصد به دست آمد.

محمودی و همکارانش در سال ۲۰۱۹، با انجام مطالعه‌ای بر روی ۱۰۰ ایزوله اشریشیاکلی در همدان، فراوانی ژن iucA را ۸۶ درصد گزارش کردند (۱۴). لینگ و همکارانش در سال ۲۰۱۳، طی مطالعه‌ای بر روی سویه‌های از باکتری اشریشیاکلی، میزان شیوع ژن iucC ۲۳ درصد اعلام نمودند (۱۵). در پژوهشی که در سال ۲۰۱۳، بیزادانی و همکاران در سمنان بر روی اشریشیاکلی یوروپاتوژن انجام دادند، فراوانی ژن iucD

اشریشیاکلی مهم‌ترین عامل ایجادکننده عفونت مجاری ادراری است. این باکتری برای بقا در مجاری ادراری و ایجاد عفونت، به سیدرووفورهای جاذب آهن نیاز دارد. در این پژوهش، با مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی بر روی ۱۳۰ نمونه عفونت مجاری ادراری، فراوانی ژن‌های سیدرووفوری iuc در میان سویه‌های مقاوم به چند دارو بررسی شد.

در مطالعه حاضر، ۴۴ درصد از جدایه‌های اشریشیاکلی یوروپاتوژن هر چهار ژن مطالعه‌شده را به طور هم‌زمان داشته‌اند؛ همچنین فراوانی ژن‌های iucD و iucC به ترتیب ۹۵ درصد، ۶۰ درصد، ۷۲ درصد و ۹۲ درصد بود. این نتایج نشان می‌دهد سویه‌های جداسازی شده دارای عوامل لازم برای استقرار و کلونیزاسیون در مجاری ادراری را دارند که بیانگر حدت این جدایه‌ها است.

درصد و ۱۴ درصد پیدا کرده‌اند که به غیر از نیتروفورانتوئین، سایر موارد با اندکی افزایش همراه است. از سوی دیگر، جدایه‌های مطالعه شده به ۷۰ درصد آنتی‌بیوتیک‌های مصرفی، بیش از ۵۰ درصد مقاومت نشان داده‌اند. گفتنی است که برخلاف پژوهش ژانگ، در این تحقیق میزان MDR ۹۸ درصد به دست آمد. این روند روبه‌افزايش مقاومت چند آنتی‌بیوتیکی، از کارایی نداشتند آنتی‌بیوتیک‌ها در فرایند درمان نشان دارد و همین مسئله درمان عفونت مجاری ادراری و کلیه را با مشکل موواجه می‌کند (۲۴). با توجه به اینکه ۹۵ درصد از جدایه‌ها ژنA iucB، ۶۰ درصد ژن iucC ۷۲ درصد ژن iucD و ۹۲ درصد ژن iucD داشتند، می‌توان چین نتیجه گرفت که تغییرات ژنتیکی در میان باکتری‌ها بسیار زیاد است و این تغییرات هر از چندی عامل شکل‌گیری سویه‌ای مهاجم‌تر نسبت به سویه‌های پیشین می‌شود.

با توجه به تنوع ژنتیکی به دست آمده در این پژوهش پیشنهاد می‌گردد این سویه‌ها از لحاظ دیگر عوامل ویروناس بررسی گردند تا بتوان مقایسه جامع‌تری درباره عوامل بیماری‌زای سویه‌های اشريشیاکلی عامل عفونت‌های ادراری به دست آورد.

سپاس‌گزاری

نویسنده‌گان مقاله از همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان که مراحل عملی این تحقیق در آزمایشگاه این دانشگاه انجام شده است، تشکر و قدردانی می‌کنند. مقاله ارسالی بر اساس پایان‌نامه با شماره ثبت ۹۵۱۳۹۷۱۱۹۶۹۹، تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ در سامانه پژوهشیار نوشته شده است.

۹۶ درصد گزارش شد. این گزارش با پژوهش حاضر همخوانی دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که درصد بالای شیوع این ژن در این باکتری، نقش بسزایی در ایجاد عفونت ادراری دارد (۱۶). طی مطالعات نیک‌پیران و همکاران در سال ۲۰۱۸، در تبریز که بر روی ۱۱۷ نمونه صورت گرفت، درصد شیوع ژن iucD ۴۵/۹ درصد گزارش کردند (۱۷). مون و همکارانش در سال ۲۰۰۴ در ژاپن، با بررسی بیوسترن آثرباکتین، درصد شیوع ژن‌های iuc را به ترتیب ۳۷ درصد iucA، ۴۳ درصد iucB، ۴۶ درصد iucC و ۵۰ درصد iucD اعلام نمودند (۱۸). درصد شیوع ژن‌های iuc ناحصل از پژوهش یادشده، کمتر از درصدهای به دست آمده در مطالعه حاضر است. مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مقالات یادشده نشان می‌دهد که درصد بیشتری از سویه‌ها واحد یک یا چند ژن iuc بوده‌اند. این موضوع می‌تواند به علت انتشار و گسترش این ژنوتیپ‌ها در مناطق جغرافیایی گوناگون صورت گرفته باشد.

طی تحقیقاتی که محققان در کشورهای مختلف، در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ انجام داده‌اند، مقاومت به آمپی‌سیلین ۸۵/۷۱ درصد (۱۹)، نالیدیکسیک اسید ۶۳ درصد (۲۰)، تتراسایکلین ۲۶/۵۳ درصد (۲۱)، جنتامايسین ۴۳/۳ درصد (۲۲) و نیتروفورانتوئین ۱۸/۹ درصد بوده است (۲۳): همچنین مطالعات ژانگ و همکاران در سال ۲۰۱۷ نشان داد که ۸۷/۶ درصد از نمونه‌ها MDR بودند (۱۹). مقایسه نتایج مطالعات بالا با یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که آنتی‌بیوتیک‌های آمپی‌سیلین، نالیدیکسیک اسید، تتراسایکلین، جنتامايسین و نیتروفورانتوئین به ترتیب مقاومت‌های ۸۶ درصد، ۶۶ درصد، ۴۴

References

1. Momtaz H, Karimian A, Madani M, Dehkordi FS, Ranjbar R, Sarshar M, et al. Uropathogenic Escherichia coli in Iran: serogroup distributions, virulence factors and antimicrobial resistance properties. *Ann Clin Microbiol Antimicrob* 2013;12:8. doi:10.1186/1476-0711-12-8.
- 2.Tenaillon O, Skurnik D, Picard B, Denamur E. The population genetics of commensal Escherichia coli. *Nat Rev Microbiol* 2010; 8:207. doi:10.1038/nrmicro2298.
- 3.Antao EM, Wieler LH, Ewers C. Adhesive threads of extraintestinal pathogenic E. coli. *Gut Path* 2009;1:22. doi:10.1186/1757-4749-1-22.
- 4.Tarchouna M, Ferjani A, Benselma W, Boukadida J. Distribution of uropathogenic virulence genes in E. coli isolated from patients with urinary tract infection. *IJD* 2013; 17:450-3.
- 5.Baghal L, Mehdi S, Mousavi Gargari SL, Rasooli I. Antibody production against enterobacteriaceae using recombinant Ferric Enterobactin protein. *Pathobiol Res*2009; 12:83-92.
- 6.Grigoryan L, Trautner BW, Gupta K. Diagnosis and management of urinary tract infections in the outpatient setting a review. *JAMA* 2014; 312:1677-84. doi:10.1001/jama.2014.12842.
- 7.Ejrnaes K. Bacterial characteristics of importance for recurrent urinary tract infections caused by E. coli. *Dan Med Bull* 2011; 58:4187.
- 8.Santo E, Macedo C, Marin JM. Virulence factors of uropathogenic E. coli from a University hospital in Ribeirao Preto Sao Paulo Brazil. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 2006; 48:185-8. doi:10.1590/S0036-46652006000400002.
- 9.Ling J, Pan H, Gao Q, Xiong L, Zhou Y, Zhang D, et al. Aerobactin synthesis genes iucA and iucC contribute to the pathogenicity of avian pathogenic Escherichia coli O2 strain E058. *Plos One* 2013; 8:57794. doi:10.1371/journal.pone.0057794.
- 10.Pourzare M, Derakhshan S, Roshani D. Distribution of uropathogenic virulence genes in E. Coli isolated from children with urinary tract infection in Sanandaj Iran. *Arch Pediatr Infect Dis* 2017; 5:41995. doi:10.5812/pedinfect.41995
- 11.Tsen H, Lin C, Chi W. Development and use of 16S rRNA gene targeted PCR primers for the identification of Escherichia coli cells in water. *J Appl Microbiol* 1998; 85:554-60.
- 12.Palka M, Cleven BE, Eichinger L, Kronke M, Krut O. Large scale multiplex PCR improves pathogen detection by DNA microarrays. *BMC Microbiol* 2009; 9:1. doi:10.1186/1471-2180-9-1.
- 13.Janben T, Schwarz C, Preikschat P, Voss M, Philipp HC, Wieler LH. Virulence associated genes in avian pathogenic E. coli isolated from internal organs of poultry having died from colibacillosis. *Int J Med Microbiol* 2001; 291:371-8. doi:10.1078/1438-4221-00143.
- 14.Mahmoudi H, Hossainpour H, Moradi M, Alikhani MY. Distribution of genes encoding iron uptake systems among the E. coli isolates from foodstuffs compared to E. coli isolated from clinical specimens. *Infect Disord Drug Targets* 2019; 18:18. doi:10.2174/1871526519666190119112542 .
- 15.Ling J, Pan H, Gao Q, Xiong L, Zhou Y, Zhang D, et al. Aerobactin synthesis genes iucA and iucC contribute to the pathogenicity of avian pathogenic E. coli O2 strain E058. *Plos One* 2013; 8:57794. doi:10.1371/journal.pone.0057794.
- 16.Yazdani A, Peighambari SM, Bidoki SK, Hosseini H. [Phenotypic and genotypic detection of aerobactin system among Escherichia coli isolates from cases of poultry colibacillosis]. *J Vet Lab Res*2013; 5:77-84. (Persian)
- 17.Nikpiran H, Peighambari S, Abdi Khasvan A. Frequency of iucD, tsh, and iss genes among Escherichia coli isolates in broilers infected with colibacillosis. *IJVR* 2019, 14: 106-14. doi:10.22055/IVJ.2017.57760.1771.
- 18.Moon YH, Tanabe T, Funahashi T, Shiuchi Ki, Nakao H, Yamamoto S. Identification and characterization of two contiguous operons required for aerobactin transport and biosynthesis in *Vibrio mimicus*. *J Microbiol Immunol* 2004; 48:389-98. doi:10.1111/j.1348-0421.2004.tb03528.x.

- 19.Zhang H, Rehman MU, Li K, Luo H, Lan Y, Nabi F, et al. Antimicrobial resistance of Escherichia coli isolated from Tibetan piglets suffering from white score diarrhea. Pak Vet J 2017; 37:43-6.
- 20.Heidarisoureshjani E, Heidari M, Doosti A. [Epidemiology of urinary tract infection and antibiotic resistance pattern of *E. coli* in patients referred to Imam Ali hospital in Farokhshahr Chaharmahal va Bakhtiari Iran]. J Shahrekord Uni Med Sci 2013;15. (Persian)
- 21.Rava M. Trend of antibiotic resistance of *E. coli* strains isolated from urinary tract infections in outpatient patients from Zahedan. J Paramed Sci Rehabil 2017; 6:73-8.
doi.10.22038/JPSR.2017.21755.1556.
- 22.Ramazanzadeh R, Moradi G, Zandi S, Mohammadi S, Rouhi S, Pourzare M, et al. [A survey of contamination rate and antibiotic resistant of gram negative bacteria isolated from patients in various wards of Toohid and Besat hospitals of Sanandaj city during 2013-14 years]. Pajouhan Sci J2016; 14:11-9. (Persian)
- 23.Madani SH, Khazaei S, Kanani M, Shahi M. Antibiotic resistance pattern of *E. coli* isolated from urine culture in Imam Reza hospital Kermanshah 2006-8. J Kermanshah Uni Med Sci2008; 3:287-95. (Persian)
- 24.Lorente JG, Placer JS, Salvado MC, Segura CA, Gelabert A. Antibiotic resistance transformation in community acquired urinary infections. Rev Clin Espanol 2005; 205:259-64.
doi.10.1157/13076148 .



Evaluation of the Frequency of the Uropathogenic Escherichia coli Genotypes Resistant to Multidrug using the iucA, iucB, iucC, and iucD Siderophore Genes

Abroshan R¹, Shaheli M^{1*}

(Received: August 4, 2020)

Accepted: February 1, 2021)

Abstract

Introduction: Urinary tract infection is one of the most common bacterial infections in humans, and *Escherichia coli* is one of the most important factors. Therefore, the present study aimed to evaluate the diversity of Uropathogenic *E. coli* genotypes based on iucA, iucB, iucC, and iucD genes.

Materials & Methods: In this study, plates containing a positive culture of urinary tract infection of *E. coli* were collected from four treatment centers in Shiraz, Iran. After determining phenotypic and genotypic identity, 100 isolates of *E. coli* were isolated. The bacterial genome was extracted using a kit. After genetic confirmation of the isolates using 16S rRNA, antibiotic resistance and susceptibility were performed for 10 antibiotics out of 9 classes using the disk diffusion method according to the CLSI standard. Frequency investigation of the virulence factors (iuc gene) was performed

through the PCR molecular method and specific primers.

Findings: The prevalence rates of iucA, iucB, iucC, and iucD genes were estimated at 95%, 60%, 72%, and 92%, respectively. The amount of resistance of 10 antibiotics of azithromycin, ampicillin, cefotaxime, nalidixic acid, tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole, cefepime, aztreonam, gentamicin, and nitrofurantoin were also determined at 95%, 86%, 68%, 66%, 65%, 64%, 51%, 46%, 44%, and 14%. In addition, 98% of the isolates had multidrug resistance.

Discussions & Conclusions: The present study showed that the high prevalence of the iuc gene among *E. coli* strains indicated the importance of this gene in the pathogenesis and genetic diversity of this bacterium.

Keywords: iuc genes, MDR, Uropathogenic *Escherichia coli*, Siderophore

1. Dept of Biology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran

* Corresponding author Email: Shaheli87@yahoo.com