

پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان: مروری بر مداخلات انجام یافته

الله توسلی^۱، مهناز نیلساز^۱، مهنوش رئیسی^۲، سید همام الدین جواد زاده^۲، فرزانه محمدی^۳، ذبیح الله قارلی پور^۴، رضا وفایی^{۵*}، جاسم محمدی^۶

- (۱) گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
- (۲) گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
- (۳) کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
- (۴) گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم
- (۵) مرکز تحقیقات پرتوومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
- (۶) گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تاریخ پذیرش: ۹۲/۴/۵

تاریخ دریافت: ۹۲/۱/۱۷

چکیده

مقدمه: تحقیقات متعددی در زمینه پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان اجرا شده است، هدف از این مطالعه، مروری بر یافته های مطالعات انجام شده در این باره بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه مروری ابتدا در پایگاه های ISI و PubMed مقالاتی که در متن خود دارای کلمات Overweight، Obesity، Prevention، Health Education، Intervention، Programs، Children، Adolescent، Child، بودند، جستجو شد، مطالعاتی که به زبانی غیر از انگلیسی نگاشته شده بودند، نیز حذف شدند. در نهایت، ۲۰ مقاله شرایط مذکور را دارا بودند که مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته های پژوهش: اکثر برنامه ها و مداخلات آموزشی روی رفتارهای فعالیت جسمانی منظم، مصرف میوه و سبزیجات، محدود نمودن تماسای تلویزیون و مصرف نوشیدنی های غیر شیرین تمرکز کرده بودند، آموزش ها بیشتر از طریق پرسنل مدارس و آموزش دهنگان بهداشت انجام گرفته بود، بیشتر مداخلات تأثیر مثبت برنامه ها و آموزش ها را گزارش کرده بودند.

بحث و نتیجه گیری: آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از چاقی در کودکان و نوجوانان تا حد زیادی موفق بوده است و ضرورت انجام مطالعات بیشتر با استفاده از الگوها و نظریه های رفتاری و راهبردهای خلاقانه و جدید برای یادگیری بهتر و ایجاد رفتارهای سالم ضروری به نظرمی رسد.

واژه های کلیدی: آموزش بهداشت، پیشگیری، چاقی، کودکان، نوجوانان

*نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات پرتوومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

Email: vafaeereza@gmail.com

مقدمه

سلامت کمک می کند»،(19)، نقش مهمی در نهادینه کردن رفتارهای پیشگیری کننده از چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان دارد. سال هاست که صاحب نظران حوزه سلامت به طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت برای تغییر و اصلاح رفتارهای غیربهداشتی و یا ترویج رفتارهای نو پرداخته اند و در این میان به پیشگیری از چاقی نیز توجه خاصی شده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان برای انجام رفتارهای پیشگیرانه از چاقی، اثر بخشی آن ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و با دسته بندی و تحلیل آن ها، به نتایج کاربردی برای آموزش این رفتار در کشورمان دست یابیم.

مواد و روش ها

در این مطالعه مژوی ابتدا در پایگاه های ISI و PUBMED مقالاتی که در متن خود دارای یکی از کلمات Health Education، Intervention، Overweight، Obesity، Programs، prevention، Children، Adolescent، به همراه یکی از کلمات Child بودند جستجو شد، که در کل به 200 مقاله دست یافتیم، یافته های بازیافت شده از هر دو بانک مذکور در نهایت با یکدیگر مقایسه و موارد تکراری کنار گذاشته شد. مطالعاتی که به زبانی غیر از انگلیسی نگاشته شده بودند نیز حذف شدند، و سپس با مطالعه دقیق تر آن ها، در نهایت 20 مقاله که امکان استخراج اجزای اصلی یک ارتباط آموزشی از آن ها وجود داشت، برای بررسی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل مقالات نهایی شده که اکثریت آن ها از نوع کارآزمایی بالینی (تصادفی و یا کنترل شده) بودند اجزای اصلی یک ارتباط آموزشی شامل: جمعیت هدف، نوع مداخله، مقایسه و یافته اصلی استخراج شد و سپس به منظور فهم بهتر و آسان تر کردن تحلیل های بعدی، نتایج در جدول مربوطه آورده شد. (جدول شماره 1)

در طول سه دهه گذشته، شیوع چاقی کودکان و نوجوانان در سراسر جهان به سرعت افزایش یافته است،(1-6)، به طوری که چاقی در میان کودکان 11-6 سال از 6/5 درصد به 17 درصد افزایش یافته است،(8،7)، و به گزارش مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها (Centers for Disease Control and Prevention) در میان نوجوانان 12-19 ساله با شدت بیشتری از 5 درصد به 17/6 درصد افزایش پیدا کرده است،(9). چاقی اختلالی است که تمام گروه های سنی، تمام نژادها و طبقات را درگیر کرده است،(10). به طوری که هم اکنون یکی از پنج کودک و نوجوان در Amerika مبتلا به چاقی می باشند و با وجود برنامه ها، درمان ها و تلاش های زیادی که در درمان چاقی تاکنون به کار رفته است، اما هنوز این بیماری جزء یکی از معضلات بهداشتی کشورهای در حال توسعه و پیشرفتی می باشد و روز به روز در حال افزایش است،(8). زندگی ماشینی و دور شدن انسان ها از طبیعت و شرایط زندگی طبیعی، وضعیت تغذیه و سلامت جسم و روان او را دچار تغییرات شگرفی نموده است،(11،12). امروزه بیماری های تمدن از آثار این تغییرات است که مردم کشورهای دنیا با آن ها دست به گریبان هستند،(12). طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) سالانه حداقل 2/8 میلیون نفر در اثر عوارض چاقی و اضافه وزن فوت می کنند،(13). از طرفی چاقی در میان نوجوانان نیز به شدت در حال افزایش است،(14)، که از علل آن می توان به جایگزینی شیوه زندگی غربی، خصوصاً خوردن غذایی حیوانی، شکر، کم کردن فیبر مواد غذایی، به همراه کاهش فعالیت جسمانی، کاهش مصرف میوه و سبزیجات، افزایش فعالیت های نشسته شامل تماشای تلویزیون، بازی های ویدیویی، بازی های کامپیوتری و استفاده بیش از حد از کامپیوتر اشاره نمود،(14-18). آموزش بهداشت به عنوان: «فرآیند آموزشی که با ترکیب کردن دیدگاه های مختلف برای تغییر سبک زندگی تلاش می کند و به افراد، خانواده ها و جوامع در تصمیم گیری برای موضوعات مرتبط با

ردیف	جمعیت هدف	نوع مطالعه	مقایسه	پاچه اصلی
Wilson و همکاران (20)	گروهی از دانش آموzan	کارآزمایی کنترل شده	مقایسه آگاهی و نگرش و میانگین مصرف میوه و سبزیجات گروه آزمون با شادد در زمان های قابل، بالا فاصله بعد از مداخله و یک سال بعد از آن توسط آموزشگران انجام گردید.	میانگین مصرف میوه و سبزیجات به طور مطالعه ای در گروه آزمون، بالا فاصله بعد از مداخله افزایش پاچه ای داشت.
Kipping و همکاران (21)	گروهی از کودکان 9-10 ساله انگلیسی	کارآزمایی تصادفی شده	مقایسه آگاهی و مصرف میوه و سبزیجات و میزان مصرف تقللات در دو گروه آزمون، شاهد ببل و بعد از مداخله توسعه آموزشگران انجام گردید.	طفر مطالعه ای افزایش و میزان مصرف تقللات کاهش یافت.
Wang و همکاران (22)	گروهی از دانش آموzan	کارآزمایی بالینی	مقایسه آگاهی و مصرف میوه و سبزیجات در دو گروه آزمون و شاهد توسعه آموزشگران انجام گردید.	بعد از مداخله افزایش مطالعه ای در مصرف میوه و سبزیجات داشت آماران گروه آزمون که در مواجهه با برنامه های آموزشی بوند، اتفاق اتفاق بود.
Horne و همکاران (23)	گروهی از کودکان 4-11 ساله	کارآزمایی بالینی	مقایسه دو گروه آزمون و شاهد و دریافت مداخله ۱۶ روزه برای گروه آزمون (خشق فیلم هایی در مورد تغذیه همراهان و افراد معروف و دانش باداش های کوچک به آنان به خاطر مصرف میوه و سبزیجات، میوه و سبزی برای مدارس تهیه می شد و در اختصار دانش آموزان قرار داده می شد و خانواده های نیز در این امر مشارکت داده شدند پیگیری ۱۲ ماهه انجام گردید.	مصرف میوه و سبزی در گروه آزمون نسبت به مطالعه افزایش مطالعه داشت، علی پیگیری های ۱۲ ماهه مشخص گردید که والدین در مدارس گروه آزمون برای کودکان خود در سبد غذایی شان میوه و سبزیجات قرار می داشتند.
Beets و همکاران (24)	افراد ۱۸ سال و پاسن تراز	متاتالیز	تاثیر برآنها های بعد از زمان مدرسه روی فعالیت جسمانی و تابض اندام	فعالیت جسمانی افراد شرکت کننده بعد از مداخله به طور مطالعه ای افزایش داشت.
Foster و همکاران (25)	گروهی از دانش آموzan	کارآزمایی مبتنی بر مدرسه	مقایسه میزان فعالیت های نشسته، نازکی از این، BMI، مصرف میوه و سبزیجات، میزان چربی و کالری در دو گروه در زمان مطالعه و ۲ سال بعد از آن توسعه آموزشگران انجام گردید.	نتایج کاهش ۵۰ درصدی اضافه و نهادن را در گروه آزمون نشان داد.
Aزادی و همکاران (26)	گروهی از دانش آموzan نوجوان	نیمه تحریبی	مقایسه آگاهی و رفتارهای بشیگری کننده از چاقی در دو زمان قبل و بکاهه بعد از مداخله با استفاده از آموزش های جداینه (۴) ماهه برای اولیاء مدرسه، والدین دانش آموزان و تغییرات محیط مدرسه به اضافه اندازه گیری شاخص توده بدنی در دو گروه توسعه آموزشگران بود.	بعد از مداخلات تفاوتی در شاخص توده بدنی دو گروه مشاهده شد، تفاوت میانگین آگاهی و مصرف لیپیات، تقللات شور، توشیدنی های شیرین و غذاهای آماده و انجام ورزش های شدید و بت زمان تماشای تلویزیون در زمان قبل و بعد از مداخله گروه آزمون مطالعه داشت.
Amaro و همکاران (27)	گروهی از نوجوانان 11-14 ساله	کارآزمایی بالینی	در گروه آزمون طی ۲۴ هفته، یک جلسه در هفته برگزار گردید، در زمینه آگاهی تغذیه ای، غذاهای مصرفی، فعالیت جسمانی، به اضافه اندازه گیری شاخص های تن سنجی.	دانش آموزان در گروه آزمون مطالعه ای افزایش مطالعه داشتند.
سلیمان اخباری و همکاران (28)	گروهی از دانش آموzan چهارم و پنجم دبستانی	مداخله ای	مقایسه آگاهی و نگرش دو گروه در زمان مطالعه و یک ماه پس از آن با استفاده از روشن آموزشی چربه و بخت گروهی با گمک آموزشگران.	مداخلات سبب افزایش مطالعه ای افزایش مطالعه داشتند.
Moore L, Tapper K (29)	گروهی از دانش آموzan نوجوان انگلیسی	کارآزمایی بالینی	به مدت پیکال برای گروه آزمون مطالعات به صورت برپایی فروشگاه های فروخته شد، دانش آموزان در گروه آزمون مصرف میوه جات را میوه با هدف افزایش مصرف میوه انجام گرفت.	جنود 70000 بیوه به داشت دانش آموزان در مدارس گروه آزمون شرکت کنند و شرکت به عنوان یک منعنه و غذای سیک در مدرسه گزارش کردند.
Sروستانی و همکاران (30)	گروهی از دختران نوجوان چاق	نشیه تحریبی	آموزش حل مساله، آموزش مدیریت استرس (بوجا)، آموزش رفتارهای غذایی و فعالیت فیزیکی متابس و آموزش به والدین قبل، بعد و دو ماه پس از مداخله توسعه افراد آموزش دهد انجام گردید.	رفتارهای غذایی گروه آزمون بیهوبد یافته بود و از لحاظ آماری مطالعه ای بود، دو گروه از نظر احساسات، حرکات خارجی و محدودیت در غذا خود را با یکدیگر تفاوت داشتند.
James و همکاران (31)	گروهی از دانش آموzan	کارآزمایی بالینی	تاثیر برآنها های آموزشی مبتنی بر شویق دانش آموزان به صورت توشیدنی های بدن قدر، افزایش مصرف میوه و آب توسعه آموزشگران انجام گردید.	تفاوت مطالعه ای در رفتارهای دانش آموزان بعد از مطالعه ایجاد گردید.
Kain و همکاران (32)	گروهی از کودکان	کارآزمایی بالینی	آموزش هایی به مدت 8 هفته در خصوص رژیم غذایی شویق برای انتخاب غذاهای سالم و انجام فعالیت جسمانی و دیدار با والدین با گمک آموزشگران برگزار گردید.	مطالعات حاکی از بیهوعد رفتارهای موردنظر در گروه مطالعه بود.
McMurray و همکاران (33)	گروهی از کودکان	کارآزمایی بالینی	مداخله به سه صورت: ورزش به تهیابی، آموزش به تهیابی و ترکیب آموزش و ورزش در دو گروه توسعه آموزشگران انجام گرفت.	نتایج نشان دهنده اثربخشی بیشتر آموزش و ورزش با هم بود.
Muller و همکاران (34)	گروهی از کودکان 5-7 ساله	کارآزمایی بالینی	گرفتگیری مطالعات مدرسه مخصوصاً هدف آموزش تغذیه و ارتقا سلامت برای همه کودکان، والدین و معلمان آثار در ۳ گروه مطالعه با استفاده از مربیان و آموزشگران انجام شد.	مطالعات و تابع آن، حاکی از اثربخش بود.
Epstein و همکاران (35)	گروهی از نوجوانان 10 ساله آمریکایی	تجربی	مقایسه میزان فعالیت های نشسته و فعالیت جسمانی دو گروه طی ۲ سال توسعه آموزشگران	دانش آموزان شرکت کننده در برنامه های مدرسه به پیشگیری از اتفاقی با بروزی قدر و وزن، رژیم غذایی، فعالیت های نشسته و میزان فعالیت جسمانی در دو گروه توسعه آموزشگران انجام گردید.
Veugelers و Fitzgerald (36)	گروهی از دانش آموzan	مقایسه چند مرحله ای	تاثیر برآنها های مدرسه به پیشگیری از اتفاقی با بروزی قدر و وزن، رژیم غذایی، فعالیت های نشسته و میزان فعالیت جسمانی در دو گروه توسعه آموزشگران انجام گردید.	دانش آموزان شرکت کننده در برنامه های مدرسه به تهیابی و گروه کنترل، مطالعه توسعه کارکنان پرسنل مدارس اجراء شد.
Haerens و همکاران (37)	گروهی از نوجوانان	کارآزمایی بالینی	مقایسه انجام فعالیت جسمانی متواسط و شدید با استفاده از: مطالعه با حمایت والدین، مطالعه به تهیابی و گروه کنترل. مطالعه توسعه کارکنان پرسنل مدارس اجراء شد.	مطالعات با حمایت والدین منجر به افزایش سطح فعالیت جسمانی مرتبط با مدرسه گردید، در حالی که سطح فعالیت جسمانی در گروه کنترل کاهش یافت.
Gortmaker و همکاران (38)	گروهی از نوجوانان آمریکایی	تجربی	مقایسه رفتارهای تماشای تلویزیون، مصرف چربی، مصرف میوه و سبزیجات و فعالیت جسمانی در ۱۷ ماه توسعه محیطیان	کاهش مدت زمان تماشای تلویزیون، کاهش مصرف چربی، افزایش مصرف میوه و سبزیجات و افزایش فعالیت جسمانی در گروه آزمون.
Ruyter و همکاران (39)	کارآزمایی بالینی	کارآزمایی بالینی	مطالعه به مدت ۱۸ ماه بود، شرکت کنندگان توشیدنی های شیرین و پیشگیری از مفارق میعنی در هر روز استفاده از کنندگان توشیدنی های توسعه آموزشگران بنابراین توزیع می شد (توشیدنی های به تعداد ۸ عدد برای هر فحنه آن ها توزیع می شد و معلمان و مسوؤلان مدارس مطمئن شدند که داشت آغازنها از این استفاده کنند).	کاهش مطالعه ای در مصرف توشیدنی های شیرین و پیشگیری از چاقی در دانش آموزان گروه آزمون ایجاد شد.

بحث و نتیجه گیری

جمع بندی و تحلیل مقالات مورد بررسی نشان از ضرورت توجه به پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در کودکان دارد. برنامه ریزی دقیق برای گسترش رفتارهای پیشگیری کننده از چاقی و ایجاد استقبال از آن در گروه های در معرض خطر اهمیت دارد. تعداد بسیار مقالاتی که به بررسی نقش مداخلات آموزشی برای ایجاد این رفتار در کودکان و نوجوانان می پردازد، مؤید این نکته است. آموزش این رفتارها در حوزه های آگاهی (شامل انتقال اطلاعات مربوط به چاقی، عوامل خطر آن و...)، نگرشی (شامل اصلاح اعتقادات و باورهای کودکان و نوجوانان و خانواده و اطرافیان آنان در زمینه چاقی) و رفتاری (شامل مهارت، استفاده از میوه و سبزیجات به میزان کافی، محدود نمودن زمان تماشای تلویزیون و بازی های رایانه ای و ویدیویی، افزایش فعالیت جسمانی و محدود نمودن مصرف نوشیدنی های شیرین و...) نقش اساسی در پیشگیری از چاقی خواهد داشت. در تمام مقالات بررسی شده حداقل به یکی از حیطه های فوق پرداخته شده است و تأثیر برنامه آموزشی بر آن نشان داده شده است. با توجه به این که عوامل پیچیده بسیار زیادی مرتبط با چاقی کودکان و نوجوانان هستند، بنابراین به منظور شناسایی و هدف قرار دادن بسیاری از رفتارهای حیاتی مرتبط با چاقی، مداخلات ارتقاء دهنده سلامت نیاز است، کمیته کارشناسان انجمن پزشکی آمریکا (The American Medical Association's expert committee to advise on childhood obesity) به منظور پیشگیری، ارزیابی و درمان چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان نموده است، بدین منظور 4 رفتار کلیدی در سبک زندگی افراد را که برای پیشگیری از چاقی و اضافه وزن حیاتی هستند مشخص نموده است که شامل: عدم مصرف نوشیدنی های شیرین یا حداکثر مصرف آن ها یک بار در روز، مصرف روزانه 5 واحد میوه جات و سبزیجات، انجام حداقل 60 دقیقه فعالیت جسمانی در هر روز، و کم نمودن فعالیت های نشسته (جدول شماره 1 حاوی اطلاعات در روز است). آموزش توسط آموزشگران و افراد

یافته های پژوهش

آنچه در برنامه های آموزشی با هدف افزایش رفتارهای پیشگیری کننده از چاقی در مقالات منتخب مشاهده می شود در قالب چند محور قابل بررسی می باشد:

1- محتوای آموزش ها: نتایج نشان می دهد که در اکثر موارد برنامه های آموزشی طراحی شده روی موارد مهمی مانند عدم مصرف نوشیدنی های شیرین، مصرف روزانه میوه جات و سبزیجات، انجام حداقل 60 دقیقه فعالیت جسمانی در هر روز، و کم نمودن فعالیت های نشسته تأکید شده است تا فرآگیران را برای انجام منظم، زیاد و ماهرانه این رفتارها آموزش دهند.

2- نوع مداخلات: برای اثبات اثربخشی مداخلات آموزشی، در بیشتر مقالات از مطالعات نیمه تجربی به صورت قبل و بعدی استفاده شده است و در مواردی نیز با انتخاب گروه شاهد مناسب، کارآزمایی بالینی تصادفی شده مورد توجه قرار گرفته است تا امکان توجیه درست پیامدها وجود داشته باشد.

3- آموزش دهندها: در اکثر موارد، آموزش دهندها را کارکنان و پرسنل مدارس و آموزش دهندها تشکیل می دادند، ولی در چند مورد آموزش توسط ارائه فیلم ها و... مورد تأکید قرار گرفته بود.

4- فرآگیران: در تمام مطالعات انجام شده و مورد بحث در این بررسی، فرآگیران را کودکان و نوجوانان تشکیل می دادند، که با نظر به اهمیت آموزش پذیری این گروه سنی و کسب رفتارهای سالم در این سن قابل توجیه است.

5- پیامدهای مداخله های آموزشی: تنوع در پیامدهای مورد انتظار در مداخلات انجام شده شامل ارتقای سطح دانش فرآگیران (در زمینه چاقی، عوامل خطر چاقی و...) نگرش، آن ها و انجام رفتارهای پیشگیری کننده از چاقی و اضافه وزن (عدم مصرف نوشیدنی های شیرین، مصرف روزانه میوه جات و سبزیجات، انجام حداقل 60 دقیقه فعالیت جسمانی در هر روز، و کم نمودن فعالیت های نشسته) می باشد. (جدول شماره 1 حاوی اطلاعات دسته بندی شده مربوط به این بررسی است)

نیز استفاده از رایانه در بسیاری از جوامع تأثیرات خوبی داشته است. با توجه به اهمیت توجه به برنامه های پیشگیرانه استفاده از تجارت پژوهش های انجام شده برای ترویج این رفتار در میان کودکان و نوجوانان در ضرورتی غیرقابل انکار است و استفاده از این نوع مداخلات که با توجه به هزینه های صرف شده در مقایسه با منافع حاصل از آن، مقرر و بیزه قرار گیرد. با این وجود، با توجه به ضرورت استفاده از نظریه ها و الگوها در مداخلات آموزشی مدرن و اثربخشی بالای این نوع مداخلات در مقایسه با مداخلات آموزشی سنتی تر، بررسی کارایی و اثربخشی استفاده از الگوها و نظریه های رفتاری می تواند در پژوهش های دیگر بررسی گردد.

ماهر در برقراری ارتباط با دانش آموزان و ایجاد اعتماد در آنان، استفاده از مریبان و معلمان خود آن ها و هم چنین حضور مؤثر والدین و تشویق آنان بر این امر بسیار مؤثر بوده و اهمیت دارد.

توجه به محل های مناسب برای آموزش به کودکان و نوجوانان و کلاس های برگزاری نیز بسیار مهم است، آموزش در موقعیت های رسمی مانند مدارس به همراه حضور والدین و معلمان مورد توجه این مقالات قرار گرفته است. استفاده از مداخله های ترکیبی شامل مواد آموزشی چند رسانه ای و چاپی همراه با کلاس های آموزشی و استفاده از عوامل یاد آورنده و تقویت کننده در مقایسه با مداخله های یک بعدی، تأثیرات بیشتری داشته است، توجه به طراحی و اجرای برنامه های خودآموز شامل نوارهای ویدئویی و

References

- 1-Josephine Y, Chau HP, Dafna M, Tien C, Adrian E. Cross-sectional associations between occupational and leisure-time sitting, physical activity and obesity in working adults. *Prevent Med* 2012;8:1-6.
- 2-Flo H, Andrew PJ. A framework for understanding school based physical environmental influences on childhood obesity. *Health Place* 2012;71:2-10.
- 3-Wayne C. Miller, Michelle H, Carrie C, Kim C, Rebecca D. After-school physical activity and eating behaviors of middle school students in relation to adult supervision. *J Nutr Educ Behav* 2012;21:1-9.
- 4-Mary G, Roseman MC, Riddell JN. A content analysis of kindergarten-12th grade school-based nutrition interventions: taking advantage of past learning. *J Nutr Educ Behav* 2011;43:2-18.
- 5-Margaret Q. Introduction of active video gaming into the middle school curriculum as a school-based childhood obesity intervention. *J Pediatr Health Care* 2011;61:1-10.
- 6-Ogden CL, Carroll MD, Curtin LR, Lamb MM, Flegal KM. Prevalence of high body mass index in US children and adolescents, 2007-2008. *JAMA* 2010;303:242-9.
- 7-Li YW, Maxine D, Sarah L, Deborah G, Richard L. Long-term health and economic impact of preventing and reducing overweight and obesity in adolescence. *J Adolesc Health* 2010;46:467-73.
- 8-Ogden CL, Carroll MD, Flegal KM. High body mass index for age among US children and adolescents, 2003–2006. *JAMA* 2008;299:2401-5.
- 9-Jamil HJ, Kariaparambil Rajan A, Grzybowski M, Fakhouri M, Arnetz B. Obesity and overweight in ethnic minorities of the Detroit metropolitan area of Michigan. *Acta Orthop* 2013;84:392-7.
- 10-Danielle H, Sarah EM, Gabriela L, Lucas H, Marie A, Arthur S. Healthier options for public schoolchildren program improves weight and blood pressure in 6- to 13-year-olds. *J Am Diet Assoc* 2010;110:261-7.
- 11-Jackson D, Mannix J, Faga P. Overweight and obese children: mother's strategies. *J Adv Nurs* 2004;52:6-13.
- 12-Pishdad GR. Overweight and obesity in adult aged 20-47 in southern Iran. *Int J Obese Relate Metab Disord* 2007;20:963-5.
- 13-Haysom L, Indig D, Moore E, Hardy LL, van den Dolder PA. Prevalence and perceptions of overweight and obesity in Aboriginal and non-Aboriginal young people in custody. *Med J Aust* 2013;199:266-70.

- 14-Rezaeipour A, Youssefi F, Mahmoudi M, Shakeri M. Relationship between Adolescents' nutritional and physical activity behaviors with their perceptions about parents' lifestyle behaviors. *J Faculty Nurs Midwifery* 2007;13:17-25.
- 15-Danielle H, Sarah E, Gabriela LM, Lucas H, Marie A, Arthur S. Healthier options for public schoolchildren program improves weight and blood pressure in 6- to 13-year-olds. *J Am Diet Assoc* 2010;110:261-7.
- 16-Gordon-Larsen P. Obesity-related knowledge, attitudes, and behaviors in obese and nonobese urban Philadelphia female adolescents. *Obes Res* 2001;9:112-9.
- 17-Meizi H, Leonard P, Charlene B, Stewart H. Screen-related sedentary behaviors: children's and parents' attitudes, motivations, and practices. *J Nutr Educ Behav* 2010;42:17-25.
- 18-Ludwig DS, Gortmaker S. Programming obesity. *Lancet* 2004;364:226-7.
- 19-Modeste NN, Tamayose ST. Dictionary of public health promotion and education. 2nd ed. Jossey-Bass:A Wiley Imprint; 2004.P.58.
- 20-Diane BW, Resa MJ, Donna M, Alice LW, Steven D. Fruit and vegetable intake among rural youth following a school-based randomized controlled trial. *Prev Med* 2012;54:150-6.
- 21-Kipping RR, Russell Jb, Debbie A. Diet outcomes of a pilot school-based randomised controlled obesity prevention study with 9-10 year olds in England. *Prev Med* 2010;51:56-62.
- 22-May CW, Suzanne R, Natalie S, Anna CM, Launa C, Caitlin M and et al. Exposure to a comprehensive school intervention increases vegetable consumption. *J Adoles Health* 2010;47:74-82.
- 23-Horne PJ, Hardman CA, Lowe CF. Increasing parental provision and children's consumption of lunchbox fruit and vegetables in Ireland: the Food Dudes intervention. *Eur J Clin Nutr* 2009;63:613-8.
- 24-Michael WB, Aaron B, Heather EE, Jennifer LH. After-school program impact on physical activity and fitness a meta-analysis. *Am J Prev Med* 2009;36:527-37.
- 25-Foster GD, Sherman S, Borradale KE, Grundy KM, Stephanie S, Veer V, et al. A policy-based school intervention to prevent overweight and obesity. *Pediatrics* 2008;121:e794 -e802.
- 26-Azadi A, Anoosheh M, Alhani F, Hajizadeh E. The effect of implementation of health promotion program in school to control risk factors for obesity in adolescents. *Iran South Med J* 2007;11:153-62.
- 27-Amaro S, Viggiano A, Di-Costanzo A, Madeo I, Viggiano A, Baccari ME. Kalèdo, a new educational board-game, gives nutritional rudiments and encourages healthy eating in children: a pilot cluster randomized trial. *Eur J Pediatr* 2006;165:630-5.
- 28-Soleiman EY, Shojaeezadeh D, Zeraati H. [A comparison of the effectiveness of two educational methods on the nutritional knowledge and attitude about prevention of obesity in primary school fourth-and fifth-grade students in Tehran school region1].*Toloo Behdasht* 2006;6:1-11.(Persian)
- 29-Moore L, Tapper K. The impact of school fruit tuck shops and school food policies on children's fruit consumption: a cluster randomized trial of schools in deprived areas. *J Epidemiol Commun Health* 2008;62:926-31.
- 30-Sabet-Sarvestani R, Kargar M, Kave MH, Tabatabaei H. The effect of dietary behavior modification on anthropometric indices in obese adolescent female students. *Iran J Nurs Res* 2006;2:13-8.
- 31-James J, Thomas P, Cavan D, Kerr D. Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: cluster randomised controlled trial. *BMJ* 2004;328:12-7.
- 32-Kain J, Uauy R, Albala Vio F, Cerda R, Leyton B. School-based obesity prevention in Chilean primary school children: methodology and evaluation of a controlled study. *Int J Obes Relat Metab Disord* 2004;28:483-93.
- 33-McMurray RG, Harrell JS, Bangdiwala SI, Bradley CB, Deng S, Levine A. A school-based intervention can reduce body fat and blood pressure in young adolescents. *J Adolesc Health* 2002;31:125-32.

- 34-Muller MJ, Asbeck I, Mast M, Langnase K, Grund A. Prevention of obesity- more than an intention. Concept and first results of the Kiel obesity prevention study (KOPS). *Int J Obes Relat Metab Disord* 2001;25:S66-S74.
- 35-Epstein LH, Gordy CC, Raynor HA, Beddome M, Kilanowski CK, Paluch R. Increasing fruit and vegetable intake and decreasing fat and sugar intake in families at risk for childhood obesity. *Obes Res* 2001;9:171-8.
- 36-Veugelers PJ, Fitzgerald AL. Effectiveness of school programs in preventing childhood obesity: a multilevel comparison. *Am J Pub Health* 2005;95:432-43.
- 37-Lea M, Greet C, Benedicte D. School-based randomized controlled trial of a physical activity intervention among adolescents. *J Adolesc Health* 2006;40:258-65.
- 38-Gortmaker SL, Must A, Sobol AM, Peterson K, Colditz GA, Dietz WH. Television viewing as a cause of increasing obesity among children in the United States, 1986–1990. *Arch Pediatr Adolesc Med* 1996;150:356-62.
- 39-de Ruyter JC, Olthof MR, Seidell JC, Katan MB. A trial of sugar-free or sugar-sweetened beverages and body weight in children. *N Engl J Med* 2012;367:1397-406.
- 40-American academy of pediatrics. Prevention of pediatric overweight and obesity: policy statement. *Pediatrics* 2003;112:424-30.
- .

Prevention of Overweight and Obesity In Children and Adolescents: A Review on The Accomplished Interventional Studies

Tavassoli E¹, Nilsaz M¹, Reisi M², Javadzade H², Mazaheri M¹, Mohammadi F³, Gharli pour Z⁴, Vafeae R^{*5}, Mohammadi J⁶

(Received: 6 Apr. 2013)

Accepted: 26 Jun. 2013)

Abstract

Introduction: Many studies have been conducted to evaluate the prevention of overweight and obesity in children and adolescents. The aim of this study was to review these studies.

Materials & Methods: At first, we searched the ISI and Pub Med databases for studies containing the key words "Health Education", "Intervention", "prevention", "Programs", "Obesity" and "Overweight" plus the key words "Adolescent", "Children" and "Child". Only, those papers in English language were selected. Finally, 20 appropriate papers were evaluated.

Findings: Most of the programs and educational interventions had focused on the behaviors such as daily regular physical activity, consumption of fruits and

vegetables, consumption of sugar-free drinks and limiting television watching. Educations were conducted by school staff and health educators and most of the interventions reported a positive impact of the programs and trainings.

Discussuin & Conclusion: Educating the obesity preventive behaviors in children and adolescents have been largely successful. According to the studies, it seems that there is an urgent need to pay more attention to the using of models and theories and innovative strategies for better learning and creating healthy behaviors.

Keywords: health education, prevention, obesity, children, adolescents

1. Dept of Public Health, Faculty of Health, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Dept of Public Health, Faculty of Health, Bushehr University of Medical Sciences, Iran
3. The Student Research Committee, Faculty of Medicine, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. Dept of Public Health, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
5. Proteomics Research Center, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6. Dept of Pediatrics, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

**(corresponding author)*

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

