

ارزیابی مدل های پارامتری در بررسی بقای ۵ ساله بیماران سرطان روده بزرگ شهر تهران

علی رضا ابدی^۱، فرزانه احمدی^{۲*}، حمید علوی مجد^۳، محمد اسماعیل اکبری^۴، عصمت داودی منفرد^۱، مجید رضایی طاویرانی^۵

- (۱) گروه پژوهشی اجتماعی، دانشکده پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
- (۲) گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
- (۳) مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
- (۴) گروه برایی عمومی، دانشکده پژوهشی، دانشگاه ایلام

تاریخ پذیرش: ۹۲/۵/۲۸

تاریخ دریافت: ۹۲/۲/۱۶

چکیده

مقدمه: سرطان دومین علت مرگ در جهان است و سرطان روده بزرگ در بین سرطان‌ها سومین آمار مرگ را دارد. بررسی عوامل موثر بر این سرطان در افزایش مدت بقای بیماران موثر است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه مدل‌های پارامتری و کاکس و شناسایی عوامل دموگرافیک و اقتصادی-اجتماعی موثر بر بقای ۵ ساله بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، جامعه مورد بررسی ۵۸۰ بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ هستند که از اول فروردین ۱۳۸۴ تا آخر آبان ۱۳۸۵ در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ثبت و به مدت ۵ سال پیگیری شده‌اند. مدل‌های پارامتری نمایی، وایل، لگ-نرمال، لگ-لجستیک و گامایی تعمیم یافته و کاکس طبقه‌بندی شده برآورده شده. معیار اطلاع آکائیک و نمودار باقی‌مانده کاکس استنل برای مقایسه مدل‌ها استفاده شد.

یافته‌های پژوهش: از ۵۸۰ بیمار، ۳۴ درصد فوت کردند. $53/9$ درصد مذکور و میانگین سن بیماران هنگام تشخیص $63\pm11/8$ بود. زمان بقای بیماران با عوامل سن هنگام تشخیص سرطان، جنسیت، سرپرست دوران کودکی، شهرداری محل سکونت و محل سرطان ارتباط داشت. نسبت خطر محاسبه شده با مدل‌های مختلف تقریباً مشابه بود. بر اساس معیار اطلاع آکائیک، مدل‌های لگ-لجستیک و گامایی تعمیم یافته و بر اساس نمودار باقی‌مانده کاکس استنل، لگ-لجستیک مدل‌های بهتری بودند.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مدل لگ-لجستیک بهترین برآورش را داشت. با توجه به ارتباط عامل اجتماعی-اقتصادی شهرداری محل سکونت با زمان بقا، بهتر است در برنامه ریزی‌های سلامت، بهبود تعیین کننده‌های وضعیت اجتماعی-اقتصادی سلامت مدنظر قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: مدل‌های پارامتری، عوامل اقتصادی-اجتماعی، سرطان روده بزرگ

*نویسنده مسئول: گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

Email: Ahmadi.farzan@gmail.com

مقدمه

تمرکز بر روی علل حاد ایجاد کننده بیماری، به عوامل کلیدی در ایجاد بیماری توجه بیشتری شود. هدف این مطالعه استفاده از مدل های پارامتری و مدل کاکس برای تعیین عوامل دموگرافیک و اقتصادی-اجتماعی موثر بر بقای ۵ ساله بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ مرکز تحقیقات ثبت سرطان شهدای تجریش و انتخاب مدل بهتر برای این داده ها است.

مواد و روش ها

نمونه مورد پژوهش در این مطالعه بقا، تعدادی از بیماران با تشخیص سرطان روده بزرگ هستند که از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ تا آخر آبان ۱۳۸۵ در آمار مرکز تحقیقات سرطان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ثبت و به مدت ۵ سال پیگیری شده اند. معیار ورود به مطالعه، تشخیص بیماری سرطان روده بزرگ در زمان ذکر شده و سکونت در شهر تهران بود. حجم نمونه برابر با ۳۸۰ بیمار با بقای ۵ ساله محاسبه شد. روش جمع آوری اطلاعات به این ترتیب بود که بعد از استخراج آمار و اطلاعات اولیه بیماران از مرکز ثبت سرطان شهدای تجریش، با بیماران تماس تلفنی برقرار شد. تعداد ۱۶۵۵ تماس تلفنی با تلفن های موجود در پرونده بیماران، تعداد ۵۸۰ تماس موفق و به مصاحبه با بیماران (در صورت فوت بیمار با نزدیکان) منجر شد. از ۵۸۰ تماس موفق، ۳۸۹ بیمار زنده بودند و ۱۹۱ بیمار در طی این پنج سال فوت شده بودند. اطلاعات مربوط به متغیرهای سن هنگام تشخیص بیماری، جنسیت، وضعیت تا هل، سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان روده بزرگ، محل سرطان روده بزرگ (کولون-رکتوم)، مصرف دخانیات، محل زندگی دوران کودکی (شهر-روستایی)، سرپرست دوران کودکی (پدر و مادر-سایر)، متوسط مترآژ سطح سرانه (کمتر از ۳۰، ۳۰-۶۰ و بیشتر از ۶۰ نفر بر متر مربع)، درآمد (کمتر از ۵۰۰/۰۰۰ و بیشتر از ۱/۰۰۰/۰۰۰)، شغل (دستی-سایر)، منطقه شهرداری محل زندگی (شمال-سایر) و سطح تحصیلات (کمتر از ۸ سال، ۸-۱۲ سال و بیشتر از ۱۲ سال) جمع آوری شد. تحلیل چندمتغیره با استفاده از مدل کاکس طبقه بندي

در اغلب تحقیقات پژوهشی مدل نیمه پارامتری کاکس متداول ترین مدل رگرسیونی استفاده شده در تحلیل داده های بقاست،^(۱) با این وجود ممکن است مدل های پارامتری به مدل کاکس برتری داشته باشند،^(۲،۳) و تحت شرایط خاصی برآوردهای کاراتری نسبت به مدل کاکس ارائه دهند.^(۴،۵) مدل های پارامتری در مقایسه با مدل های نیمه پارامتری دارای فرضیه های قوی تری هستند و نیاز به بررسی مناسب بودن توزیع احتمال انتخاب شده برای زمان بقا دارند. از این رو اغلب به منظور اجتناب از بررسی مدل و احتمال انتخاب مدل نامناسب استفاده از مدل های نیمه پارامتری کاکس ترجیح داده می شود.^(۶) برای استفاده از مدل کاکس باید فرضیه مناسب بودن خطرها (PH) برای تمامی متغیرهای مستقل موجود در مدل نهایی برقرار باشد، یعنی نسبت خطرها در طول زمان ثابت باشد. در صورت برقراری این فرض، تفسیر مدل به دست آمده ساده تر از مدل های پارامتری است. در صورتی که فرضیه برقرار نباشد از مدل کاکس طبقه بندي استفاده می شود که برای متغیرهایی که این فرضیه برقرار نیست نسبت خطر محاسبه نمی شود. از طرفی در نظر گرفتن مفروضات و انتخاب توزیع احتمال برای زمان بقا، استنباط آماری را دقیق تر نموده و انحراف معیار برآوردها را نسبت به زمانی که چنین مفروضاتی وجود نداشته باشند کوچک تر برآورد خواهد کرد.^(۷)

در بین سرطان ها، سرطان روده بزرگ سومین آمار مرگ را پس از ریه و معده در سطح جهان داراست و تنها سرطان شایعی است که با تشخیص و درمان به موقع و مراقبت کافی پس از درمان بهبود می یابد،^(۸) و در ایران سومین سرطان کشنده در مردان و چهارمین در زنان است.^(۹) مطالعات نشان داده اند علاوه بر عوامل ژنتیکی و محیطی، عوامل دیگری مانند عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت و وضعیت اقتصادی-اجتماعی در میزان شیوع، ابتلاء، مرگ و میر و بقا سرطان موثر هستند.^(۱۰-۱۲) با توجه به افزایش شیوع سرطان ها در گذر زمان، لازم است که علاوه بر گسترش روش های تشخیصی و درمانی سرطان و

بزرگ، سرپرست دوران کودکی و منطقه شهرداری محل سکونت موثر می باشند ولی در مدل های گامایی تعیین یافته و لگ نرمال متغیر سرپرست دوران کودکی معنی دار نبود. در همه مدل ها متغیرها دارای نسبت خطرهای تقریباً مشابهی بودند. با توجه به مقادیر به دست آمده برای AIC، مدل های گامایی تعیین یافته و لگ-لجستیک به ترتیب با مقادیر ۹۹۰/۴۳ و ۹۹۰/۹۴ مناسب هستند.

به منظور برآش مدل کاکس با استفاده از باقی مانده اسکنفیلد شرط PH بررسی شد و مشاهده شد که در برآش مدل نهایی کاکس، فرضیه PH برای متغیر سرپرست دوران کودکی برقرار نبود. ($P=0.025$) از این رو مدل کاکس طبقه بندي شده برآش داده شد که برآوردها در این مدل با طبقه بندي بر روی متغیر سرپرست دوران کودکی به دست آمدند. نسبت خطر و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی آن برای متغیر سن(۱۰/۶) و شهرباری محل سکونت(۲/۳۴) و ۱/۷۰(۱/۲۴)، منطقه شهرداری محل سکونت(۰/۸۴) و ۰/۶۰(۰/۴۳) و محل سلطان روده بزرگ(۰/۰۷۱) و ۰/۲۷(۰/۴۳) بود. به علت عدم برقراری فرضیه برای متغیر سرپرست دوران کودکی برآورده از نسبت خطر برای این متغیر محاسبه نمی شود.

هم چنین برای این متغیرها علاوه بر بررسی فرضیه PH، برقراری فرض شتاب دار زمان شکست(AFT) نیز بررسی شد که این فرضیه برقرار بود که در این حالت انتظار می رود مدل لگ-لجستیک برآش بهتری به داده ها باشد.

به منظور بررسی مناسب بودن و مقایسه مدل های برآش شده، نمودار باقی مانده کاکس-اسنل برای مدل های پارامتری و کاکس طبقه بندي شده رسم شد. (نمودار شماره ۱) مناسب ترین مدل می تواند مدلی باشد که نمودار باقی مانده به خط نیمساز تزدیک تر باشد. همان طور که این نمودار نشان می دهد مدل های نمایی، وایبل، لگ-لجستیک و کاکس تعیین یافته AIC به طور مناسبی به داده ها برآش شده اند. مقدار AIC در مدل لگ-لجستیک نسبت به مدل های نمایی و وایبل کوچک تر است و از طرفی چون در مدل کاکس طبقه بندي شده برآورده برای متغیر سرپرست دوران

شده و مدل های پارامتری نمایی، وایبل، لگ نرمال، لگ-لجستیک و گامایی تعیین یافته انجام شد.

برای مقایسه کارایی مدل های پارامتری از معیار اطلاع آکائیک(AIC) استفاده شده است. چون روش به دست آوردن پارامترها در مدل کاکس و مدل های پارامتری متفاوت است، تخمین پارامترها و واریانس های به دست آمده و ملاک AIC نمی تواند برای مقایسه مدل ها مناسب باشد، (۱۳). AIC معیاری است که هدف آن اندازه گیری نیکویی برآش مدل است و اندازه آن هر چه کم تر باشد بهتر است. از نمودار باقی مانده کاکس-اسنل برای بررسی مناسب بودن و ارزیابی مدل های برآش داده شده استفاده شد در صورت درستی مدل برآش شده، نمودار باقی مانده کاکس-اسنل در مقابل برآورد کاپلان-مایر تابع بقا باید به صورت خط ۴۵ درجه ظاهر شود. (۷). کلیه محاسبات با نرم افزار STATA vol.11/1 انجام و سطح معنی داری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته های پژوهش

از مجموع ۵۸۰ بیمار، ۵۳/۹ درصد مذکور بودند. میانگین سن بیماران هنگام تشخیص بیماری($SD=11.8$) ۶۳ سال بود و ۶۶ درصد از بیماران زنده بودند. برای برآش بهترین مدل به داده های بقا، به کمک آزمون Log Rank متغیرهای موثر بر زمان بقا بیماران تعیین شدند. متغیرهای سن هنگام تشخیص بیماری، جنسیت، محل سلطان روده بزرگ، منطقه شهرداری محل سکونت، سرپرست دوران کودکی، متوسط ناحیه محل زندگی، تحصیلات، سابقه خانوادگی سلطان روده بزرگ و شغل معنی دار بودند. ($P<0.05$) سپس کلیه متغیرهایی که در آزمون Log Rank معنی دار شده بودند را در مدل های مختلف بقا وارد کرده و در هر یک از مدل ها به روش رو به عقب، عوامل موثر بر بقا افراد، شناسایی و مدل نهایی در هر یک از مدل ها تشکیل گردید. جدول شماره ۱ برآورد نسبت خطر به همراه فاصله اطمینان ۹۵ درصدی و AIC را در مدل های پارامتری برآش داده شده نشان می دهد.


همان طور که در جدول شماره ۱ مشاهده می شود در مدل های نمایی، وایبل، لگ-لجستیک متغیرهای سن تشخیص سلطان، جنسیت، محل سلطان روده

این رو مدل پارامتری لگ-لجستیک مناسب نیمساز نسبت به مدل لگ-لجستیک بیشتر بود، از ترین مدل بود.

جدول شماره ۱. عوامل دموگرافیک و اقتصادی-اجتماعی موثر حاصل از برآش مدل های پارامتری در بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ استخراج شده از مرکز سرطان شهدای تجریش

متغیر	مدل نمایی HR(95% C.I)+	مدل واibel HR(95% C.I)	مدل لگنرمال HR(95% C.I)	مدل لجستیک HR(95% C.I)	مدل گامی تعمیم یافته HR(95% C.I)
سن هنگام تشخیص سرطان (سال)	۱/۰۵(۱/۰۳ و ۱/۰۷)	۱/۰۵(۱/۰۳ و ۱/۰۷)	۱/۰۶(۱/۰۴ و ۱/۰۷)	۱/۰۵(۱/۰۳ و ۱/۰۶)	۱/۰۶(۱/۰۳ و ۱/۰۷)
جنسیت ^۱	۱/۷۰(۱/۲۴ و ۲/۳۴)	۱/۷۰(۱/۲۴ و ۲/۳۴)	۱/۹۳(۱/۳۶ و ۲/۷۷)	۱/۷۸(۱/۲۷ و ۲/۵۱)	۱/۹۴(۱/۳۵ و ۲/۸۰)
محل سرطان ^۲	۰/۴۳(۰/۲۶ و ۰/۷۰)	۰/۴۳(۰/۲۶ و ۰/۷۰)	۰/۳۲(۰/۱۹ و ۰/۵۴)	۰/۳۷(۰/۲۲ و ۰/۶۱)	۰/۳۱(۰/۱۸ و ۰/۵۵)
سرپرست دوران کودکی ^۳	۰/۵۸(۰/۳۷ و ۰/۹۲)	۰/۵۸(۰/۳۷ و ۰/۹۲)	-	۰/۵۵(۰/۲۲ و ۰/۹۴)	-
منطقه شهرداری ^۴	۰/۶۰(۰/۴۳ و ۰/۸۳)	۰/۶۰(۰/۴۳ و ۰/۸۳)	۰/۴۹(۰/۳۴ و ۰/۷۱)	۰/۵۶(۰/۳۹ و ۰/۸۰)	۰/۴۹(۰/۳۳ و ۰/۷۱)
AIC	۹۹۲/۴۱	۹۹۴/۳۷	۹۹۷/۴۵	۹۹۰/۹۴	۹۹۰/۴۳

۱. مرد نسبت به زن، ۲. رکتو نسبت به کولون، ۳. پدر و مادر نسبت به سایرین، ۴. شمال به سایر مناطق، +. نسبت خطر به همراه فاصله اطمینان.



نمودار شماره ۱. نمودار باقی مانده کاکس-اسنل مدل های پارامتری و کاکس در بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ استخراج شده از مرکز سرطان شهدای تجریش

نسبت خطر محاسبه شده برای همه مدل های پارامتری تقریباً مشابه بود. در مدل های لگ-نرمال و گامای تعمیم یافته متغیر اجتماعی سرپرست دوران کودکی معنی دار نبود. بر اساس معیار AIC مدل های گامای تعمیم یافته و مدل لگ-لجستیک به عنوان بهترین مدل های برآش شده می باشند. با بررسی نمودار باقی مانده کاکس-اسنل، مدل لگ-لجستیک

بحث و نتیجه گیری

این مطالعه به منظور شناسایی عوامل دموگرافیک و اقتصادی-اجتماعی موثر بر بقای ۵ ساله بیماران سرطان روده بزرگ شهر تهران و ارزیابی مدل های پارامتری و کاکس انجام شد که مدل ها بر اساس AIC و نمودار باقی مانده کاکس-اسنل مقایسه شدند.

برای متغیرهای سن تشخیص سرطان، جنسیت، محل سرطان روده بزرگ، سرپرست دوران کودکی و منطقه شهرداری محل سکونت فرضیه PH برقرار نبود و فرضیه AFT برقرار بود که در این حالت انتظار می‌رود مدل لگ-لجستیک بازش بهتری به داده‌ها باشد که در این مطالعه نیز این نتیجه به دست آمد،(۲۳-۲۴). در صورت عدم برقراری فرضیه PH می‌توان روش‌های دیگری را به کار برد،(۲۵). هم‌چنین در این مطالعه موارد سانسور شده در حدود ۶۵ درصد بود که مناسب‌ترین شرایط جهت بازش مدل‌های پارامتری هنگامی است که موارد سانسور شده از ۴۰ درصد بیشتر نباشد،(۲۶)، اما همان طور که نمودار باقی مانده کاکس-استل نشان داد مدل پارامتری لگ-لجستیک بازش مناسبی برای این داده‌ها بود.

این مطالعه دارای این محدودیت بود که بخشی از اطلاعات مهم بیماران مثل درجه بدخیمی تومور برای همه بیماران ثبت نشده بود.

در صورت برقراری مفروضات مدل‌های پارامتری، می‌توان در بررسی بقای بیماران سرطان روده بزرگ از این مدل‌ها استفاده نمود. همان‌طور که نتایج این مطالعه نشان داد علاوه بر عوامل دموگرافیک، عامل اقتصادی-اجتماعی منطقه شهرداری محل سکونت میزان بقای افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ را تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد علاوه بر تمرکز بر پیشرفت‌های درمانی، هم‌چنین می‌بایست به عوامل تاثیرگذار بر بقای سرطان روده بزرگ توجه شود و در برنامه ریزی‌های آینده، بهبود وضعیت تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت نیز مدنظر قرار گیرد.

سیاستگزاری

در پایان از مرکز تحقیقات سرطان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دلیل فراهم آوردن دسترسی به اطلاعات بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ، تشكر و قدردانی به عمل می‌آید.

References

- 1-Cox DR. Regression models and life-tables. J Royal Stat Soci Serie B 1972;187-220.

مدل مناسب تری برای داده‌های این مطالعه است. نمودار باقی مانده کاکس-استل برای مدل کاکس طبقه بنده شده نشان از نیکوبی برآش این مدل دارد ولی این نمودار، برای مدل لگ-لجستیک برآش بهتری را نشان می‌دهد.

ارتباط معنی داری بین سن هنگام تشخیص سرطان و زمان بقا دیده شد بدین معنا که هر چه سن تشخیص بالاتر باشد مخاطره نیز بالاتر است. در مطالعات دیگر نیز ارتباط قوی بین سن تشخیص و زمان بقا وجود دارد،(۱۴). تفاوت زمان بقا در زنان و مردان معنی دار شد که خطر برای مردان تقریباً ۲ برابر زنان است. برخی مطالعات بالا بودن زمان بقای زنان نسبت به مردان را نشان دادند،(۱۵،۱۶) و مطالعه دیگری نیز بیشتر بودن مرگ و میر مردان نسبت به زنان از این سرطان را نشان داده است،(۱۷). بین منطقه شهرداری محل سکونت و زمان بقا رابطه به دست آمد، که برای بیماران ساکن در منطقه شهرداری شمال مخاطره تقریباً نصف سایر مناطق است. هر چند توجیه تفاوت بین مناطق مختلف شهری به طور دقیق میسر نیست اما آن‌چه مسلم است این تفاوت به علت اختلاف عوامل اقتصادی-اجتماعی در مناطق مختلف شهری بوده است. در مطالعه‌های دیگر نیز بین منطقه محل سکونت افراد و زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ ارتباط به دست آمد،(۱۸،۱۹). بین محل سرطان (کولون-رکتوم) و زمان بقاء ارتباط معنادار به دست آمد که مطالعات دیگر نیز این نتیجه را تایید می‌کنند،(۲۰،۲۱). محل سرطان به عنوان یک عامل مهم در بقاء در نظر گرفته می‌شود که در این مطالعه، محل سرطان در ۸۱/۵ درصد از افراد در کولون بود که این تفاوت در محل سرطان نیز در سایر مطالعات مشاهده شده است،(۲۲). مخاطره برای افرادی که محل سرطان در کولون بود ۲/۷ برابر مخاطره برای افرادی است که محل سرطان در رکتوم بوده است.

2-Kalbfleisch JD, Prentice RL. The statistical analysis of failure time data. New York: Wiley; 1980.P.100-50.

3-Lawless JF. Parametric models in survival analysis. In: encyclopedia of biostatistics.

- astistics. Armitage P, Colton T, editors. New York: Wiley; 1998.P.3254-64.
- 4-Efron B. The efficiency of Cox's likelihood function for censored data. *J Am Stat Assoc* 1977;72:557-65.
- 5-Oakes D. The asymptotic information in censored survival data. *Biometrika* 1977; 64:441-8.
- 6-Gelber RD, Goldhirsch A, Cole BF. Parametric extrapolation of survival estimates with applications to quality of life evaluation of treatments. *Contr Clin Trials* 1993; 14:485-99.
- 7-Klein J, Moeschberger M. Survival analysis techniques for censored and truncated data. 2th ed. New York: Springer-Verlag; 2003.P.393-405.
- 8-World Health Organisation. Cancer. *J Bas Res* 2009;14:341-8.
- 9-Sajadi A, Nouraei M, Mohagheghi M, Mousavi-Jarrahi A, Malekezadeh R, Parkin D. Cancer occurrence in Iran in 2002, an international perspective. *Asian Pac J Can Prev* 2005;6:35-9.
- 10-Shack L, Rachet B, Brewster D, Coleman M. Socioeconomic inequalities in cancer survival in Scotland 1986–2000. *Brit J Can* 2007;97:999-1004.
- 11-Woods L, Rachet B, Coleman M. Origins of socio-economic inequalities in cancer survival: a review. *Ann Oncol* 2006; 17:5-19.
- 12-Ionescu M, Carey F, Tait I, Steele R. Socioeconomic status and stage at presentation of colorectal cancer. *Lancet* 1998; 352:143-9.
- 13-Akaike H. A new look at the statistical model identification. *Autom Contr Transact* 1974;19:716-23.
- 14-Møller H, Sandin F, Robinson D, Bray F, Klint Å, Linklater KM, et al. Colorectal cancer survival in socioeconomic groups in England: variation is mainly in the short term after diagnosis. *Eur J Can* 2012;48:46-53.
- 15-Aarts MJ, Lemmens V, Louwman M, Kunst AE, Coebergh J. Socioeconomic status and changing inequalities in colorectal cancer? A review of the associations with risk, treatment and outcome. *Eur J Can* 2010;46:26-71.
- 16-Dupont M, Pampalon R, Hamel D. Deprivation and cancer mortality among Quebec women and men, 1994-1998. *J Can* 2004;24:364-9.
- 17-Wrigley H, Roderick P, George S, Smith J, Mullee M, Goddard J. Inequalities in survival from colorectal cancer: a comparison of the impact of deprivation, treatment, and host factors on observed and cause specific survival. *J Epidemiol Commun Health* 2003;57:301-9.
- 18-Blais S, Dejardin O, Boutreux S, Launoy G. Social determinants of access to reference care centres for patients with colorectal cancer—a multilevel analysis. *Eur J Can* 2006;42:3041-8.
- 19-Dejardin O, Remontet L, Bouvier A, Danzon A, Tretarre B, Delafosse P, et al. Socioeconomic and geographic determinants of survival of patients with digestive cancer in France. *Brit J Can* 2006;95:944-9.
- 20-Wray CM, Ziogas A, Hinojosa MW, Le H, Stamos MJ, Zell JA. Tumor subsite location within the colon is prognostic for survival after colon cancer diagnosis. *Dis Colon Rectum* 2009;52:1359-66.
- 21-Meguid RA, Slidell MB, Wolfgang CL, Ahuja N. Is there a difference in survival between right-versus left-sided colon cancers? *Ann Surg Oncol* 2008;15:2388-94.
- 22-Montazer-Haghghi M, Vahedi M, Mohabbi SR, Pourhoseingholi MA, Fatemi SR, Zali MR. [Evaluation of 4-year survival in familial and non familial colorectal cancer]. *Med Sci J Islamic Azad Uni* 2010;20:40-4.(Persian)
- 23-Abadi A, Amanpour F, Bajdik C, Yavari P. Breast Cancer Survival Analysis: Applying the Generalized Gamma Distribution under Different Conditions of the Proportional Hazards and Accelerated Failure Time Assumptions. *Int J Prev Med* 2012;3:644-9.
- 24-Nardi A, Schemper M. New residuals for Cox regression and their application to outlier screening. *Biometrics* 1999;55:523-9.
- 25-Schemper M, Wakounig S, Heinze G. The estimation of average hazard ratios by weighted Cox regression. *Stat Med* 2009; 28:2473-89.
- 26-Nardi A, Schemper M. Comparing Cox and parametric models in clinical studies. *Stat Med* 2003;22:3597-610.



Assessment of Parametric Models For Determining 5-Year Survival In Patients With Colon Cancer In Tehran

Abadi A.R¹, Ahmadi F², Alavimajd H², Akbari M.E³, Davoudi Monfared E¹, Rezaei Tavirani M⁴

(Received: 6 May. 2013)

Accepted: 19 Aug. 2013)

Abstract

Introduction: Cancer is the second cause of death in the world, and colon cancer is the third cause of cancer deaths. Assessment of factors which affect this cancer is important for prolonging the patient survival. The purpose of this study was to compare parametric and Cox models as well as to determine demographic and socioeconomic factors affecting the 5-year survival of patients with colon cancer.

Materials & Methods: In this survival study, population included 580 patients with colon cancer who were recorded in the Cancer Research Center of Shahid Beheshti University of Medical Science from April 2005 to November 2006 and then were followed up for 5 years. Exponential, weibull, lognormal, log-logistic, and generalized gamma parametric models and Cox model were used to process the data. The models were compared with Akaike's information criteria and Cox-Snell residual plot.

Findings: Of 580 patients, 34% died. The age of patient during cancer diagnosis, gender, custody during childhood, residence location and afflicted organ were associated with the 5-year survival of patients. He calculated hazard ratios were nearly similar in different models. Based on Akaike's information criteria, the log-logistic and extended gamma models were determined as better models, however based on Cox-Snell residual, the log-logistic and exponential models were determined as better models.

Discussion & Conclusion: The result of study showed that the log-logistic model is a suitable model. Regarding the association between socioeconomic factor of residence location and 5-year survival of patients, the health promotion programs and planes is needed to improve the socioeconomic determinants of health status.

Keywords: parametric models, socioeconomic factors, colon cancer

1. Dept of Community Medicine and Health, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2. Dept of Biostatistics, School of Paramedical Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4. Dept of General Surgery, Faculty of Medicine, Ilam, Iran

*(corresponding author)