

مطالعه ساختار و پایداری آلبومین سرم انسانی در حضور DTAB

پادینا واقعی مغوان^{*}، نایبعلی احمدی^۱، مینو شاهانی^۱، ایاد بهادری منفرد^۲، منیره عزیزی^۳

- (۱) مرکز تحقیقات پرتوئومیکس، دانشکده پرایپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
- (۲) گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
- (۳) گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تاریخ پذیرش: ۹۲/۸/۲۱

تاریخ دریافت: ۹۲/۵/۱۴

چکیده

مقدمه: آلبومین سرم انسانی با ساختار منحصر به فرد خود به عنوان یک مولکول حامل در پلاسمما، می‌تواند به طیف وسیعی از مواد اتصال یابد و در نتیجه نقش‌های متنوعی را ایفا کند. هر گونه تغییر غیر طبیعی در ساختار و عملکرد آلبومین، می‌تواند عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد. در این تحقیق اتصال لیگاند‌هایی چون دترجنت‌ها(DTAB) و قندها(گلوكز) در دماهای ۳۷ و ۴۲ درجه سانتی گراد بر روی آلبومین بررسی شد.

مواد و روش‌ها: بافر تریس آلبومین با pH نزدیک به pH بدن تهیی گردید و به منظور دناتوراسیون آن از اسید کلریدریک استفاده شد. تکنیک مورد استفاده جهت مطالعات دناتوراسیون در این تحقیق طیف سنجی UV بود.

یافته‌های پژوهش: نتایج نشان داد که با افزایش غلظت DTAB، ماکریم جذب پروتئین، کاهش یافته، غلظت ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر قند، سبب تغییرات قابل ملاحظه‌ای در جذب آلبومین سرم انسانی شده و احتمالاً ساختار و عملکرد مولکول تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بحث و نتیجه گیری: گلوكز علاوه بر تأثیرات زیانباری که دارد می‌تواند عملکرد بسیاری از مولکول‌ها را در خون تغییر دهد. به عنوان مثال، در سطوح هورمونی، انتقال داروها، عناصر و یون‌های حیاتی و مورد نیاز بدن، می‌تواند تأثیرات شگرف و مهمی داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: آلبومین سرم انسانی، کاتیون UV DTAB، گلوكز، دناتوراسیون دمایی، طیف سنجی

* نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات پرتوئومیکس، دانشکده پرایپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

Email: padinavm@gmail.com

مقدمه

۷۵/۳ پودر بافر تریس به ۴۰۰ cc آب مقطر اضافه گردید(pH10) سپس با اضافه کردن تدریجی HCl به محلول، pH تا ۵/۷ کاهش داده شد، و پس از آن ۱۰۰ cc آب مقطر به محلول اضافه گردید تا به این ترتیب حجم HSA، A- ۵۰۰ cc برسد. آلبومین سرم انسانی (۱۸۸۷، Lot. No. 1449319, fatty acid free شرکت سیگما آمریکا خریداری شد و پس از آماده سازی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از این آلبومین و محلول بافر، نمونه ای با غلظت 1 mg ml^{-1} DTAB آزمایشات با غلظت 10^{-4} M تهیه گردید. کاتیون DTAB که غلظت های مختلف(۰،۰۵، ۰/۵ و ۲ میلی مولار) تهیه گردید. ۰/۵ گرم گلوکز با آب مقطر به حجم ۲ ml رسانده شد، جهت برداشت غلظت های متفاوت گلوکز(100 ، ۱۷۵ و ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر) حجم های مختلفی از این نمونه به محلول آلبومین انکوبه شده با DTAB اضافه گردید. از آن جا که هدف استفاده از روش اسپکتروفوتومتری UV-Visible، به دست آوردن طیف جذبی آلبومین است از خاصیت اسیدآمینه های آروماتیک آلبومین در جذب فوتون هایی با طول موج ۲۸۰ nm استفاده گردید. در این مرحله، بعد از پنج دقیقه انکوباسیون DTAB و گلوکز با آلبومین، با استفاده از این دستگاه، فوتون هایی با طول موج های $250-300 \text{ nm}$ به نمونه داده شد و جذب ماکزیمم اندازه گیری شد. با استفاده از این روش غلظت های DTAB و گلوکز با HSA مورد بررسی قرار گرفت و در دمای ۳۷ و ۴۲ درجه سانتی گراد سه بار تکرار گردید.

یافته های پژوهش


طیف های UV آلبومین سرم انسانی انکوبه شده با کاتیون DTAB و غلظت های مختلف قند، در دماهای ۳۷ و ۴۲ درجه سانتی گراد به ترتیب در شکل های شماره ۱ و ۲ ترسیم شده اند.

شکل شماره ۱، ماکزیمم جذب آلبومین سرم انسانی، انکوبه شده با کاتیون DTAB در حضور غلظت های مختلف قند در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد می باشد.

آلبومن سرم انسانی، یکی از مهم ترین اجزاء پروتئین های پلاسمایی باشد، تک رشته ای و غیر گلیکوزیله بوده و دارای ۵۸۵ اسید آمینه است. در کبد سنتز شده و نهایتاً ساختار قلبی شکل به خود می گیرد،^(۱). غلظت این پروتئین در خون در حدود $M^{+4} \times 10^{-7}$ می باشد،^(۲). این پروتئین حامل قند، هورمون ها، داروها، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه و تعدادی از کاتیون ها در سیستم گردش خون می باشد. هم چنین در جداسازی رادیکال های آزاد اکسیژن و متابولیت های سمی مانند بیلی رو بین نقش دارد. تنظیم فشار اسمزی خون یکی از عملکرد های اصلی آلبومین سرم انسانی می باشد،^(۳). علاوه بر این آلبومین سرم انسانی به تعییر pH خون حساس می باشد و به عنوان یک بافر در تنظیم pH خون ایفای نقش می کند،^(۴). از نظر محتوای ساختمانی دارای ۶۷ درصد ساختار α هلیکس بوده و فقد صفحات β می باشد،^(۵). این پروتئین از سه دمین مشابه تشکیل شده است. حداقل ۶ ناحیه در آلبومین سرم انسانی برای پیوند شدن غیر کووالانسی مولکول های کوچک و یون ها وجود دارد. آلبومین دارای توانایی تعییر ساختار در حضور و عدم حضور لیگاند می باشد. هر ناحیه از آلبومین در ضمن پیوند شدن لیگاندها می تواند تعییر ساختار دهد،^(۶). گلوکز نیز یکی از موادی است که به وسیله آلبومین سرم انسانی در خون حمل می شود. بر اساس معیار تشخیصی انجمن دیابت آمریکا قندخون ناشتا ای بالای ۱۱۰ میلی گرم بر دسی لیتر در دو بار متوالی دیابت تلقی می شود. در غیاب انسولین و یا در صورت مقاومت به انسولین غلظت قندخون افزایش می یابد و تمامی عوارض دیابت به علت تأثیر قندخون بر روی عروق بافت های مختلف است.^(۷). از آن جا که حامل قندخون آلبومین سرم انسانی می باشد اهمیت مطالعه تاثیرات قندخون بر ساختار پروتئین در کنار عوامل دیگری چون تعییرات دمایی، و یا حضور لیگاندهای دیگر آشکار می شود.

مواد و روش ها


به منظور تهیه بافری با pH نزدیک به pH بدن، gr



شکل شماره ۱. جذب طول موج ۲۸۰ نانومتر آلبومین سرم انسانی در حضور غلظت‌های مختلف گلوکز در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به عنوان تابعی از غلظت DTAB در بافر فسفات نیم میلی مولار و pH=7

حضور غلظت‌های مختلف قند در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد می‌باشد.

هم چنین شکل شماره ۲، ماکریزم جذب آلبومین سرم انسانی، انکوبه شده با کاتیون DTAB در



شکل شماره ۲. جذب طول موج ۲۸۰ نانومتر آلبومین سرم انسانی در حضور غلظت‌های مختلف گلوکز در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد به عنوان تابعی از غلظت DTAB در بافر فسفات نیم میلی مولار و pH=7

غلظت قند، تمایل پروتئین به کاتیون DTAB بیشتر شده است. در شکل شماره ۲ همان طور که مشاهده می‌شود پروتئین در غلظت ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر قند، ماکریزم جذب را در غلظت بیشتری از DTAB حاصل می‌کند. به طوری که ماکریزم جذب پروتئین در غلظت ۱۷۵ میلی گرم بر دسی لیتر قند در غلظت ۱ میلی مولار DTAB و در غلظت ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر قند، در غلظت ۱/۵ میلی مولار DTAB دیده می‌شود. از طرفی با توجه به شکل شماره ۲ در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد نیز مانند دمای فیزیولوژیک، با افزایش غلظت DTAB، ماکریزم جذب پروتئین کاهش یافته است؛ زیرا ماکریزم جذب غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر قند، در ۳۳۰ نانومتر بوده و این رقم در غلظت ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر قند به ۲۸۶ نانومتر نزول پیدا کرده است. هم چنین مانند شکل شماره ۱ با افزایش غلظت قند، تمایل پروتئین

بحث و نتیجه‌گیری

همان طور که مشاهده می‌شود در دو غلظت ۱۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر قند، جذب بیشینه در غلظت ۰/۵ میلی مولار از DTAB رخ داده است و این در حالی است که در غلظت قند ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر جذب بیشینه در غلظت ۱ میلی مولار از DTAB حاصل شده است. با افزایش غلظت DTAB، ماکریزم جذب در غلظت ۰/۵ میلی مولار DTAB و شرایط نرمال قندخون کاهش یافته است. با توجه به شکل ماکریزم جذب در غلظت ۰/۵ میلی مولار DTAB و شرایط هایپرگلاسیمی با ۱۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر و شروع هایپرگلاسیمی با غلظت قند ۱۷۵ میلی گرم بر دسی لیتر، به ترتیب ۳۲۵ و ۳۱۶ نانومتر می‌باشد و این در حالی است که ماکریزم جذب در غلظت ۱ میلی مولار DTAB و شرایط دیابت با غلظت قند ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر، تا ۲۷۸ نانومتر کاهش محسوسی نشان می‌دهد. هم چنین با افزایش

نتیجه می توان گفت این افراد بیشتر در معرض ابتلا به فشارخون و عوارض ناشی از آن قرار دارند. هم چنین با توجه به نتایج منتشر شده در مجله دیابت و لبید، ماکریم جذب آلبومین گلایکه شده با غلظت بالای قند در مقایسه با ماکریم جذب آلبومین انکوبه شده با DTAB و قند به غلظت ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر نشان می دهد پایداری پروتئین در حالتی که تنها با غلظت بالای قند انکوبه شده است، بیشتر از زمانی است که کاتیون نیز به آن ها می پیوندد. این موضوع نشان می دهد که آلبومین فرد دیابتی ای که از نمک کمتری در رژیم غذایی خود استفاده می کند، در وضعیت پایدارتری قرار دارد نسبت به فردی که رژیم غذایی پر نمکی دارد. این مهم باعث می شود افرادی با رژیم غذایی کنترل شده و مبتلا به دیابت کمتر در معرض بروز بیماری های جانبی مانند فشارخون، بیماری های قلبی و عروقی، نارسایی های کلیوی و بیماری های اتوایمیون مانند پسوریاز، آرتربیت روماتوئید، ام اس و اسپوندیلیت آنکلیوزان شوند؛ چرا که هافلر و همکاران دریافتند نمک در ایجاد بیماری های خودایمنی مانند «دیابت نوع یک» نقش دارد،(۱۱). این پژوهش نشان می دهد که غلظت ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر قند سبب تغییرات قبل ملاحظه ای در جذب آلبومین سرم انسانی شده است و احتمالاً ساختار و عملکرد مولکول تحت تاثیر قرار می گیرد. آن گونه که از نتایج حاصله بر می آید، گلوکز علاوه بر تأثیرات زیانباری که دارد می تواند عملکرد بسیاری از مولکول ها را در خون تغییر دهد. به عنوان مثال این مهم در سطوح هورمونی، انتقال داروها، عناصر و یون های حیاتی و مورد نیاز بدن، می تواند تأثیرات شگرف و مهمی داشته باشد.

References

- 1- Rezaei-Tavirani M, Mahdavi SM, Heidarian E. Electrochemical study of attaching the active substance HPB to human serum albumin. J Ilam Uni Med Sci 2006; 4:38-43. (Persian)
- 2- Fasano M, Curry S, Terreno E, Galliano M, Fanali G, Narciso P, et al. The extraordinary ligand binding properties of human serum albumin, IUBMB Life 2005; 57:787-96.
- 3- Curry S. Lessons from the crystallographic analysis of small molecule binding to human serum albumin. Drug Metab Pharmacokinet 2009; 24:342-57.
- 4- Peters Jr T. All about albumin: biochemistry, genetics and medical applications.

به کاتیون DTAB بیشتر شده است. با افزایش غلظت قندخون، ماکریم جذب غلظت ۱۷۵ میلی گرم بر دسی لیتر قند، در غلظت ۱ میلی مولار DTAB حاصل شده و با افزایش غلظت قندخون به ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر ماکریم جذب در غلظت ۱/۵ میلی مولار از DTAB دیده می شود. با توجه به این که در هر دو دمای ۳۷ و ۴۲ درجه سانتی گراد تمایل پروتئین به کاتیون با افزایش غلظت قندخون افزایش یافته است می توان گفت اگر کاتیون Na^+ تشییع DTAB را به لحاظ داشتن یک بار مثبت به کنیم، می توان گفت در افراد مبتلا به دیابت مصرف نمک طعام از حساسیت بیشتری برخوردار است، چرا که آلبومین تمایل بیشتری به نمک پیدا کرده و این موضوع شخص را مستعد ابتلا به فشارخون و متعاقباً بیماری های قلبی-عروقی خواهد کرد. بیش از ۵۰ درصد مبتلایان به دیابت نوع ۲ به بیماری فشارخون مبتلا هستند،(۸). در مبتلایان به دیابت نوع یک، این درصد، در ابتداء و در سنین پایین به مراتب کمتر است و تدریجاً با افزایش سن، بیشتر می شود،(۹). فشارخون بالا، دیابت را تشید و دیابت، فشارخون را بدتر می کند و تنها راه کنترل این دو، درمان توأم و هم زمان آن هاست. هر چه فشارخون بیمار دیابتی، بهتر کنترل شود، خطر بروز سکته های قلبی و مغزی، ضایعات چشمی و کلیوی و عروقی و اعصاب محیطی در او کمتر می شود و برعکس. لذا توجه به این مسئله از اهمیت فراوانی برخوردار است،(۱۰). با توجه به اطلاعات حاصل از شکل های ۱ و ۲ قند با غلظت ۴۰۰ میلی گرم بر دسی لیتر می توان گفت جایگاه های فعل آلبومین سرم انسانی فرد مبتلا به دیابت که دچار تب شده است، تمایل به کاتیون دارد. در

Academic Press: San Diego and London; 1996.

- 5- Curry S. Beyond expansion: structural studies on the transport roles of human serum albumin. Vox Sang 2002; 83:315-9.
- 6- Lockridge O, Xue W, Gaydess A, Grigoryan H, Ding SJ, Schopfer LM, et al. Pseudo-esterase activity of human albumin: slow turnover on tyrosine 411 and stable acetylation of 82 residues including 59 lysines. J Biol Chem 2008;283:22582-90.
- 7- Maraschin Jde F. Classification of diabetes. Adv Exp Med Biol 2012; 771:12-9.
- 8- The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pre-

- ssure. National Heart, Lung and Blood Institute; 2003.
- 9- Sicras AM. Clinical and economic characteristics associated with type 2 diabetes. Rev Clin ESP 2013; 17:164-9.
- 10- Sowers R, Epstein M. Diabetes Mellitus and Associated Hypertension, Vascular D-

isease, and Nephropathy. Am Heart Assoc J 1995; 26: 869-79.

11- Muller N, Hafler A. Sodium chloride drives autoimmune disease by the induction of pathogenic TH17 cells. Nature 2013; 21:965-71.

Evaluating Human Serum Albumin Structure and Stability in the Presence of DTAB

Vaseghimaghvan P^{1*}, Ahmadi N¹, Shahani M¹, BahadoriMonfared E², Azizi M³

Received: 5August, 2013 Accepted: 12November, 2013

Abstract

Introduction: Human serum albumin with its singular structure acts as a carrier molecule that can attach to a variety of substances. Any structural or functional changes in albumin are accompanied with undesirable outcomes. In the present research, attachment of some ligands such as detergents (DTAB) and sugars (glucose) to albumin were evaluated at temperatures 27°C and 42°C.

Materials & Methods: Tris-buffer solution for albumin with a pH close to the pH of body was prepared. To denature albumin, hydrochloric acid was used. UV spectrophotometric technique was applied to evaluate denaturation process.

Findings: With increment of DTAB concentration the maximum optical absorption of albumin decreased. Glucose concentration at 400mg/dl level caused a profound change in the optical absorption of albumin that might affect the structure of the molecule.

Discussion & Conclusion: Glucose elevation has deleterious effects and deteriorates the function of many molecules in blood. The effects may exert on hormones, drug transportation, necessary ions and elements

Keywords: Human serum albumin, DTAB cation, glucose, thermal denaturation, UV spectrophotometry

1. Proteomic Research Center, Faculty of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2. Dept of Health and Social Medicine, Faculty of Paramedicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. Dept of Anatomy, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

*Corresponding author