

رونده مرگ و میر سرطان پستان در میان زنان ایرانی

زینب فاضلی^۱، فاطمه السادات فاضلی باوندپور^۲، علی رضا ابدی^۳، محمدامین پورحسینقلی^{۴*}، اکبر اکبری^۴، جعفر سلیمان^۵

- (۱) مرکز تحقیقات پروتومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- (۲) مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- (۳) گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- (۴) گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه امام حسین
- (۵) مرکز تحقیقات میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بنیه (عله)

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۱/۲۶

تاریخ دریافت: ۹۱/۸/۱۹

چکیده

مقدمه: سرطان پستان یکی از سرطان های شایع در میان زنان است. مطالعه حاضر به منظور برآورد بار حاصل از مرگ و میر سرطان پستان در جمعیت زنان ایرانی و بررسی روند آن طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ انجام شده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه آنالیز بر روی اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به مرگ حاصل از سرطان پستان در سال های تحت مطالعه انجام شده است. اطلاعات در گروه های جنسی و گروه های سنی گروه بندی شده و میزان های مرگ بر اساس جمعیت تحت پوشش ثبت مرگ محاسبه گردیده است.

یافته های پژوهش: این مطالعه نشان داد که مرگ و میر استاندارد شده سنی به علت ابتلا به سرطان پستان در ایران در سال های تحت مطالعه افزایش یافته است هر چند که در طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۳ ثابت می باشد.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به روند افزایشی این سرطان در میان زنان ایرانی و از آن جا که تشخیص زودرس سرطان پستان کلید اصلی کاهش بار مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان می باشد. در نتیجه برنامه های غربالگری به خصوص برای زنان در گروه های سنی جوان جهت کاهش میزان مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان در سال های آتی ضروری به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: سرطان پستان، مرگ و میر، ایران

* نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: Amin_phg@yahoo.com

مقدمه

سرطان پستان به عنوان یکی از سرطان‌های رایج در میان زنان شناخته شده است.^(۱) به طوری که سالانه بیش از 502000 زن به علت ابتلا به این سرطان جان خود را از دست می‌دهند. ابتلا به سرطان پستان به عنوان دومین سرطان کشنده در میان زنان آمریکایی و نیز اولین سرطان کشنده در میان زنان اروپایی شناخته شده است.^(۲) مطالعات جهانی نشان می‌دهد که ابتلا به این سرطان در حال افزایش می‌باشد.^(۳) مطالعات انجام شده توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران نشان می‌دهد که در این کشور نیز مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان پس از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و نیز تصادفات قرار دارد. سالانه بیش از 30000 نفر از ایرانیان در اثر سرطان، جان خود را از دست می‌دهند. تخمین زده می‌شود سالیانه بیش از 70/000 مورد جدید سرطان، در کشور اتفاق می‌افتد. با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالم‌مندی در جمعیت کشور، انتظار می‌رود موارد بروز سرطان در دو دهه آینده به دو برابر فعلی، افزایش یابد.^(۴) در این میان سرطان پستان شایع ترین سرطان و شایع ترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان ایرانی می‌باشد.^(۵) و بر اساس اطلاعات ثبت شده در ایران از سال 1378 در حال افزایش است.^(۶) از طرف دیگر خوشبختانه، این سرطان از دسته سرطان‌های قابل پیشگیری و قابل تشخیص زودرس است که با ارائه راهکارهای ویژه می‌توان منجر به کاهش مراجعه دیر هنگام و ارائه درمان موثر به منظور افزایش بقاء، کاهش مرگ و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران شد.

هدف این مطالعه برآورد میزان و روند مرگ‌های حاصل از این سرطان کشنده در جمعیت ایران طی سال‌های 1383-1374 می‌باشد تا بتوان دورنمایی کلی از روند مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان را در ایران ارائه داد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه که به صورت گذشته نگر انجام شده است، کلیه مرگ‌های حاصل از سرطان پستان (ICD-10:C50) طی سال‌های 1374-1383 که توسط وزارت بهداشت و درمان کشور و به صورت کتاب سیمای مرگ منتشر شده، جهت محاسبه میزان و روند مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان در ایران، به مطالعه وارد شده اند. اطلاعات در گروه‌های جنسی (زن و مرد) و گروه‌های سنی (زیر ۵ سال، ۱4-۵ سال، ۱5-۴۹ سال و بالای ۵۰ سال) گروه بنده شدن و میزان های مرگ در هر گروه جنسی و سنی و بر اساس جمعیت پایه در آن گروه که از اطلاعات مرکز آمار به دست آورده شده اند (مرگ به ازای هر 100 هزار نفر) محاسبه شدند. سپس این میزان‌ها در قالب جدول و نمودار و بر پایه سال‌های تحت مطالعه ارائه شدند.

یافته‌های پژوهش


در این مطالعه کلیه اطلاعات مرگ و میر حاصل از سرطان پستان از سال‌های 1374-1383 در کلیه گروه‌های سنی بررسی شده است. نتایج حاصل از محاسبه میزان مرگ و میر استاندارد شده سنی به علت ابتلا به سرطان پستان طی سال‌های تحت مطالعه از ۰/۹۶ به ۲/۵۸ به ازای هر 100000 نفر افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. (جدول شماره ۱ و نمودار شماره ۱)

با افزایش سن، مرگ و میر افراد به علت ابتلا به این سرطان بیشتر دیده می‌شود. (جدول شماره ۱ و نمودار شماره ۲) لازم به ذکر است که نسبت افزایش این مرگ و میرها در میان رده‌های سنی ۱5-۴۹ سال در مقایسه با رده سنی بالای ۵۰ سال رشد بیشتری داشته است به طوری که در میان رده‌های سنی ۴۹-۱۵ سال مرگ و میر از ۰/۷۴ در هر 1000000 نفر در سال ۱374 به ۲/۰۸ نفر در هر 100000 نفر در سال ۱383 رسیده است، در حالی که در افراد مسن تر این میزان از ۴/۶۳ به ۱1/۱۶ از سال ۱374 تا سال ۱383 رسیده است. (جدول شماره ۱، نمودار شماره ۲)


جدول شماره ۱. میزان مرگ و میر حاصل از سرطان پستان در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال های تحت مطالعه در گروه های سنی

سال	سال<15	سال ۱۵-۴۹	سال >=5۰	میزان های کل
۱۳۷۴	۰/۰۰	۰/۷۴	۴/۶۳	۰/۹۶
۱۳۷۵	۰/۰۳	۱/۰۸	۶/۲۴	۱/۳۶
۱۳۷۶	۰/۰۲	۱/۱۴	۷/۴۷	۱/۵۴
۱۳۷۷	۰/۰۵	۱/۲۰	۶/۲۴	۱/۴۱
۱۳۷۸	۰/۰۶	۱/۴۹	۸/۹۳	۱/۹۱
۱۳۷۹	۰/۰۱	۱/۶۵	۱۰/۵۸	۲/۱۲
۱۳۸۰	۰/۰۰	۱/۸۲	۹/۸۸	۲/۳۸
۱۳۸۱	۰/۰۰	۲/۱۴	۱۱/۸۰	۲/۷۵
۱۳۸۲	۰/۰۰	۲/۱۰	۱۱/۹۰	۲/۷۲
۱۳۸۳	۰/۰۰	۱/۰۸	۱۱/۱۶	۲/۵۸

میزان مرگ و میر بازی هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است



نمودار شماره ۱. روند مرگ و میر کلی به علت ابتلا به سرطان پستان(بازی هر ۱۰۰۰۰۰) طی سال های ۱۳۷۴-۱۳۸۳



نمودار شماره ۲. میزان مرگ و میر ویژه سنی(بازی هر ۱۰۰۰۰۰) به علت ابتلا به سرطان پستان طی سال های ۱۳۷۴-۱۳۸۳

روندي افزايشي بوده،(11)، كه اين روند تا سال 2004
ادame داشته و سپس شروع به کاهش كرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده سازمان بهداشت
جهانی بین سال های 1990 تا 2006 مرگ و میر
حاصل از سرطان پستان در سه کشور آسیایی ژاپن،
هنگ کنگ، و کره از کشور های غربی پایین ترین
میزان را داشته است. در این میان کره نسبت به دیگر
کشورهای آسیایی پایین ترین میزان مرگ و میر به
علت ابتلا به این سرطان را نشان می دهد و انگلستان
نیز در میان کشورهای غربی بیشترین میزان مرگ و
میر به علت ابتلا به این سرطان را نشان می دهد.
میزان مرگ و میر به علت ابتلا به سرطان پستان در
آسیا، ژاپن، و کره روند افزايشي را نشان می دهد، اما
در هنگ کنگ اين روند به صورت کاهشي می باشد.
نتایج اين مطالعه نیز روند افزايشي مشابهی با الگوی
کشورهای آسیایی نشان می دهد. میزان های مرگ در
کره جنوبی از نظر مقدار و روند از سال های 1984 تا
2003 الگوی شبيه داده های مرگ و میر حاصل از
ابتلا به سرطان پستان در ايران دارد.(12)

مطالعه اى در چین نشان می دهد که بین
سال های 2002 تا 2008 میزان مرگ و میر حاصل از
سرطان پستان در بین شهرونشيني 201 درصد افزايش
ياfته است،(13)، و افزايش مشابهی در زنان ژاپنی
گزارش شده است.(20)

ايران در غرب آسيا قرار گرفته است. منطقه اى که
در ان ابتلا به سرطان پستان پر شیوع می باشد،(2). بروز
اين سرطان در ايران رو به افزايش است. بيماري در
مراحل پيشرفته شناسايي می شود و اكثراً بيماران در
مقاييسه با بيماران در کشورهای غربی جوان تر(10)
سال هستند.(14,15)

به نظر می رسد که سرطان پستان زنان در ايران
يک دهه زودتر از کشورهای غربی تحت تاثير قرار
می دهد که ميانگين سنی اين ابتلا بين 47/1 تا 48/8
سال است،(16). و 36 درصد موارد تومور در زنان زير
40 سال مشاهده شده است،(17). تشخيص زودرس
سرطان پستان يکی از عوامل موثر در کاهش موارد
مرگ و میر است،(4,18). در ایالات متحده، مرگ و میر

بحث و نتيجه گيري

بر اساس آخرین بررسی های آماری و
اپیدميولوژيك در ايران، سرطان بعد از بيماري های
قلبی عروقی و حوادث غيرعمدی، سومین
عامل مرگ و میر محسوب می شود، به طوري که
سالانه بيش از 30 هزار نفر از جمعيت ايران در اثر اين
بيماري جان می بازند و تخمين زده می شود سالانه
بيش از 70 هزار مورد جديد سرطان در کشور رخ دهد.
از سویی، انتظار می رود با افزايش اميد به زندگی و
افزايش درصد سالمندی در جمعيت کشور، بروز سرطان
نیز در دهه آينده به شدت افزايش يابد.

امروزه در کشورهایی که از شیوه زندگی غربی
پيروی می کنند در حدود نیمی از مرگ ها به دليل
بيماري های قلبی عروقی و در حدود يك چهارم
مرگ ها نیز به دليل سرطان رخ می دهد و سرطان به
عنوان يك مشكل مهم، بهداشت عمومی را تحت تاثير
خود قرار داده است. در میان سرطان های شایع،
سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان جهان
می باشد،(1). آمارها نشان می دهد که بروز سالانه اين
سرطان در کشورهایی که دارای میزان پایینی از بروز
سرطان پستان بوده اند از جمله ايران در حال افزايش
است.(1,3).

بر مبنای نتایج اين تحقیق، روند مرگ و میر
حاصل از سرطان پستان در ايران در حال افزايش است
و احتمالاً در آينده به يكی از سرطان های شایع در
ايران تبدیل خواهد شد، هر چند در مقایسه با
کشورهای صنعتی و غربی هم چنان کم تر است.(7)
از آغاز دهه 90 ميلادي، میزان های استاندارد
شده سنی مرگ و میر سرطان پستان در زنان در بیشتر
کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است و اين کاهش
در گروه های سنی 36 تا 64 سال مشهودتر است. در
بریتانیا و سویس میزان مرگ و میر سرطان پستان از
سال 1990 تا 2006 به میزان 30 درصد کاهش یافته
است،(8). اما میزان کاهش در شمال، جنوب، و غرب
اروپا بین 15 درصد تا 25 درصد بوده است و در شرق
اروپا میزان کاهش اندک بوده و يا در سطح مشخصی
ثبت باقی مانده است،(9,10). در مقابل روسیه شاهد

مقابل 4-3 برابر است. هم چنین با وجود سابقه قبلی از کارسینوم تخدمان یا رحم، احتمال بروز سرطان در پستان ۴/۱-۳/۱ برابر افزایش می یابد.(22) در ایران برنامه ملی غربالگری سرطان پستان برای کنترل و تشخیص زودهنگام این بیماری وجود ندارد. تشخیص زودرس سرطان پستان کلید اصلی کاهش بار مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان می باشد.(17) در نتیجه برنامه های مشخصی برای غربالگری زنان ایرانی به خصوص برای زنان در گروه های سنی جوان و نیز زنانی که مادر یا خواهر آن ها به ویژه در دوران جوانی سرطان سینه داشته اند و یا زنانی که یکی از سینه های آنان به سرطان مبتلا بوده است توصیه می شود.

سپاسگزاری

برخود لازم می دانیم که مراتب تشکر و قدردانی خود را از کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که امکان انجام این پژوهش را فراهم آورده، بعمل آوریم.

References

- 1-Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005;55:74-108.
- 2-Izquierdo A, Gispert R, Saladié F, Espinás J. Análisis de la incidencia, la supervivencia y la mortalidad según las principales localizaciones tumorales, 1985-2019: cáncer de mama. Med Clin (Barc) 2008; 131:50-2.
- 3-Wilson C, Tobin S, Young R. The exploding worldwide cancer burden: the impact of cancer on women*. Int J Gynecol Cancer 2004;14:1-11.
- 4-Naghavi M, Abolhassani F, Pourmalek F, Lakeh MM, Jafari N, Vaseghi S, et al. The burden of disease and injury in Iran 2003. Popul health metr 2009;7:9.
- 5-djadi A, Nouraie M, Mohagheghi MA, Mousavi-Jarrahi A, Malekezadeh R, Parkin DM. Cancer occurrence in Iran in 2002, an international perspective. Asian Pac J cancer prev 2005;6:359-63.
- 6-Matsuda A, Matsuda T, Shibata A, Kataoda K, Sobue T, Nishimoto H. Cancer Incidence and Incidence Rates in Japan in 2007: A Study of 21 Population-based

حاصل از این سلطان در حال کاهش است که به علت اصلی آن استفاده وسیع و روز افرون از ماموگرافی و نیز بهبود و توسعه روش های درمانی است،(5) این کاهش مرگ در کشورهای غربی در گروه زنان جوان مشهودتر بوده است.(19,20)

در کشور کره با انجام برنامه غربالگری سرطان پستان نشان می دهد که در سال 2002 بقای 5 ساله بیماران مبتلا در مقایسه با دده 90 میلادی در حدود 90 درصد افزایش یافته است و نشان داده شده که اجرای غربالگری تاثیر موثری در کاهش میزان مرگ و میر این بیماری دارد.(21)

نقش فاکتورهای ارشی و ژنتیکی به عنوان عوامل مستعد کننده در ابتلا به سرطان پستان تایید شده است. یک سوم از کل مبتلایان، دارای سابقه مثبت وقوع کنسر پستان در یک نفر یا تعداد بیشتری از واپستگان درجه اول یا دوم خود هستند. در افرادی که خواهر یا مادر مبتلا به سرطان پستان داشته اند، ریسک ابتلا 4 برابر است. و نیز در زنانی که سابقه مثبت قبلی از بروز سرطان پستان دارند، ریسک ابتلای پستان سمت

Cancer Registries for the Monitoring of Cancer Incidence in Japan (MCIJ) Project. Jpn J Clin Oncol 2013;43:328-36.

7-Parrish KM, Higuchi S, Lucas LJ. Increased alcohol-related oesophageal cancer mortality rates in Japanese men. Int J Epidemiol 1993;22:600-5.

8-Islami F, Kamangar F, Nasrollahzadeh D, Møller H, Boffetta P, Malekzadeh R. Oesophageal cancer in Golestan Province, a high-incidence area in northern Iran-a review. Eur J Cancer 2009;45:3156-65.

9-Islami F, Kamangar F, Nasrollahzadeh D, Aghcheli K, Sotoudeh M, Abedi-Ardekani B, et al. Socio-economic status and oesophageal cancer: results from a population-based case-control study in a high-risk area. Int J Epidemiol 2009;38:978-88.

10-Islami F, Pourshams A, Nasrollahzadeh D, Kamangar F, Fahimi S, Shakeri R, et al. Tea drinking habits and oesophageal cancer in a high risk area in northern Iran: population based case-control study. BMJ 2009; 338:b929.

11-Bray F, Guilloux A, Sankila R, Parkin DM. Practical implications of imposing a

- new world standard population. *Cancer Causes Control* 2002;13:175-82.
- 12-Hoerger TJ, Ekwueme DU, Miller JW, Uzunangelov V, Hall IJ, Segel J, et al. Estimated effects of the national breast and cervical cancer early detection program on breast cancer mortality. *Am J Prev Med* 2011;40:397-404.
- 13-Mohagheghi MA, Mosavi-Jarrahi A, Malekzadeh R, Parkin M. Cancer Incidence in Tehran Metropolis: The First Report from the Tehran Population-Based Cancer Registry. *Arch Iran Med* 2009;12:15-23.
- 14-Hery C, Ferlay J, Boniol M, Autier P. Quantification of changes in breast cancer incidence and mortality since 1990 in 35 countries with Caucasian-majority populations. *Ann Oncol* 2008;19:1187-94.
- 15-Katanoda K, Yako-Suketomo H. Comparison of time trends in stomach cancer incidence (1973–2002) in Asia, from Cancer Incidence in Five Continents, Vols IV-IX. *Jpn J Clin Oncol* 2009;39:71-2.
- 16-Hirte L, Nolte E, Bain C, McKee M. Breast cancer mortality in Russia and Ukraine 1963–2002: an age-period-cohort analysis. *Int J Epidemiol* 2007;36:900-6.
- 17-Choi Y, Kim Y, Park SK, Shin HR, Yoo KY. Age-period-cohort analysis of female Breast Cancer mortality in Korea. *Breast Cancer* 2006;13:266-71.
- 18-Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. *Ann Oncol* 2009;20:556-63.
- 19-Bulliard J, La Vecchia C, Levi F. Diverging trends in breast cancer mortality within Switzerland. *Ann Oncol* 2006;17:57-9.
- 20-Harirchi I, Karbakhsh M, Kashefi A, Momtahen AJ. Breast cancer in Iran: results of a multi-center study. *Asian Pac J Cancer Prev* 2004;5:24-7.
- 21-Fracheboud J, Otto S, Van Dijck J, Broeders M, Verbeek A, De Koning H. Decreased rates of advanced breast cancer due to mammography screening in The Netherlands. *Br J Cancer* 2004;31:91:861-7.
- 22-Kelsey JL. A review of the epidemiology of human breast cancer. *Epidemiol Rev* 1979;1:74-109.



Trend Analysis of Breast Cancer Mortality in Iranian women

Fazeli Z¹, Fazeli Bavand Pour FS², Abadi A.R³, Pourhoseingholi M.A^{2*}, Akbari A⁴, Salimian J⁵

(Received: 9 Nov. 2012)

Accepted: 14 Feb. 2013)

Abstract

Introduction: Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers among women worldwide. The aim of this study was to present the mortality trends from breast cancer among Iranian women from 1995 to 2004.

Materials & Methods: We analyzed the National breast cancer death Statistic reported by the Iranian Ministry of Health and Medical Education from 1995 to 2004. Breast cancer was expressed as the annual mortality rates/100,000 and assorted by age and sex groups.

Findings: The age standardized mortality rate of breast cancer increased dramatically, however it seems that the rate would be leveled off from 2002 to 2004.

Discussion & Conclusion: There was an increasing trend for breast cancer mortality in Iran. Thus, a health education program would be necessary to enhance the knowledge of women about breast cancer signs and effectively screened the disease.

Keywords: breast cancer; mortality; Iran

1. Proteomics Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2. Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. Dept of Biostatistics, Faculty of Paramedical Science, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4. Dept of Immunology, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

5. Microbiology Research Center, Baghyatollah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*(correspondence author)