

## بررسی تأثیر ماساژ بر میزان شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بیماران تحت همودیالیز

مختار یعقوبی<sup>۱\*</sup>، کوروش امینی<sup>۲</sup>، محمد فتحی<sup>۳</sup>، فضل الله احمدی<sup>۴</sup>، عیسیٰ محمدی<sup>۴</sup>، قادر صالح نژاد<sup>۴</sup>

(۱) گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

(۲) گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

(۳) گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ پذیرش: ۸۷/۴/۲۹

تاریخ دریافت: ۸۶/۳/۹

### چکیده

**مقدمه:** درد ناشی از کرامپ عضلانی یکی از مشکلات و عوارض حین دیالیز در بیماران تحت همودیالیز می‌باشد. بکی از علل بروز آن ایسکمی اندام است، ولی علت اصلی آن ناشناخته مانده است. ماساژ از دیر باز برای تسکین درد و تن آرامی مورد استفاده قرار می‌گرفته است و هدف ما از این مطالعه تعیین تأثیر ماساژ در پیشگیری و تسکین شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بیماران تحت همودیالیز بود.

**مواد و روش‌ها:** مطالعه فوق نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی و مبتنی بر هدف می‌باشد که طی آن 40 بیمار که کرامپ‌های مکرر در حین دیالیز داشتند انتخاب گردیدند و قبل و بعد از انجام ماساژ شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی بیماران جمع‌آوری و ثبت گردید. و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS win استفاده گردید. به منظور مقایسه میانگین‌ها، از آمار توصیفی و آزمون آماری تی زوجی و تاثیر متغیرهای مداخله گر از آنالیز رگرسیون خطی استفاده شد.

**یافته‌های پژوهش:** تکرار و شدت کرامپ‌ها در بیماران تحت همودیالیز به طور معنی داری کاهش پیدا نمود ( $P < 0.001$ ). میانگین شدت درد قبل از مداخله 8/73 بود که بعد از مداخله به 1/70 رسید و در 19 نفر (47/5 درصد) کرامپ بعد از مداخله مشاهده نگردید و در 21 نفر (52/5 درصد) کرامپ‌ها با شدت کمتری نسبت به قبل از مداخله بروز نمود.

**بحث و نتیجه گیری:** ماساژ در بیماران تحت همودیالیز یک روش غیر دارویی است که قادر هرگونه عوارضی جانبی بوده، که باعث پیشگیری و کاهش شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی می‌شود.

**واژه‌های کلیدی:** همودیالیز، ماساژ، کرامپ عضلانی

\*نویسنده مسئول: گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان



## مقدمه

حین همودیالیز داشتند با هم مقایسه گردید و نتایج نشان داد که اثر هر سه دارو مشابه می‌باشد(8). از آنجایی که اکثر روش‌های مورد استفاده دارویی بوده و بیشتر متابولیت‌های دارویی از طریق کلیه‌ها دفع می‌شوند استفاده از این شیوه‌ها احتمال مسمومیت دارویی را افزایش می‌دهد. از روش‌های غیر دارویی پیشگیری و تسکین درد ماساژ می‌باشد که با کاهش حساسیت و سفتی عضله و بهبود وضعیت جریان خون باعث رهایی از درد و خستگی می‌گردد(10,9).

همچنین ماساژ از طریق مسدود نمودن ایمپالس‌ها به مغز و ترشح آندروفین‌ها باعث کاهش درد می‌شود، از اثرات دیگر آن کاهش ادم اندام می‌باشد(11). مطالعات تاثیر ماساژ و لمس درمانی را در ایجاد آرام‌سازی و کاهش رفتارهای هیجانی مورد تاکید قرار داده اند(12). بررسی‌های دیگر نشان دادند ماساژ درمانی هورمون‌های استرس را کاهش می‌دهد(13). ماساژ ملایم باعث می‌شود بیماران احساس خود را راحت تر بیان کنند، لذا این روش امکان مشاوره با بیمار مبتلا به درد‌های فیزیکی، اجتماعی و روانی را آسانتر می‌سازد و در واقع موجب افکار سازنده مثبت راجع به زندگی می‌شود(14). در کل اثرات ماساژ را می‌توان در چهار زمینه اثر بر گردش خون، جریان لف، اسپاسم عضلانی و ترشح اندورفین درون زاد مطرح نمود(15). این تحقیق به منظور تعیین تأثیر ماساژ در پیشگیری و کاهش شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بیماران تحت همودیالیز انجام گردید.

## مواد و روش‌ها

این مطالعه نیمه تجربی از نوع کار آزمایی بالینی است که با هدف تعیین تأثیر ماساژ بر پیشگیری و کاهش شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان توحید سنتنج انجام شد. به طور متوسط هفته‌ای 100 بیمار همودیالیزی به بخش دیالیز بیمارستان توحید سنتنج مراجعه کرده و دیالیز می‌شوند. روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس و مبتنی بر هدف بود. شرط ورود به مطالعه این بود که: بیماران حداقل یکبار در هفته دچار کرامپ و دوبار در هفته دیالیز شده و شش ماه از شروع دیالیز آن‌ها گذشته و طی مطالعه

کرامپ عضلانی یکی از عوارض حین دیالیز می‌باشد که به طور حتم در 5 تا 20 درصد بیماران بروز می‌نماید(1). بیشترین علل بروز کرامپ هیپوتانسیون، هیپوناترمی و از دست دادن وزن خشک می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که ایسکمی اندام در طی فیلتراسیون از علل بوجود آورنده کرامپ می‌باشد(2). هیپوناترمی باعث انقباض عروق و کاهش خونرسانی به عضلات گردیده و در پاسخ به ایسکمی، عوامل محرك درد مثل هیستامین و برادی کینین ترشح و باعث درد اندام به صورت کرامپ می‌گردد(2) و این گرفتگی در دنای عضلات اغلب موارد همودیالیز را پیچیده‌تر می‌کند(3) و در عین حال مکانیسم دقیق آن مشخص نیست(4). این عارضه موجب بروز مشکلات جسمی و روانی در بیماران شده و به همین دلیل کنترل این عارضه از اهداف مهم درمان و مراقبت محسوب می‌شود. برای درمان کرامپ در بیماران تحت همودیالیز استراتژی‌های دارویی و غیر دارویی وجود دارد. بیشتر روش‌های موجود بر مبنای استراتژی دارویی است. در مطالعه‌ای اثر ویتامین C، ترکیب ویتامین (E و C) و پلاسبو با هم مقایسه شد و نتایج به ترتیب 54 درصد، 61 درصد، 97 درصد، 7 درصد کاهش معنی‌داری در میزان کرامپ بیماران تحت همودیالیز نشان داد(5). در مطالعه دیگر اثر هیدروکینین و پلاسبو بر روی کرامپ با هم مقایسه شد و در 95 درصد افرادی که هیدروکینین دریافت کرده بودند کرامپ کمتر از روزهای قبل بروز نمود(4). همچنین اثر کراتین منوهیدرات را بر روی 10 بیمار مبتلا به کرامپ مطالعه کرده و دیدند که کراتین منوهیدرات کرامپ‌ها را به میزان 60 درصد کاهش می‌دهد(3). در بررسی دیگری اثر همودیالیز و هموفیلتراسیون پر دیلوشن با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بیمارانی که تحت هموفیلتراسیون بوده‌اند کرامپ‌های عضلانی کمتری نسبت به همودیالیز داشته‌اند(6). در یک مطالعه، داروی گیاهی شاکو یاکو کانزو- تو(Shakuyaku-kanzo-to) در 88/5 درصد نمونه‌ها کاهش کرامپ را نشان داد(7). اثر دکستروز 50 درصد، مانیتول 25 درصد و سالین 23/5 درصد بر روی 24 بیمار که کرامپ عضلانی

نحوه انجام ماساژ؛ بعد از مشاوره علمی با یک فیزیوتراپ و یک متخصص طب فیزیکی و استفاده از منابع و اینترنت ماساژ نوع فلوراژ استفاده گردید(11,12,24,25). بسته به ناحیه درمان مثلاً قدم و خلف ساعد و پاها، انگشتان دست به شکل C دور انداز قرار گرفته و این مانور در منطقه کم وسعت به شکل V انجام شد و هنگام ماساژ از ژل لوبریکانت(به عنوان مديا) برای تاثیر بهتر ماساژ و لغزنندگی موضع استفاده گردید. چون در اغلب موارد کرامپ در بیماران دیالیزی در عضلات کف دست، داخل ران و عضلات پشت پا شایع است ما این نواحی را جهت انجام ماساژ انتخاب کردیم. مدت زمان ماساژ 5 دقیقه بود و در جلسات بعد بر حسب تحمل بیمار نهایتاً به 15 دقیقه رسید. یعنی به مدت 15 دقیقه قبل از دیالیز، اواسط دیالیز و نیم ساعت پایانی دیالیز که اغلب کرامپ‌ها در این زمان بروز می‌نماید ماساژ انجام شد. و بعد از انجام ماساژ در هر جلسه شدت درد اندازه‌گیری گردید. ماساژ به مدت دو هفته انجام و در پایان میانگین شدت و دفعات کرامپ ثبت و با مقادیر قبل از مداخله مقایسه گردید.

از نرم افزار آماری SPSS win 16 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. از آمار توصیفی برای فراوانی و مقایسه میانگین‌ها چون داده‌ها بر اساس تست کولموگروف اسمیرنوف از توزیع نرمال برخوردار بودند از آزمون آماری Paired T-test و ارتباط بین دور پمپ، TMP، فشار خون و تغییرات وزن با شدت درد و تعداد دفعات کرامپ از آنالیز رگرسیون خطی استفاده شد.

#### یافته‌های پژوهش

22 نفر(55 درصد) از بیماران مذکور و 18 نفر(45 درصد) مؤنث بودند. سن تمام آنها بین 30-70 سال بود. 32 نفر(80 درصد) از بیماران متأهل بوده و 27 نفر(67/5 درصد) از آنها با سواد، 13 نفر(32/5 درصد) بی‌سواد و 21 نفر(42/5 درصد) شاغل بودند. قبل از مداخله، میانگین تغییرات وزن(قبل و بعد از همودیالیز) 2/15 کیلوگرم و بعد از مداخله 1 کیلوگرم بود که آزمون آماری تی زوجی اختلاف معنی‌داری را بین این تغییرات نشان نداد. میانگین فشار دو طرف غشای صافی دیالیز TMP قبل از مداخله 166/63 بود.

کاندید پیوند کلیه نبوده و سابقه دیابت، مصرف سیگار و الکل نداشته باشند. 40 نفر از بیماران که درد کرامپ عضلانی را تجربه و بیتمین E و C را حین دیالیز مصرف ننموده و تمایل به شرکت در پژوهش را داشته و سایر شرایط ورود به مطالعه را داشتند در پائیز 1384 انتخاب گردیدند.

ابزار جمع آوری اطلاعات در طرح حاضر شامل:

- ۱-پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست متغیرهای مداخله‌گر که شامل (فسارخون بیماران، دور پمپ، میزان TMP، وزن قبل و بعد از دیالیز، میزان جریان مایع دیالیز، درجه حرارت مایع، نوع مایع دیالیز، غذا خوردن حین دیالیز)
- ۲-مقیاس عددی numeric شدت درد دیالیز (0-10) بود. مقیاس عددی شدت درد یک ابزار استاندارد و معتبر بوده و در کشورهای مختلف بر روی گروه‌ها و انواع مختلف درد به کار گرفته شده و محققان مختلف از جمله چانگ 2002، جانسن 1997، خواجه دهی 1997 و نیکسون 2001 و غیره ... برای بررسی شدت درد ناشی از کرامپ از این مقیاس استفاده کرده‌اند(4.3.18)

است. جهت پایابی این مقیاس ابتدا ابزار توسط ده نفر از نمونه‌ها به کار گرفته شده و سپس بعد از یک هفته این ارزیابی تکرار گردید. پایابی این مقیاس در گروه مطالعه با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین دو مرحله ارزیابی با  $r = 0.96$  به دست آمد. کنترل متغیرها بین صورت بود که قبل و بعد از مداخله درجه حرارت مایع دیالیز 37 درجه سانتیگراد، میزان جریان مایع دیالیز نیم لیتر در دقیقه و از یک نوع صافی استفاده می‌شد و تمام بیماران قبل و بعد از مداخله حین دیالیز غذا صرف می‌نمودند و دور پمپ و TMP از اعداد مشابهی قبل و بعد از مداخله استفاده گردید. درجه حرارت محیط، وضعیت روحی روانی، جنس و سن نمونه‌ها متغیرهای غیر قابل کنترل و جزء محدودیت‌های پژوهش بودند.

تکنیک کار؛ بعد از اخذ رضایت‌نامه و توجیه بیماران برای شرکت در مطالعه، قبل از مداخله(ماساژ) ارزیابی اولیه یا پیش تست به مدت دو هفته انجام شدودر طی این مرحله پس از تکمیل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، شدت درد و دفعات کرامپ عضلانی ثبت و جمع آوری گردید.

کاهش پیدا نمود( $P<0.001$ )(نمودار شماره ۱). کرامپ عضلانی به طور متوسط در ۵ تا ۲۰ درصد جلسات همودیالیز بروز می نماید، در مرکزی که این مطالعه انجام شد حدود ۴۰ درصد مراجعه کنندگان از این عارضه رنج می بردند. با توجه به معیارهای انتخاب افراد برای مطالعه که حداقل بایستی یکبار کرامپ عضلانی را تجربه کرده باشند، حدود ۴۰ درصد این بیماران وارد مطالعه شدند. قبل از مداخله در ۱۲ نفر(30درصد) از بیماران یکبار، ۲۳ نفر(57درصد) دوبار و ۵ نفر(5/12درصد) سه بار کرامپ مشاهده شد. بعد از مداخله در ۱۹ نفر(5/47درصد) کرامپ مشاهده نشد و در ۲۱ نفر(5/52درصد) یکبار بروز کرد. میانگین دفعات کرامپ قبل از مداخله ۱/83 و بعد از مداخله به ۰/53 کاهش پیدا کرد.

قبل از مداخله، شدت درد ناشی از کرامپ با استفاده از مقیاس عددی(۰ - ۱۰) در ۱ نفر(2/5درصد) شش، ۱ نفر(5/2درصد) هفت، ۲۰ نفر(50درصد) هشت، ۴ نفر(10درصد) نه و در ۱۴ نفر(35درصد) ده بود. بعد از مداخله در ۱۹ نفر (47/5درصد) دیگر کرامپ مشاهده نشد و شدت درد صفر بود، در ۷ نفر(5/17درصد) شدت درد دو، ۵ نفر(5/12درصد) سه، ۷ نفر(5/17درصد) چهار، ۱ نفر(5/2درصد) ۵ و در ۱ نفر(5/2درصد) شش بود.

دکتر خواجه دهی و همکارانش(2001)، تأثیر ویتامین C و ترکیب آنها را در پیشگیری از کرامپ عضلانی بررسی نمودند و نتایج این بررسی نشان داد که میزان کرامپ عضلانی در بیمارانی که ترکیب ویتامین C و E را دریافت می کردند ۹۷ درصد کاهش یافت. ولی ویتامین E، C به تنها ی به ترتیب به میزان ۵۴ درصد و ۶۱ درصد باعث کاهش کرامپ شدند. از عوارض درمان با ویتامین C افزایش اگزالت، تشکیل سنگهای اداری و تخریب کلیه می باشد(5). اما ماساژ در پیشگیری از بروز کرامپ ۱۰۰ درصد تأثیر داشته و در بیمارانی که از بروز کرامپ پیشگیری نکرده بود، شدت درد را تقلیل داد. در تحقیق دیگری که توسط آقای هایدو و همکارانش(2002) انجام گرفت، داروی گیاهی شاکو یاکو کانزو-تو جهت تسکین درد ناشی از کرامپ در زمان بروز کرامپ تزریق گردید. این گیاه در ۸۸/۵ درصد از بیماران مؤثر

و بعد از مداخله ۱۶۴/۷۵ میلیمتر جیوه رسید و آزمون آماری تی زوجی با  $P<0/05$  اختلاف معنی داری را بین TMP قبل و بعد از مداخله نشان داد. میانگین دور پمپ قبل از مداخله ۲۱۵/۳۸ و بعد از مداخله ۲۱۷/۲۵ بود و آزمون آماری تی زوجی اختلاف معنی داری را در قبل و بعد از مداخله نشان داد( $P<0/05$ ) (جدول شماره ۱). متغیر اصلی این پژوهش کرامپ عضلانی است که میانگین تعداد کرامپ قبل از مداخله ۱/83 و بعد از مداخله ۰/53 بود و آزمون آماری تی زوجی اختلاف معنی داری را بین تعداد دفعات کرامپ در قبل و بعد از مداخله نشان داد( $P<0/001$ ) (نمودار شماره ۱). متغیر بعدی شدت درد ناشی از کرامپ بود که میانگین شدت درد قبل از مداخله ۸/۷۳ و بعد از مداخله ۱/۷۰ بود و آزمون آماری تی زوجی اختلاف معنی داری را بین میانگین شدت درد قبل و بعد از مداخله نشان داد( $P<0/001$ ). آزمون آماری رگرسیون خطی بین متغیرهای TMP، فشار خون، وزن و دور پمپ) با ماساژ P-value آنها به ترتیب(0/72، 0/16، 0/16، 0/99) بود.

## بحث و نتیجه گیری

نتایج مطالعات نشان می دهد که متغیرهایی نظیر TMP، دور پمپ، فشار خون و وزن در بروز کرامپ های عضلانی مؤثر هستند(16). در این مطالعه بین میانگین های متغیر ها در قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی داری وجود داشته است(جدول شماره ۱). این تفاوت معنی دار می تواند در نتیجه گیری تأثیر مداخله تردید ایجاد کند، اما آزمون آنالیز رگرسیون خطی بین TMP، دور پمپ، فشار خون و وزن با شدت درد حین دیالیز تفاوت معنی داری را نشان نداد و از سوی دیگر این مقدار اختلاف دور پمپ و TMP از نظر علمی قبل و بعد از مداخله قابل اغماض است، بنابراین می توان گفت که متغیرهای تاثیر گذار در کاهش کرامپ تأثیری نداشته است. ضمناً بقیه متغیرهای مداخله گر به طوری که در روش بررسی توضیح داده شد همگن بودند. هدف ویژه این پژوهش تعیین و مقایسه تعداد دفعات و شدت کرامپ های عضلانی در قبل و بعد از انجام ماساژ بود که میانگین شدت درد و تعداد دفعات به ترتیب ۸/۷۳ و ۱/۸۳ و بعد از مداخله ۱/۷۰ و ۰/۵۳ بود که بطور معنی داری

می گردد(20). مطالعه ای اثر ماساژ را بر اضطراب و درد مبتلا به سرطان بررسی نمود و نتایج نشان داد که ماساژ باعث احساس آرامش و کاهش درد می شود(21).

در مطالعه دیگری اثر ماساژ بر میزان درد و اضطراب در طول دوره زایمان انجام گردید و مشخص شد که ماساژ در طول زایمان درد را برطرف نموده و حمایت روانی ایجاد می کند(22). تیفانی(2006) نشان داد درد ناشی از آرتربیت و به دنبال آن اضطراب و افسردگی ناشی از آن به وسیله ماساژ یافت(23). در تحقیقی دیگر تاثیر ماساژ را در بیمارانی که لاپاراسکوپی شده بودند بررسی و نتایج نشان داد که بیماران دریافت کننده ماساژ دارای خلق بهتر، اضطراب و درد کمتر، احساس رضایت و راحتی بیشتری هستند(24). تاثیر ماساژ بر درد پس از عمل جراحی نشان داد که ماساژ در کاهش شدت درد بیماران موثر بوده است(25) ماساژ فیبرهای عصبی قطور را فعال می کند و باعث بسته شدن دروازه درد شده و مانع انتقال درد می شود و این کاهش درد بر اساس نظریه دریچه ای کنترل درد استوار است(26) نتیجه می گیریم که اثرات ماساژ بر کاهش درد دارای ابعاد مختلف می باشد.

نتایج تحقیقات فوق فرضیه ما را درباره تاثیر ماساژ بر کاهش شدت درد ناشی از کرامپ عضلانی اثبات می نماید.

همان گونه که ذکر گردید تفاوت های بین نتایج ما و مطالعات دیگران مشاهده می گردد که احتمالاً این تفاوت به دلیل تفاوت در طول دوره ماساژ و ابزار اندازه گیری شدت درد بوده و اینکه درد پدیده ذهنی است و در افراد مختلف به میزان مختلف مطرح می شود هر چند که با استفاده از ابزار در صدد کاهش ذهنی بودن این پدیده هستیم. پیشنهاد می شود که تاثیر ماساژ بر روی طیف وسیعتری از بیماران دیالیزی انجام گیرد تا اثر قطعی ماساژ در پیشگیری و تسکین کرامپ مشخص گردد.

### تشکر و سپاسگزاری

با تشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که هرزینه این طرح را تقبل نمودند.


بود و درد بین 3/9 الی 5/3 دقیقه بعد از تزریق داروی گیاهی از بین می رفت(7). اما ماساژ در 47/5 درصد بیماران باعث پیشگیری از کرامپ شد و در 52/5 درصد بیماران کرامپ ها با شدت کمتری ظاهر شدند. در حالی که در تحقیق انجام شده توسط آقای هایودو و همکارانش، دارو در زمان بروز کرامپ تزریق می گردد و بیمار درد شدیدی را تجربه می نمود. چانگ و همکارانش(2002) اثر کراتین منوهیدرات را برتسکین درد ناشی از کرامپ را بررسی، و نتایج نشان داد که میزان کرامپ عضلانی در 60 درصد از بیماران کاهش یافت(3).

بازیل و همکارانش (2001) در ایتالیا تاثیر سیستم همو کنترل بیو فیدبک را در درمان همودیالیز بررسی و نتایج نشان داد که عوارض عالمتی هیبوتانسیون و کرامپ های عضلانی با کمک بیوفیبدبک کاهش می یابد(17). تحقیقی اثر دوز کم پرازوسین را بر روی کاهش و تسکین کرامپ ها انجام داد و نتایج کاهش 58 درصدی را نشان داد(18). از عوارض پرازوسین افت فشار خون وضعیتی می باشد که مداخلات درمانی را ایجاد می کند(19). ولی ماساژ یک روش غیر دارویی می باشد که عوارضی به همراه ندارد. کانزانلو و همکارانش(1991) اثربخشی سرم های دکستروز 5 درصد، مانیتول 25 درصد و سالین 23/5 درصد را در درمان کرامپ های عضلانی بیماران همودیالیزی طی یک بررسی مقایسه کردند. نتایج نشان داد که اثر سرم های دکستروز، مانیتول و نرمال سالین در کاهش و تسکین کرامپ مشابه می باشد. و از عوارض این روش افزایش قند خون و سدیم است و در بیمارانی که دیابت داشته باشند قابل توجه است. همچنین سدیم باعث افزایش تشنجی بیماران همودیالیزی می شود که محدودیت مصرف مایعات داردند(8). در حالی که ماساژ باعث جا به جایی بهتر مایعات و کاهش فشار خون، لرز، کرامپ عضلانی و کوفتنگی بعداز دیالیز می شود. بسته شدن رگ ها در محیط اطراف فاشیای عضلات و تجمع متabolit ها باعث بروز کرامپ شده، بدنبال آن باعث سردی و بی تحرک شدن ماهیچه ها در طول همودیالیز و کمبود اکسیژن در سیستم ماهیچه ای شده و درد ایجاد می گردد. بنابراین ماساژ از سرد شدن ماهیچه ها پیشگیری و با افزایش جریان خون باعث پاک شدن متabolit ها از عضله گردیده و درد برطرف

جدول شماره ۱. میانگین و انحراف معیار متغیرهای تأثیرگذار بر روی کرامپ عضلانی قبل و بعد از مداخله در بیماران تحت همودیالیز

P.Value	بعد		قبل		متغیرها
	S.D (Std.Deviation)	$\bar{X}$	S.D (Std.Deviation)	$\bar{X}$	
0/66	7/03	67/34	7/060	69/38	تغییرات وزن
0/027	29/46	164/75	31/08	166/63	TMP
0/009	16/64	217/25	17/52	215/38	دور پمپ

نمودار شماره ۱. میانگین دفعات و شدت درد کرامپ قبل و بعد از مداخله در بیماران تحت همودیالیز



## References

- 1-Dugirads S. Handbook of dialysis . New York: Lippincott ۲۰۰۱؛ ۲۲۰-۳۱.
- 2-Choudhury D, Michelcher B, Frnnelly P, Levi M. Nero-infrared spectroscopy: evaluation of lower limb ischemia in hemodialysis patients. *J Vascul Tecno* ۱۹۹۹؛ ۲۲: ۲۱-۲۳.
- 3-Chang CT, Yang CW, Huang JY. Creatine monohydrate treatment alleviates muscle cramps associated with hemodialysis. *Neph Dial Trans* ۲۰۰۲؛ ۱۷(۱): ۱۹۷۸-۸۱.
- 4-Jansen PH, Veenhuizen KC, wesseling AI, Boo T, Verbeek AL. Randomized controlled trial of hydroquinine in muscle cramps. *Lancet* ۱۹۹۷؛ ۳۴۹(۹۰۶۱): ۵۲۸-۲۲.
- 5-Khajehdehi p, Mojerlou M, Behzadi S, Rais – Jalali GA.A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of supplementary vitamins E, C and their combination for treatment of hemodialysis cramps. *Nephrol Dial Transplant* ۲۰۰۱؛ ۱۶(V): ۱۴۴۸-۵۱.
- 6-Altieri P , Sorba G, Bolasco P, et al. Predilution haemofiltration—the Second Sardinian Multicentre Study: comparisons between haemofiltration and hemodialysis during identical Kt/V and session times in a long-term cross-over study. *Nephrol Dial Transplant* ۲۰۰۱؛ ۱۶(۶): ۱۲۰۷-۱۳.
- 7-Hyodo T, Taira T, Kumakura M, Yamamoto S, Yoshida K, Uchida T. The immediate effect of Shakuyaku-kanzo-to, traditional Japanese herbal medicine, for muscular cramps during maintenance hemodialysis. *Nephron Clin Pract* ۲۰۰۶؛ ۱۰۶(۱): ۲۸-۳۲.
- 8-Canzanello VJ, Hylander-Rossner B, Sands RE, Morgan TM, Jordan J, Burkart JM. Comparison of ۰.۵% dextrose water, ۲۰% mannitol, and ۲۳.۰% saline for the treatment of hemodialysis-associated muscle cramps. *Asaio Trans* ۱۹۹۱؛ ۳۷(۴): ۶۴۹-۶۵۲.
- 9-Graham J. Research review: the effect of acupressure with massage on fatigue and depression in patients with end-stage renal disease. *Geriatric Nursing* ۲۰۰۵؛ ۲۶(۳): ۱۶۴-۱۶۰.
- 10-Paul J, Fons G, Baziel V. Diagnosis and Differential Diagnosis of Muscle Cramps: A Clinical Approach. *Jour of Clin Neur Dis* ۲۰۰۲؛ ۴(۲): ۸۹-۹۴.
- 11-Field TM. Massage therapy effects. *The Am Psychol*. ۱۹۹۸؛ ۵۳(۱۲): ۱۲۷۰-۸۱.
- 12-Synder M. Efficacy of hand massage in decreasing behaviors associated with activites in people with dementia. *Geriatric Nursing* ۱۹۹۰؛ ۱۱(۲): ۶۰-۳۰.
- 13-Kim MS, Cho KS, Woo HM, Kim JH. Effects of hand massage on anxiety in cataract surgery using local anesthesia. *Jour of Cata & Refr Surg* ۲۰۰۱؛ ۲۷(۱): ۸۸۴-۹۰.
- 14-Taal LA, Faber AW, Loey NE, Reynders CL, Hofland HW. The abbreviated burn specific pain anxiety scale: a multicentre study. *Burns* ۱۹۹۹؛ ۲۵(۱): ۴۹۳-۷.
- 15-Tim A, Denise M, Walch S, Hann D, Whedon M, Dain B, Julia E. Massage therapy for patients undergoing autologous bone marrow transplantation. *Jour of Pain and Symp Manag* ۱۹۹۹؛ ۱۸(۴): ۱۰۷-۱۲.
- 16-Gray R J, Sacks D, Martin L G Trerotola S O. Reporting Standards for Percutaneous Interventions in Dialysis Access. *J Vasc Interv Radiol* ۲۰۰۳؛ ۱۴(۴): ۴۳۳- ۴۴۲.
- 17-Basile C, Giordano R , Vernaglione L , Montanaro A, De Maio P, De padova F, et al . Efficacy and safety of haemodialysis treatment with the Hemocontrol TM biofeedback system: a prospective medium-term study. *Nephrol Dial Transplant* ۲۰۰۱؛ ۱۶(۲): ۳۲۸-۳۴.
- 18-Sidhom O, Odeh Y, Kramlovsky F, Budris W, Wang Z, Pospisil P, Atkinson A. Low-dose prazosin in patients with muscle cramps during haemodialysis. *Clin pharmaco Ther* ۱۹۹۴؛ ۵۶(۴): ۴۴۰-۴۶۱.
- 19-Sidhom O, Odeh Y, Krumlovsky, Budris W, Wang Z, Peter A . Low-dose prazosin in patients with muscle cramps during hemodialysis. *Clinical Pharmacology and Therapeutics* ۱۹۹۴؛ ۵۶(۱۰۹): ۴۴۵-۴۵۱
- 20-Santoro A, Mancini E, Paolini F, Cavicchioli G, Bosetto A, Zucchelli P. Blood volume regulation during hemodialysis. *Am J Kidney Dis* ۱۹۹۸؛ ۳۲(۵): ۷۳۹-۴۸.
- 21-Susie M, Sharon B, Alex M, Maureen a, Caroline C, Cargill a, Young T. Effectiveness of aromatherapy massage in the management of anxiety and depression in Patients with Cancer: A Multicenter Randomized Controlled Trial. *Am Soci of Clin Onco* ۲۰۰۷؛ ۲۵(۵): ۵۳۲-۵۹.

- ۲۲-Field T, Figueiredo B, Hernandez M, Diego M, Deeds O, Ascencio A. Massage therapy reduces pain in pregnant women, alleviates prenatal depression in both parents and improves their relationships. Jour of Body and Move Therap ۲۰۰۸; ۱۲(۲): ۱۴۶-۱۵۰.
- ۲۳-Field T, Diego M, Hernandez M, Shea J. Hand arthritis pain is reduced by massage therapy. Jour of Body and Move Therap ۲۰۰۷; ۱۱(۱): ۲۱-۲۴.
- ۲۴-Hulme J, Waterman H, Hillier V. The effect of foot massage on patients' perception of care following laparoscopic sterilization as day case patients. J of Adva Nurs ۱۹۹۹; ۳۰(۲): ۴۶۰-۷.
- ۲۵-Nixon m ,Teschendorff J, Finney J, Karnilowicz W. Expanding the nursing repertory. The effect of massage on post-operative pain. Aust J Adv Nurs ۱۹۹۷; ۱۴(۳): ۲۱-۶.
- ۲۶-Debra B, Teresa A, Miaskowski C, Adams J, Judith A, Laferriere D, Bookbinder M. A ۱۰-year review of quality improvement monitoring in pain management: Recommendations for standardized outcome measure. Pain Manage Nurs ۲۰۰۲; ۳(۴): ۱۱۶-۱۳۰.



## Effects of Massage on Pain Due to Cramp Muscle During Hemodialysis

Yaghoobi M.<sup>\*1</sup>, Amini K.<sup>2</sup>, Fathi M.<sup>1</sup>, Ahmadi F.<sup>3</sup>, Mohamadi I.<sup>3</sup>, Salehnejad Gh<sup>1</sup>

(Received: 29 May, 2007

Accepted: 19 Jul, 2008)

### Abstract

**Introduction:** Muscle cramp is a common complication during hemodialysis. Organ ischemia during hemodialysis is held to be a cause for that pain. Massage has been used as a factor of pain palliative and relaxation, since the past. Our aim was to determine the effects of massage on prevention or relief of frequency and intensity of hemodialysis cramps.

**Materials and Methods:** This clinical trial study was performed on 40 patients, who had frequent muscle cramps during hemodialysis. The patients were intentionally selected. Before and after the massage, severity of pain due to muscular cramp was recorded. Analysis of these data was performed in SPSS environment, using paired-sampled T-test method and descriptive statistics.

**Findings:** The severity and frequency of muscular cramp seen during dialysis  $p<0.001$  reduced; mean severity of pain before intervention was 8.73, while this severity reduced to 1.7. In 19 patients (47.5%). No muscular cramps was seen during dialysis. Throwing a comparison before and after the intervention, muscular cramps in 52.5% cases proved to be of less severity during dialysis.

**Discussion & Conclusion:** Whatever can be concluded from the performed research is that massage in the dialysis patients can prevent and decrease pain intensity due to muscle cramp.

**Key words:** hemodialysis, muscle cramp, massage

۱. Dept of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Science, Kurdestan, Iran

۲. Dept of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Science, Zanjan, Iran

۳. Dept of Nursing, Faculty of Medicine, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

\*Corresponding Author

