

فراوانی سندروم بینایی رایانه و برخی عوامل مرتبط با آن در کاربران رایانه‌های شخصی در شهر همدان
دکتر مرتضی سماواتی^۱
تاریخ پذیرش: ۸۴/۷/۱۲ تاریخ دریافت: ۸۳/۹/۳

چکیده

مقدمه: بسیاری از افرادی که از رایانه استفاده می‌کنند به بیماری رایانه مبتلا می‌شوند که به آن سندروم بینایی رایانه اطلاق می‌گردد. براساس مطالعات انجام شده ۵۰-۹۰ درصد افراد استفاده کننده از کامپیوتر، دچار درجاتی از علائم این سندروم می‌شوند. بهمین منظور این مطالعه با هدف تعیین فراوانی سندروم بینایی رایانه و برخی از عوامل مرتبط با آن در کاربران رایانه‌ای شخصی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعي می‌باشد که برروی ۳۸۵ نفر از کاربران رایانه‌های شخصی که بصورت تصادفي در سال ۸۲ از سطح شهر همدان انتخاب شده بودند انجام پذيرفت. تمامی کاربران از نظر عیوب انکساری چشم توسط متخصصین مربوطه مورد معاینه قرار گرفتند. پس از جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در مورد مبتلایان و غیر مبتلایان به CVS، از آزمونهای پیرسون و کای‌اسکور جهت مقایسه نتایج استفاده گردید.

یافته‌های پژوهش: نتایج نشان داد که طول مدت کار با رایانه و میزان کار روزانه با فراوانی CVS ارتباط معنی داری دارد ($p=0.001$). هر چقدر میزان وضوح مانیتور بیشتر بود میزان سندروم کمتر شده بود به طوریکه پایین تر بودن مانیتور نسبت به چشم کاربر و رعایت فاصله مناسب از مانیتور (۵۰-۷۰ سانتیمتر) در کاهش این سندروم مؤثر بود ($p=0.001$). در افرادی که دارای عیوب انکساری اصلاح نشده دوربینی، پیرچشمی و آستیگماتیسم بودند میزان فراوانی CVS بیشتر و از نظر آماری معنی دار بود ($p=0.01$).

نتیجه‌گیری نهایی: فراوانی سندروم بینایی رایانه در کاربران رایانه‌های شخصی در همدان ۷۲/۵% بود و با برخی عوامل از جمله عیوب انکساری چشم، مدت زمان کار با رایانه، میزان وضوح ارتفاع و فاصله مانیتور نسبت به چشم در ارتباط بود.

واژه‌های کلیدی: بیماریهای چشم، سندروم بینایی رایانه، صدمات ناشی از تابش

۱- استادیار گروه چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان- آدرس: همدان- بیمارستان امام خمینی- بخش چشم

سطح شهر همدان در سال ۸۲ که حداقل ۶ ماه سابقه کار مداوم با کامپیوتر را داشتند انتخاب شدند. تمامی کاربران از نظر عیوب انکساری و انحراف اصلاح نشده چشم در درمانگاه چشم پزشکی توسط متخصصین مورد معاینه قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده و سایر عوامل موردنظر از قبیل میزان وضوح و نوع مانیتور، مدت زمان کار با رایانه، میزان روشنایی محیط کار، فاصله مانیتور از چشم، استفاده از عینک مخصوص رایانه و در پرسشنامه‌ای از پیش تهیه شده که روایی و پایایی آن تأیید شده بود درج گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمونهای پیرسون و کایدو و به کمک نرم‌افزار SPSS10 انجام گرفت. قابل ذکر است در این مطالعه کاربرانی که دارای عیوب انکساری اصلاح شده بودند به عنوان افراد فاقد عیوب انکساری در نظر گرفته شدند.

یافته‌های پژوهش

از کل ۳۸۵ نفر کاربر مورد مطالعه، ۱۸۶ نفر مذکور و ۱۹۹ نفر مؤنث بودند که میانگین سنی آنان ۲۸/۱۹ سال بود. یافته‌هایی مطالعه بیانگر آن بود که ۲۷۹ نفر (۷۲/۵%) دارای حداقل یکی از علائم CVS و ۱۰۶ نفر (۲۷/۵%) فاقد این علائم بودند. فراوانی انواع علائم در کاربران در جدول ۱ مشاهده می‌گردد.

نتایج نشان داد فراوانی CVS در مردان ۷۳/۶٪ و در زنان ۷۱/۳٪ می‌باشد (جدول ۲).

فراوانی علائم CVS در گروهی که با مانیتور ۶۰۰ . ۸۰۰ پیکسل کار می‌کردند (۹۱/۷٪) نسبت به گروههای دیگر بیشتر بود. در گروهی که با مانیتور ۹۶۰ . ۱۲۸ کار می‌کردند فراوانی سندروم %۵۴/۶ و گروهی که با مانیتور ۱۲۸ . ۱۲۸ کار می‌کردند %۶۱/۸ که ارتباط معنی داری نیز وجود

مقدمه

بدلیل استفاده روزافزون از رایانه، تعداد بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌ها و درمانگاه‌های چشم پزشکی که از ناراحتی چشم هنگام کار با رایانه شاکی هستند، رو به افزایش است.

سندروم بینایی رایانه^۱ CVS مجموعه‌ای از علائم می‌باشد که هنگام کار با رایانه بروز می‌کند و مهمترین آنها عبارتند از: درد چشم، خارش و قرمزی چشم، خشکی چشم، تاری دید، دویینی، سردرد..... و علائم مرتبط دیگری از جمله درد گردن، درد پشت و ستون فقرات (۱).

نتایج سایر مطالعات انجام شده حاکی از آن است که با ایجاد تغییراتی در محیط کار و مراقبت بیشتر از چشمها، می‌توان میزان قابل توجهی از بروز علائم CVS در کاربران را کاهش داد(۲). همچنین این مطالعات نشان دادند که بروز علائم CVS در افرادی که عیوب انکساری اصلاح نشده دارند و از کامپیوتر استفاده می‌کنند بیشتر از افراد عادی می‌باشد و اصلاح عیوب انکساری را در این افراد مورد تأکید قرار می‌دهند(۳).

در این مطالعه سعی بر آنست که ضمن تعیین فراوانی سندروم بینایی رایانه در کاربران رایانه‌های شخصی فاکتورهایی در نظر گرفته شود که اولاً پاسخ دهی به آنها امکان‌پذیر باشد، ثانیاً در برگیرنده کیفیت و کمیت رابطه کاربر با مانیتور و همچنین کیفیت بینایی کاربر از نظر عیوب انکساری باشد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع توصیفی مقطعي بود که جامعه آماری آن بر اساس فرمول آماری ، ۳۸۵ نفر تعیین گردید. افراد مورد مطالعه بصورت تصادفی از بین کاربران رایانه‌های شخصی در

1- Computer Vision Syndrome

%۴۲ افراد که به مدت ۶ ماه الی ۱ سال با رایانه کار میکردند و %۹۲/۹۳ آنان که بیشتر از سه سال کار میکردند درای درجه ای از علائم سندرم یاد شده بودند. افزایش طول مدت کار سالانه با رایانه در افزایش میزان شیوع سندرم بینایی رایانه مؤثر بود ($p=0.001$).

همانطور که در جدول ۳ مشاهده میشود میزان کار روزانه با رایانه در افزایش سندرم CVS مؤثر بوده و از نظر آماری معنی دار است ($p=0.0001$).

فراوانی CVS در افرادی که دارای عیب انکساری اصلاح نشده از نوع آستیگماتیسم، پیرچشمی و دوربینی بودند نسبت به افراد بدون عیب انکساری ، افزایش یافته بود، لیکن فراوانی این سندرم در افراد با عیب انکساری از نوع نزدیک بینی با افراد بدون عیب انکساری تقریباً برابر بود (جدول ۴).

داشت ($P=0.001$). همچنین سطح مانیتور نسبت به چشم کاربر نیز در فراوانی CVS مؤثر بود و بطور قابل ملاحظه ای این علائم در افرادی که سطح مانیتور بالاتر از چشم آنان قرار داشت (%) نسبت به افرادی که سطح مانیتور پائین تر از چشم آنان بود (%۶۰/۲) و یا هم سطح چشمهای آنان قرار داشت (%۷۵/۹) بیشتر بود که ارتباط بین موارد مذکور معنی دار بود($p=0.001$). نتایج نشان داد که مناسبترین فاصله بین چشم کاربر و مانیتور رایانه ۵۰-۷۰ سانتیمتر است و در فواصل کمتر و بیشتر از این مقدار فراوانی CVS بیشتر است که رابطه معنی دار دارد بود ($p=0.0001$).

استفاده غیر دائم یا عدم استفاده از عینک طبی در افرادی دارای عیب انکساری نسبت به افرادی که بدون عیب انکساری بودند با میزان فراوانی بالایی از CVS همراه بود و از نظر آماری معنی دار بود ($p=0.0001$).

جدول ۱. فراوانی علام CVS در کاربران رایانه های شخصی شهر همدان، ۱۳۸۲

علائم بیماری سندرم بینایی رایانه	درد چشم	سردرد	سوژش یا خارش	قرمزی چشم	خشکی چشم	تاری دید	دوبینی	درد گردن و پشت
دارای علامت	۱۵۸	۲۵۵	۷۶	۷۳	۶۵	۶۴	۱۷	۴۶
بدون علامت	۴۱	۶۶/۲	۱۹/۷	۱۹	۱۷	۱۶/۶	۴/۴	۱۲
تعداد	۱۳۰	۲۲۷	۳۰۹	۳۱۲	۳۲۰	۳۲۱	۳۶۸	۳۳۹
درصد	۳۳/۸	۵۹	۸۰/۳	۸۱	۸۳	۸۳/۴	۹۵/۶	۸۸
جمع	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵
درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

فراوانی سندروم بینایی رایانه و برخی عوامل مرتبط با آن در کاربران رایانه‌های

جدول ۲. فراوانی سندروم بینایی رایانه در کاربران رایانه‌های شخصی بر حسب جنس در شهر همدان، ۱۳۸۲

جنس		سندروم بینایی رایانه			
مرد	زن	تعداد	درصد	تعداد	درصد
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۷۲/۰	۲۷۹	۷۱/۳	۱۴۲	۷۲/۶	۱۳۷
۲۷/۰	۱۰۶	۲۸/۷	۵۷	۲۶/۴	۴۹
۱۰۰	۲۸۵	۱۰۰	۱۹۹	۱۰۰	۱۸۶
$p = .0 / 27$					

جدول ۳. فراوانی سندروم بینایی رایانه در کاربران رایانه‌های شخصی شهر همدان بر حسب میزان کار روزانه با رایانه، ۱۳۸۲

کار روزانه		سندروم بینایی رایانه				کار روزانه				سندروم بینایی رایانه			
تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۷۲/۰	۲۷۹	۹۳/۶	۱۱۸	۹۰/۰	۹۶	۴۹/۸	۶۱	۱۴/۳	۴	دارای علامت			
۲۷/۰	۱۰۶	۶/۴	۸	۹/۰	۱۰	۵۱/۲	۶۴	۸۵/۷	۲۴	بدون علامت			
۱۰۰	۲۸۵	۱۰۰	۱۲۶	۱۰۰	۱۰۶	۱۰۰	۱۲۵	۱۰۰	۲۸	جمع			
$p = .0 / 400$													

جدول ۴. فراوانی سندروم بینایی رایانه در کاربران رایانه‌های شخصی شهر همدان بر حسب وجود یا عدم وجود عیوب انکساری اصلاح نشده چشم

عیوب انکساری		امتروپی		پیرچشمی		دوربینی		آستیگماتیسم		نزدیک بینی		جمع		
سندروم بینایی رایانه	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۷۲/۰	۲۷۹	۶۹	۲۸	۸۶/۶	۱۲	/۴	۱۷	۹۱/۳	۲۱	۶۹/۴	۱۹۰	دارای علامت		
۲۷/۰	۱۰۶	۳۱	۱۷	۱۲/۴	۳	۰/۶	۱	۸/۷	۲	۳۰/۶	۸۴	بدون علامت		
۱۰۰	۲۸۵	۱۰۰	۵۵	۱۰۰	۱۵	۱۰۰	۱۸	۱۰۰	۲۲	۱۰۰	۲۷۴	جمع		
$p = .0 / 400$														

بحث و نتیجه‌گیری

براساس مطالعه انجام شده توسط شیدی^۱ در دانشگاه کالیفرنیا ۵۰-۹۰ درصد کاربران کامپیوتر دارای درجاتی از علائم CVS بودند و شیوع آن در افرادی که دارای عیوب انکساری اصلاح نشده از نوع دوربینی، پیرچشمی و آستیگماتیسم به همراه دوربینی بودند از بیشترین میزان برخوردار بود(۱).

با توجه به نتایج بدست آمده، فراوانی سندروم CVS بین ۶۹/۴% در افراد بدون عیوب انکساری تا ۹۴/۴% در افراد دوربین بدون عینک متغیر بود و این میزان کمی بیشتر از مطالعات سایر محققین می‌باشد. به نظر می‌رسد که عدم توجه کافی به سلامت چشم از نظر عیوب انکساری، یکی از علایم اصلی این افزایش باشد.

1- Sheedy

افزایش فراوانی CVS نسبت به طول مدت کار با رایانه و ساعات کار روزانه در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته که بیشتر از کامپیوتر استفاده می‌کنند را می‌توان به عواملی از جمله عدم رعایت نکات اینمی که در کاهش این سندروم مؤثر می‌باشد.

براساس یافته‌های مطالعه حاضر، پایین بودن سطح مانیتور از چشم کاربران با میزان کمتری از فراوانی CVS همراه بود که این نتایج با تحقیقات انجام گرفته در این زمینه انطباق دارد و این میزان ۲۰-۱۰ سانتیمتر عنوان شده است (۳،۲).

افرادی که از مانیتور های باوضوح کمتر استفاده می‌کردند و یا فاصله ۵۰-۷۰ سانتیمتر از مانیتور را رعایت نمی‌کردند با میزان بالاتری از سندروم بینایی رایانه همراه بودند که در مطالعات سایرین نیز همین نتیجه حاصل شده است و تأکیدی بر استفاده از مانیتورهای باوضوح بیشتر و رعایت فاصله یاد شده دارند (۲،۴،۵).

سپاسگزاری

از همکاری جناب آقای خسرو مانی مشاور آماری طرح سپاسگزاری می‌گردد.

در این مطالعه فراوانی CVS در افراد دارای عیوب انکساری دوربینی و پیرچشمی از بیشترین میزان برخوردار بود که در مطالعات دیگر نیز براستفاده دائم از عینک طبی برای این دو گروه تأکید شده است. دکتر شیدی و همکاران مدعی یک نوع تکنولوژی تحت عنوان PRIO می‌باشند که با استفاده از این تکنولوژی کاربران رایانه تحت معاینات بخصوصی قرار می‌گیرند و سپس در صورت لزوم، عینک مخصوص رایانه برای افراد تجویز می‌شود. در یک مطالعه برروی ۲۰۰ نفر که علائم CVS را دارا بودند با استفاده از این تکنیک عینک مخصوص رایانه تجویز شد که ۱۰۰٪ افراد کاهش علائم را نشان دادند (۳).

از نظر فراوانی علائم بیماری در نتایج این مطالعه، با سایر گزارشها تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. در مطالعه حاضر درد چشم و پس از آن سردرد از بیشترین میزان فراوانی برخوردار بود لیکن در مطالعات مشابه پس از درد چشم به ترتیب تاری دید، خشکی یا تحريك چشم، قرمزی چشم و سردرد قرار داشت (۶،۴،۲). به نظر می‌رسد سردرد بی ارتباط با درد چشم نباشد زیرا درد چشم می‌تواند زمینه‌ساز سردرد کشنشی باشد.

References

- Sheedy J.; Computer vision syndrome; <http://www.doctorergo.com>.
- Von Stroh R.; Computer vision syndrome; Occup Health Saf, 1993 Oct; 62(10): 62-6
- Sheedy J.; Prio-nin ways to reduce the symptoms of computer vision syndrome; <http://www.prio.com/consumers/9ways.shtml>, 2001.
- Sara kudron; Preventing computer vision syndrome; http://www.public.iastate.edu/rhetoric/105h_16cofp/smkconp.html, 1999.
- Hunt L.; Visual complaints from computer users; Insight 1991 Jun; 6(3): 17.
- Miller SC.; Communicating about computer and vision; J Am ophtom assoc, 1996 Sep; 67(9): 518-19.