

محاسبه آسیب ناشی از رادیونوکلئید ^{125}I در فواصل مختلف از محور مرکزی DNA بر اساس مدل اتمی و با استفاده از Geant4-DNA جعبه ابزار

پروین احمدی^۱، مجتبی شمسایی زفرقدی^{۲*}، علی اصغر شکری^۱

(۱) گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

(۲) دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۸/۲۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۳/۲۶

چکیده

مقدمه: این مطالعه روشی برای بررسی آسیب‌های ناشی از تابش رادیونوکلئید گسیلنده اوژه است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، بهره شکست ناشی از رادیونوکلئید ید در فواصل مختلف از مرکز DNA، با به کارگیری ابزار Geant4-DNA و با استفاده از مدل اتمی ارزیابی شد.

یافته‌های پژوهش: میانگین بهره شکست در DNA، به عنوان تابعی از فاصله از مرکز محور DNA تا مکان واپاشی رادیونوکلئید گسیلنده اوژه نشان داده شده است.

بحث و تئیجه‌گیری: این تحقیق نشان می‌دهد بیشترین آسیب توسط الکترون کم انرژی زیر ۱ کیلو الکترون‌ولت و بهویژه هنگامی که در نزدیکی قرار می‌گیرند، دیده می‌شود.

واژه‌های کلیدی: Geant4-DNA، الکترون اوژه، هسته‌های پرتوزا، شکست دوگانه

* نویسنده مسئول: دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

Email: pysham@aut.ac.ir

Copyright © 2019 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits copy and redistribute the material, in any medium or format, provided the original work is properly cited.


مقدمه

هدف درمانی با رادیونوکلئیدهای اوژه، به علت برد کوتاه در حد ابعاد سلولی و LET بالا و رساندن سمیت بالا به تومور و سلول‌های سرطانی توجه شده است. هنگامی که رادیونوکلئیدهای گسیلنده اوژه در سلول‌های سرطانی قرار می‌گیرند، سبب آسیب به DNA می‌شوند و می‌توانند سرعت رشد سلول‌های سرطانی را کنترل کنند (۱). این اثر با تأثیر مستقیم تابش‌های یونیزان بر روی سلول ایجاد می‌شود؛ همچنین به علت اینکه بخش فراوانی از سلول، از آب تشکیل شده است، ممکن است هنگام تعامل تابش با آب، رادیکال‌های آزاد تولید شوند که این یک اثر غیرمستقیم به شمار می‌آید. تأثیر تابش می‌تواند سبب شکست‌های دوگانه در DNA شود. رادیونوکلئیدهای گسیلنده اوژه، بهویژه در درمان سرطان‌های از نوع متاستاز و یا تومورهای کوچک کاربرد دارند. ^{125}I شناخته‌شده‌ترین عضو خانواده رادیونوکلئیدها است که از آن‌ها به عنوان گسیلنده اوژه یاد می‌شود. به علت سمیت بسیار و برد کوتاه و تابش حداقل به بافت سالم، این نوع رادیونوکلئید به نامزد مناسبی برای درمان سرطان تبدیل شده است. واپاشی این رادیونوکلئیدها، با انتشار چندین الکترون کم انرژی در محل واپاشی، بهویژه هنگامی که در نزدیکی DNA قرار می‌گیرند، سبب نابودی سلول می‌شوند. درصورتی که رادیونوکلئید استفاده شده در درون سلول قرار گیرد، یک مولکول حامل باید رادیونوکلئید را از غشای سلول عبور دهد. این فرایند به روش نشان‌دارسازی یا عمل سنتز صورت می‌گیرد که در آن، هدایت رادیونوکلئید به سوی کروموزوم‌ها انجام می‌شود. انرژی ایناشتی حاصل از واپاشی در مجاورت کروموزوم‌ها، سبب ایجاد شکست در

پیوند میان مولکول‌های کروموزوم می‌شود.

در این مطالعه، موقعیت ید در چهار سنتز با نامهای m-Iodo-p-ethoxyHoechst (125IE-H) 4-Iodo-p-methoxyHoechst (125IM-H) iodophenyl methanamineHoechst (C8 5-125I iodo-2-linker) (125IC8-H) deoxyuridine، در شکل شماره ۱ شبیه‌سازی شد و شکست دوگانه آن‌ها در فواصل گوناگون از محور کروموزوم بررسی گردید.

آسیب‌های ناشی از تابش، با استفاده از روش‌های نظری و تجربی بررسی شده (۲-۸)؛ اما بسیاری از جنبه‌های کمی آسیب ناشی از تابش، هنوز به طور کامل توسط روش‌های تجربی بررسی نشده است. در این زمان، شبیه‌سازی به درک بعضی از جزئیات آثار تابش‌های یونیزان در مقیاس‌های سلولی و درون‌سلولی کمک می‌کند. کدهای مونت‌کارلوی متداول در شبیه‌سازی (۹، ۱۰)، ARTRAC (۱۱)، RITRACKS (۱۳)، TRAX (۱۲)، PITS (۱۴) و KURBUC (۱۵) Geant4 کدی با دسترسی آزاد است که شامل کلاس‌های کتابخانه‌ای به زبان C++ است و امکان شبیه‌سازی برهم‌کنش ذرات در مقیاس نانو و زیرسلولی را در محیط آب مایع فراهم می‌کند. از Geant4-DNA که در سال ۲۰۰۸ از Geant4 استخراج شده، در این پژوهش برای شبیه‌سازی آسیب تابش یونیزان در مقیاس DNA استفاده شده است. این کد توانسته است فعل و انفعالات ذرات با آب مایع در انرژی‌های چند الکترون‌ولت تا چند مگا الکترون‌ولت را شبیه‌سازی کند (۱۶-۲۲).



شکل شماره ۱. فاصله اتم ید (کرده سبز رنگ) به ترتیب در (a) ۰/۵۷، (b) ۰/۸۶۱، (c) ۰/۹۲ و (d) ۱/۳۹ نانومتر از مرکز محور DNA.


محتمل ترین ساختار DNA در سلول های زنده است (۲۰). بسیاری از پژوهش ها توانایی Geant4-DNA را با بسته الکترومغناطیسی کم انرژی برای شبیه سازی تابش در مقیاس های سلولی و درون سلولی نشان داده اند (۲۳، ۲۴). در این مطالعه، از طیف ^{125}I استفاده شد که در گزارش AAPM آمده است (جدول شماره ۱). در مطالعه شبیه سازی، از ۱۰۰۰۰۰ الکترون (۲۵) به عنوان منبع ذرات باردار اولیه بهره گرفته شد. الکترون ها به طور تصادفی تولید می شوند . مدل bna.pdb lib (PDB lib) از بانک داده پروتئین استخراج شده است. آسیب DNA ناشی از تابش یونیزان مستقیم و غیرمستقیم بررسی گردید. برای اثر مستقیم، انرژی آستانه (حداقل مقدار انرژی لازم برای ایجاد شکست در هر رشته DNA) $10/79$ الکترون ولت است. که این $10/79$ الکترون ولت، کمترین انرژی یونیزاسیون آب در کد Geant4-DNA است. برای تخمین اثر غیرمستقیم DNA، روش پامپون کاربرد دارد. در روش پامپون، از یک روش در بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم

مواد و روش‌ها

Geant4 نرم‌افزاری مبتنی بر روش مونت‌کارلو است. این کد، کدی با هدف کلی است و به طور گستردگی در زمینه‌های گوناگونی از جمله فیزیک انرژی بالا، مطالعات فضایی، پزشکی و رادیوبیولوژیک به کار می‌رود. این کد تعداد بسیاری کتابخانه دارد و کاربر به منبع داده، دسترسی باز دارد. Geant4 شامل مجموعه اولیه فرایندهای فیزیکی در آب تا محدوده انرژی پایین است. Geant4-DNA که از Geant4 استخراج شده است، اجازه می‌دهد تا تعامل ذرات با انرژی پایین در مقیاس نانومتر را توصیف کند. این کد برای ذیمتری و نانوذیمتری مناسب است و نرم‌افزاری مبتنی بر زبان برنامه‌نویسی C++ است که می‌تواند تعامل ذرات با ماده را در طیف گسترده‌ای از انرژی، هندسه و ابعاد شبیه‌سازی کند (۲۱، ۲۱). در این کد، از آب مایع برای فعل و انفعالات ذرات استفاده شده است که یک تخمين منطقی از فرایندهای بیولوژیکی است. در این کار، از مدل B-DNA استفاده شده است. B-DNA

گروههای قند - فسفات برابر یا بیشتر از انرژی آستانه باشد، یک شکست تکرشتهای اتفاق می‌افتد. هنگامی که دو شکست تکرشتهای در دو رشته متضاد و در فاصله کمتر از ۱۰ جفت باز اتفاق بیفتد، یک شکست دوگانه شکل می‌گیرد (شکل شماره ۲)،^{۳،۴}

استفاده شده است و تفاوت در اثر مستقیم و غیرمستقیم، تفاوت در انرژی آستانه آن هاست. برای تأثیر مستقیم انرژی آستانه، $10/79$ الکترونولت و برای اثر غیرمستقیم، 17 الکترونولت (به عنوان حداقل انرژی لازم برای تولید یک جفت رادیکال) استفاده شده است (۲۶-۲۷). هنگامی که انرژی بر جا گذاشته در




شکل شماره ۲. شکست تکرشتهای و شکست دوگانه (راست)؛ ساختار مولکولی (DNA bna.pdb1) (چپ)

از اثر غیرمستقیم، با احتمال 13 درصد به دست آمده است.^(۴)

یافته‌های پژوهش

در این کار، برای بررسی واپاشی ^{125}I ، از Geant4- DNA برای پیش‌بینی شکست DNA استفاده شده است. نتایج شکست دوگانه در هر واپاشی ناشی از ^{125}I ، در فواصل گوناگون از محور مرکزی DNA در شکل شماره ۳ نشان داده شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که شکست دوگانه در هر واپاشی، به ترتیب $1/6$ ، $1/17$ ، $0/56$ ، $0/55$ و $0/38$ برای ^{125}I در فواصل صفر، $0/52$ ، $0/861$ ، $0/92$ و $0/39$ از مرکز محور DNA است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی حاضر در جدول شماره ۲ خلاصه شده است.

از آنجا 70 درصد سلول‌ها از آب تشکیل شده است، هنگامی که سلول در معرض تابش یونیزان قرار می‌گیرد، انرژی تابش بیشتری توسط مولکول‌های آب جذب می‌شود و سبب ایجاد رادیکال‌های آزاد می‌گردد. این تأثیرات به عنوان آثار غیرمستقیم تابش یونیزان شناخته می‌شوند. در مرحله شیمیابی، در میان گونه‌های شیمیابی OH ، H_2O_2 ، ee_{aq} ، H تولید شده، OH بیشترین توانایی تعامل با DNA را دارد. رادیکال‌های هیدروکسیل بسیار بیشتر از سایر گونه‌ها، با قند و گروههای پایه در DNA واکنش برقرار می‌کنند. احتمال تعامل رادیکال OH با قند فسفات، 20 درصد و پایه، 80 درصد است. احتمال آسیب و یا شکست تکرشتهای ناشی از تعامل OH با قند فسفات، 13 درصد است. احتمال آسیب ناشی



شکل شماره ۳. میانگین تعداد شکست‌های دوگانه به‌ازای هر واپاشی ^{125}I ، بر حسب فاصله از محور مرکزی مولکول DNA در فواصل صفر، $0/۰۵۷$ ، $0/۰۸۶۱$ ، $0/۰۹۲$ و $1/۰۳۹$ نانومتر. \blacktriangle مدل حجمی Raisali. \bullet مدل Balagurumoorthy. \star روش تجربی.

جدول شماره ۱. طیف الکترون‌های اوژه ^{125}I (۲۵)

125I		
فرایند	انرژی (keV)	بازده
CK NNX	$0/0.299$	$3/51$
Auger NXY	$0/0.324$	$1/9$
CK MMX	$0/127$	$1/44$
CK LLX	$0/219$	$0/264$
Auger MXY	$0/461$	$2/28$
Auger LMM	$3/0.5$	$1/25$
Auger LMX	$3/67$	$0/340$
Auger LXY	$4/34$	$0/0.211$
Auger KLL	$22/4$	$0/138$
Auger KLX	$26/4$	$0/0.59$
KXY Auger	$30/2$	$0/0.65$

جدول شماره ۲. میانگین تعداد شکست‌های دوگانه الکترون‌های اوژه در فواصل گوناگون از محور اصلی DNA با استفاده از مدل اتمی


نام سنتر ^{125}I	نام سنتر ^{125}I از مرکز (nm)DNA	فاصله ^{125}I از مرکز (nm)DNA	میانگین تعداد شکست دوگانه در هر واپاشی ^{125}I در این مطالعه	میانگین تعداد شکست دوگانه در هر واپاشی ^{125}I دیگر کارها (مرجع)
125IMH	$0/861$	$0/56$		-
125IEH	$0/92$	$0/55$	(۲)	$0/52$
125IC8H	$1/39$	$0/38$	(۲)	$0/18$
125IdUr	$0/57$	$1/12$	(۲۹)	$1/1$
--	صفر	$1/6$	(۳۰)	$0/98$

می‌باید. در اصل، شکست دوگانه در هر واپاشی رادیونوکلئید گسیلنده الکtron اوژه، با افزایش فاصله میان رادیونوکلئید ید و DNA کاهش می‌باید. بیشترین

با افزایش فاصله ^{125}I از محور مرکزی DNA، از $0/57$ نانومتر به $1/39$ نانومتر، شکست دوگانه در هر واپاشی به ترتیب با حدود $26/8$ و $26/25$ درصد کاهش

نشان دهنده افت سریع در بهره شکست دوگانه، با افزایش فاصله از محور مرکزی DNA است.

شکست دوگانه در الکترون‌های اوژه زیر ۱ کیلو الکترون‌ولت اتفاق می‌افتد (شکل شماره ۴). نتایج



شکل شماره ۴. میانگین تعداد شکست دوگانه الکترون‌های اوژه در انرژی‌های گوناگون با استفاده از مدل اتمی

انرژی زیر ۱ کیلو الکترون‌ولت و مربوط به لایه‌های M و N و در مجاورت DNA رخ می‌دهد. ^{125}I با داشتن الکترون‌های تابشی زیر 4 keV و با بازده نسبتاً خوب در این محدوده انرژی و بیزگی‌های شیمیایی مناسب برای نشان دار کردن، گزینه شایسته‌ای برای هدف درمانی است. با توجه به انرژی برجا گذاشته این گسیلنده در فوائل چند نانومتر و هدایت هدفمند آن به نزدیکی کروموزوم، زمینه انهدام و کنترل توده‌های سرطانی را فراهم خواهد کرد. برای طراحی بهتر استراتژی‌های هدف درمانی مبتنی بر الکترون اوژه، یک درک جامع و اساسی نیاز است که مربوط به رابطه دقیق میان بهره شکست دوگانه و موقعیت ید 125I باشد. دسترسی به یافته‌های تئوری با مونت‌کارلو می‌تواند به ما برای رسیدن به نتایج بهتری در مطالعات تجربی کمک کند؛ بنابراین، روش شبیه‌سازی در حوزه ابعاد سلولی کمک می‌کند تا با انتخاب هندسه و رادیونوکلئید مناسب، به شرایط آزمایشگاهی نزدیک شود و درنتیجه سبب می‌گردد یافته‌های به دست آمده در این حوزه، ما را در انتخاب رادیوداروهای مناسب گسیلنده الکترون اوژه و طراحی درمان هدفمند یاری کند.

بحث و نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر نشان دهنده جزئیات بیشتر بررسی الکترون اوژه و آثار بیولوژیکی مستقیم و غیرمستقیم رادیونوکلئید ^{125}I است. در این پژوهش از Geant4- استفاده گردید و از مدل PDB و pdb4dna ساختار B-DNA بهره گرفته شد که شبیه‌ترین ساختار به DNA انسان است. در این ساختار، محل قرار گرفتن اتم‌ها در ساختار DNA کاملاً شبیه‌سازی شده است. تأثیر اتم‌های رادیونوکلئید در فوائل گوناگون از محور، برای تولید آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم بررسی شده است. این مطالعه نشان می‌دهد میان شکست دوگانه در هر واپاشی و فاصله منبع از مرکز DNA، رابطه نمایی وجود دارد و کاهش حدود 80 درصد بهره شکست در فاصله $1/1$ نانومتر رخ می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که آسیب DNA در فوائل دور از محور، به علت برد کوتاه الکترون‌های اوژه، بهشدت کاهش می‌یابد و پس از این فاصله، شمارش کم شکست مربوط به آثار غیرمستقیم تابش است و در خارج از سلول رادیونوکلئید گسیلنده اوژه، در عمل تأثیری در ایجاد شکست ندارد. بیشترین آسیب درباره الکترون‌های اوژه و کاستر کرونینگ با

References

- 1.Nikjoo H, Taleei R, Liamsuwan T, Liljequist D, Emfietzoglou D. Perspectives in radiation biophysics from radiation track structure simulation to mechanistic models of DNA damage and repair. *Rad Phys Chem* 2016;128:3-10.
doi.10.1016/j.radphyschem.2016.05.005
- 2.Balagurumoorthy P, Xu X, Wang K, Adelstein SJ, Kassis AI. Effect of distance between decaying ^{125}I and DNA on auger electron induced double strand break yield. *Int J Rad Biol* 2012;88:998-1008.
doi.10.3109/09553002.2012.706360
- 3.Piroozfar B, Raisali G, Alirezapour B, Mirzaii M. The effect of ^{111}In radionuclide distance and auger electron energy on direct induction of DNA double strand breaks a Monte Carlo study using Geant4 toolkit. *Int J Rad Biol* 2018;94:385-93.
doi:10.1080/09553002.2018.1440329
- 4.Mokari M, Alamatsaz MH, Moeini H, Babaeibrojeny AA, Taleei R. Track structure simulation of low energy electron damage to DNA using Geant4 DNA. *Biomed Phys Eng Exp* 2018;4: 65009.
- 5.Francis Z, Incerti S, Karamitros M, Tran H, Villagrasa C. Stopping power and ranges of electrons, protons and alpha particles in liquid water using the Geant4 DNA package. *Nucl Ins Meth Phys Res Sec Mate At.* 2011;269:2307-11.
doi.10.1016/j.nimb.2011.02.031
- 6.Freudenberg R, Kotzerke J. Cellular dosimetry using the Geant4 Monte Carlo toolkit. *J Nucl Med* 2010;51:1488-9.
- 7.Leaf nosed bat. Encyclopedia britannica. 5th ed. Saunders Publication. 2009.P.231-9.
- 8.Tajik M, Rozatian AS, Semsarha F. Simulation of ultrasoft X rays induced DNA damage using the Geant4 Monte Carlo toolkit. *Nucl Ins Meth Phys Res Sec Mate At.* 2015;342:258-65.
doi.10.1016/j.nimb.2014.10.023
- 9.Friedland W, Dingfelder M, Kundrat P, Jacob P. Track structures DNA targets and radiation effects in the biophysical Monte Carlo simulation code PARTRAC. *Mut Res Fund Mole Mech Mut* 2011;711:28-40.
doi.10.1016/j.mrfmmm.2011.01.003
- 10.Nikjoo H, Uehara S, Emfietzoglou D, Cucinotta F. Track structure codes in radiation research. *Rad Meas* 2006;41:1052-74. doi.10.1016/j.radmeas.2006.02.001
- 11.Wilson WE, Nikjoo H. A Monte Carlo code for positive ion track simulation. *Rad Environ Biophys* 1999;38:97-104.
doi.10.1007/s004110050144
- 12.Wälzlein C, Scifoni E, Kramer M, Durante M. Simulations of dose enhancement for heavy atom nanoparticles irradiated by protons. *Phys Med Biol* 2014;59:1441.
- 13.Plante I, Cucinotta FA. Multiple CPU computing the example of the code RITRACKS. *Int Meet Comp Int Meth Bioinfo Bios* 2012;2:123-8.
- 14.Uehara S, Nikjoo H, Goodhead D. Cross sections for water vapour for the Monte Carlo electron track structure code from 10 eV to the MeV region. *Phys Med Biol* 1993;38:1841.
- 15.Agostinelli S, Allison J, Amako K, Apostolakis J, Araujo H, Arce P, et al. Geant4 a simulation toolkit. *Nucl Ins Meth Phys Res Sec Equ* 2003;50:250-303.
doi.10.1016/S0168-9002(03)01368-8
- 16.Lampe N, Karamitros M, Breton V, Brown JMC, Kyriakou I, Sakata D, et al. Mechanistic DNA damage simulations in Geant4 DNA part 1 a parameter study in a simplified geometry. *Phys Med* 2018;48:135-45.
doi.10.1016/j.ejmp.2018.02.011
- 17.Sakata D, Lampe N, Karamitros M, Kyriakou I, Belov O, Bernal MA, et al. Evaluation of early radiation DNA damage in a fractal cell nucleus model using Geant4 DNA. *Phys Med* 2019;62:152-7.
doi.10.1016/j.ejmp.2019.04.010
- 18.Incerti S, Kyriakou I, Bernal M, Bordage M, Francis Z, Guatelli S, et al. Geant4 DNA example applications for track structure simulations in liquid water a report from the Geant4 DNA Project. *Med Phys* 2018;45:722-39. doi.10.1002/mp.13048
- 19.Bernal MA, Bordage MC, Brown JMC, Davidkova M, Delage E, El Bitar Z, et al. Track structure modeling in liquid water: A review of the Geant4 DNA very low energy extension of the Geant4 Monte Carlo simulation toolkit. *Phys Med* 2015;31:861-74.
- 20.Semsarha F, Goliae B, Raisali G, Khalafi H, Mirzakhian L. An investigation on the radiation sensitivity of DNA conformations to ^{60}Co gamma rays by using Geant4

- toolkit. Nucl Ins Meth Phys Res Sec Int Mate At2014;323:75-81.
doi.10.1016/j.nimb.2014.01.002
- 21.Chauvie S, Francis Z, Guatelli S, Incerti S, Mascialino B, Montarou G, et al. Monte Carlo simulation of interactions of radiation with biological systems at the cellular and DNA levels. *Phys Med* 2006;3:72-6.
- 22.Tajik M, Rozatian AS, Semsarha F. Calculation of direct effects of ^{60}Co gamma rays on the different DNA structural levels a simulation study using the Geant4 DNA toolkit. *Nucl Ins Meth Phys Res Sec Int Mate* At2015;346:53-60.
doi.10.1016/j.nimb.2015.01.042
- 23.Incerti S, Douglass M, Penfold S, Guatelli S, Bezak E. Review of Geant4 DNA applications for micro and nanoscale simulations. *Phys Med* 2016;32:1187-200.
doi:10.1016/j.ejmp.2016.09.007
- 24.Kyriakou I, Incerti S, Francis Z. Technical Note improvements in geant4 energy loss model and the effect on low-energy electron transport in liquid water. *Med Phys* 2015;42:3870-6.
doi.10.1118/1.4921613
- 25.Howell RW. Radiation spectra for Auger electron emitting radionuclides report No two of AAPM nuclear medicine task group no six. *Med Phys* 1992;19:1371-83. doi.10.1118/1.596927
- 26.Pomplun E. A new DNA target model for track structure calculations and its first application to i-125 Auger electrons. *Int J Rad Biol* 1991;59:625-42.
doi.10.1080/09553009114550561
- 27.Pomplun E. ^{123}I calculation of the Auger electron spectrum and assessment of the strand breakage efficiency. *Biophys Am Phys Med Sym Proce* 1992; 8:253-8.
Doi.10.1080/09553009114550561
- 28.Nikjoo H, Emfietzoglou D, Liamsuwan T, Taleei R, Liljequist D, Uehara S. Radiation track DNA damage and response a review. *Rep Prog Phys Soc* 2016;79:116601.
- 29.Humm JL, Charlton DE. A new calculational method to assess the therapeutic potential of auger electron emission. *Int J Rad Oncol Biol Phys* 1989;17:351-60. doi.10.1016/0360-3016(89)90450-1
- 30.Raisali G, Mirzakhalian L, Masoudi SF, Semsarha F. Calculation of DNA strand breaks due to direct and indirect effects of Auger electrons from incorporated ^{123}I and ^{125}I radionuclides using the Geant4 computer code. *Int J Rad Biol* 2013;89:57-64. doi.10.3109/09553002.2012.715785



Calculation of the Damage Induced by Radionuclide ^{125}I at Different Intervals from the DNA Central Axis based on an Atomic Model using the Geant4-DNA Toolkit

Ahmadi P¹, Shamsaizafarghandi M^{2}, Shokri A¹*

(Received: June 15, 2020 Accepted: November 16, 2020)

Abstract

Introduction: This study proposed a method to investigate the damage caused by Auger emitter radionuclide radiation.

Materials & Methods: This study investigated the detailed rate of breaks induced by iodine radionuclide at different intervals from the DNA center using the Geant4-DNA toolkit and based on the atomic geometric model.

Findings: The mean number of breaks in DNA is shown as a function of distance from

the center of the DNA axis to the position of Auger emission radionuclide decay.

Discussions & Conclusions: The highest damage occurs by electrons with energies below 1 keV, especially in the proximity of DNA.

Keywords: Auger electron, Double strand break, Geant4-DNA, Radionuclide

1. Dept of Physics, Payame Noor University, Tehran, Iran

2. Faculty of Energy Engineering and Physics, Amirkabir University, Tehran, Iran

*Corresponding author Email:pysham@aut.ac.ir