

واریاسیون نادر شریان اپی گاستریک تحتانی و شریان چرخشی رانی داخلی توسط یک تنہ مشترک از شریان ایلیاک خارجی

فاطمه جواد نیا^۱، محمد رضا غلامی^۲، داریوش بیژن نژاد^۱، محسن ژاله^۱، آنه محمد یانگ غراوی^۱، محمد حسن کریم فر^{۳*}

(۱) گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بنده شاپور اهواز

(۲) گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

(۳) گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تاریخ پذیرش: ۹۱/۴/۲۰

تاریخ دریافت: ۹۰/۷/۱۲

خلاصه

شریان چرخشی رانی داخلی معمولاً از نمای پشتی داخلی شریان پروفوندا (شریان پروفوند) (شریان رانی است) جدا می‌شود، ولی اغلب از شریان رانی مستقیماً جدا می‌شود. این ناهنجاری در ناحیه لگنی چپ یک جسد مرد مشاهده شد. در این مورد، واریاسیون شریانی توصیف شده مربوط به وجود یک تنہ مشترک برای شریان‌های اپی گاستریک تحتانی و چرخشی رانی داخلی است. این تنہ مشترک از شریان ایلیاک خارجی جدا شده است. منشاء شریان‌های اپی گاستریک تحتانی و چرخشی رانی داخلی بر مبنای تکامل جنینی و مسیرشان توضیح داد شده و واریاسیون‌های آن با گزارش موردنی تشریح شده در این مقاله، مقایسه شده است.

واژه‌های کلیدی:

واریاسیون، اپی گاستریک تحتانی، چرخشی رانی داخلی و شریان

* نویسنده مسئول: گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

[Email:](mailto:mhkarimfar@yahoo.com) mhkarimfar@yahoo.com

مقدمه

شریان چرخشی رانی داخلی معمولاً از نمای پشتی داخلی شریان پروفوندا(شریان پروفوندا شاخه ای از شریان رانی است) جدا می شود ولی اغلب از شریان رانی مستقیماً جدا می شود در بعضی وجود منشاء مشترک برای شریان های ابتوراتور و اپی گاستریک تحتانی یک آنومالی نسبتاً معمول است و در ۲۰-۳۰ درصد موارد مشاهده می شود،(۱،۲). اگر چه وجود یک تنہ مشترک از شریان ایلیاک خارجی برای شریان اپی گاستریک تحتانی و شریان چرخشی رانی داخلی غیر شایع است. ساندو و همکاران یک تنہ مشترک برای شریان های اپی گاستریک تحتانی، چرخشی رانی داخلی و ابتوراتور گزارش کردند که از شریان ایلیاک خارجی یک سانتی متر بالاتر از رباط اینگوینال جدا شده است،(۳). آشنایی با این واریاسیون ها برای جراحان ارتوپدی و عروقی ضروری به نظر می رسد.

مواد و روش ها

در تشریح روتین و آموزشی یک جسد در سالن تشریح گروه آناتومی که برای آموزش تشریح عملی دروس آناتومی دانشجویان پزشکی و سایر دانشجویان علوم پزشکی آماده می شد، این واریاسیون مشاهده شد. این آنومالی در اندام تحتانی چپ جسد یک مرد بالغ مشاهده شد.

یافته های پژوهش

در این تشریح یک تنہ شریانی مشترک، یک سانتی متر بالاتر از رباط اینگوینال از سمت داخل شریان ایلیاک خارجی جدا شده است. تنہ مشترک به یک شاخه صعودی به نام شریان اپی گاستریک تحتانی و یک شاخه نزولی به نام شریان چرخشی رانی داخلی تقسیم می شود،(شکل شماره ۱). در این مورد، شریان اپی گاستریک تحتانی دارای مسیر و مجاورت نرمال بود. شریان چرخشی رانی داخلی به سمت پایین طی مسیر کرده و وارد مثلث رانی می شود. در مثلث رانی، شریان چرخشی رانی داخلی از جلوی ورید رانی عبور کرده و عضلات نزدیک کننده را خونرسانی کرده و سپس از بین عضلات پکتینوس و پسوس بزرگ به سمت داخل می رود. مابقی مسیر شریان و مجاورات آن نرمال می باشد.


بحث و نتیجه گیری

واریاسیون های شریان های اندام تحتانی همواره مورد توجه آناتومیست ها و جراحان بوده است. این واریاسیون ها معمولاً ناشی از نقص های جنبی شبکه شریانی اندام تحتانی می باشد. وقتی جنین ۱۰ میلی متر طول دارد، شریان سیاتیک از شبکه سیاتیک عبور کرده و شریان اصلی اندام تحتانی را شکل می دهد،(۲). شکل شماره ۲ این الگو در بیشتر مهرداران وجود دارد اما در پستانداران شریان رانی که در امتداد شریان ایلیاک خارجی است، شریان اصلی اندام تحتانی می باشد،(۲،۳). (شکل شماره ۲) خیلی زود آناستوموزهایی بین شریان سیاتیک پشتی و شریان رانی پشتی به وجود می آید. وقتی که شریان پوپلیتال از شریان رانی توسعه می یابد، شریان سیاتیک ناپدید می شود. دیگر قسمت های باقی مانده این شبکه آناستوموزی پیش سازهای شریان عمقی رانی هستند. قسمت ابتدائی شریان سیاتیک باقی مانده و به عصب سیاتیک خون رسانی می کند،(۲،۳). شاخه دیگر شریان رانی، شریان صافوس است. این شریان با شریان های پا آناستوموز می شود و محل اتصال آن با شریان سیاتیک ناپدید می شود. شریان ژنیکولار نزولی و شریان تیبیال پشتی تنها باقی مانده های نهایی شریان صافوس در بالغین هستند. شریان پرونئال باقی مانده شریان سیاتیک است و شریان تیبیال جلویی یک شاخه جدید است. این الگوی پیچیده تکامل جنبی شریان های اندام تحتانی بیان کننده علت وجود واریاسیون های زیاد در شریان های اندام تحتانی است،(۴) (شکل شماره ۲)


در ۲۰-۳۰ درصد موارد شریان اپی گاستریک و شریان ابتوراتور دارای یک منشاء مشترک است،(۱،۲،۵،۶). در چند مورد شریان های اپی گاستریک، ابتوراتور و چرخشی رانی داخلی دارای یک تنہ مشترک هستند. این تنہ مشترک در ۶ مورد از شریان رانی جدا می شود،(۴،۷-۱۰). در ۳ مورد دارای منشاء داخل لگنی از شریان ایلیاک خارجی می باشد،(۳). الگو قرارگیری این سه شاخه شریانی از یک تنہ مشترک در سه مدل توضیح داده شده است. در الگوی اول که در ۴ مورد ثبت شده است، شریان

عنوان یک شاخه مستقل جدا می شوند، (۱۱). در رابطه با گزارش موردی ذکر شده در این مقاله باید گفت که این مورد با گزارشات قبلی هم خوانی ندارد و وجود یک تنہ مشترک برای شریان های اپی گاستریک و شریان چرخشی رانی داخلی گزارش نشده است. این ناهنجاری اگر چه نادر است ولی تشخیص آن برای جراح ها و رادیولوژیست ها مهم است، زیرا در موقع عمل های ترمیمی باید مد نظر قرار گیرند.

ابی گاستریک تحتانی و شریان ابتوراتور توسط یک تنہ مشترک از شریان رانی داخلی جدا می شوند، (۳، ۴، ۸، ۹). شریان رانی داخلی در یک مورد از شریان ایلیاک خارجی (۳) و در سه مورد از شریان رانی جدا می شود، (۴، ۸، ۹). در یک الگوی دیگر که در سه مورد گزارش شده است، سه شاخه شریانی مستقیماً از یک تنہ مشترک از شریان رانی (۴، ۱۰)، یا ایلیاک خارجی (۳)، جدا می شوند. در یک مورد شریان های ابتوراتور و اپی گاستریک تحتانی از شریان چرخشی رانی داخلی به



شکل شماره ۱. نمای جلویی از نواحی لگنی و رانی چپ تشریح شده جسد در این شکل نشان داده شده است.
il: رباط اینگوینال؛ leia: شریان ایلیاک خارجی چپ، iea: شریان اپی گاستریک تحتانی،
mcfa: شریان چرخشی رانی داخلی، fa: شریان رانی و va: ورید رانی



شکل شماره ۲. دیاگرام تکامل شریان های اندام تحتانی بر گرفته از الگوی تکاملی ارائه شده توسط آقای ساندو و همکارانش با اندکی تغییرات که توجیه گر واریاسیون به وجود آمده براساس نحوه تکامل جنبی می باشد. دیاگرام a, b, c نشان دهنده الگوی نرمال تکامل جنبی است. دیاگرام d نشان دهنده تنہ مشترک برای شریان های اپی گاستریک تحتانی و چرخشی رانی داخلی استکه از شریان ایلیاک خارجی جدا شده است. rp: شبکه لگنی، rf: شبکه رانی، il: رباط اینگوینال، e: شریان سیاتیک، o: شریان ابتوراتور، m: شریان چرخشی رانی داخلی

References

- 1-Bergman RA, Afifi AK, Miyauchi R. Catalog of human variation. Urban & Schwarzenberg, Baltimore 1984.
- 2-Lippert H, Pabst R, editors. Arterial variations in man: classification and frequency. Munchen: J.F. Bergmann; 1985.p.54-61.
- 3-Sanudo JR, Roig M, Rodriguez A, Ferreira B, Domenech JM. Rare origin of the obturator, inferior epigastric and medial circumflex femoral arteries from a common trunk. *J Anat* 1993;183:161-3.
- 4-Adachi B. Das Arterien System der Japaner. Kyoto Uni 1928;2:111-96.
- 5-Moore K. Clinical Oriented Anatomy. 6rd ed. Sidney: Williams and Wilkins; 2010.
- 6-Williams PI, Warwick R, Dyson M, Bannister LH. Gray anatomy. 4th ed. New York: Churchill Livingstone; 2008.
- 7-Dschau F. Eine bisher unbekannte Varietät der arteria obturatoria und pudenda accessoria mit einer Varietät der arteria circumflexa femoris medialis. *Anat Anz* 1396; 83:25-9.
- 8-Duclaux h. Anomalies de l'epigastrique et de l'obturatrice. *Bull Soc Anat Paris* 1902; 58-9.
- 9-Quail R. Anatomy of the human body and its application to pathology and operative surgery. London: Taylor and Walton; 1885.
- 10-Wood q, Thompson a. origin of the internal circumflex from the deep epigastric artery. *J Anat* 1882;17:379-83.
- 11-Bilgic S, Sahin B. Rare arterial variation: a common trunk from the external iliac artery for the obturator, inferior epigastric and profundafemoris arteries. *Surg Radiol Anat* 1997;19:45-7.



Rare Origin of the Inferior Epigastric and Medial Circumflex Femoral Arteries a Common Trunk from the External Iliac Artery

Javadnia F¹, Gholami MR², Bighanezhad D¹, Jaleh M¹, Mohammad yang gharavi A¹, Karimfar MH^{3*}

(Received: 4 Oct. 2011)

Accepted: 10 Jul. 2012)

Abstract

The medial circumflex femoral artery usually originate from the posteromedial aspect of the profunda artery (a division from femoral artery), but often originate from the femoral artery itself. This anomaly observed in the left pelvic region of a male cadaver. In this case, arterial variation described the existence of a common trunk for inferior epigastric and medial circumflex femoral arteries. This common

trunk arose from the external iliac artery. The origin of the inferior epigastric and medial circumflex femoral arteries are explained on the basis of the embryologic development and their course and variations are compared with reports in the literature.

Keywords: variation, inferior epigastric, medial circumflex femoral and artery

1. Dept of anatomy, Faculty of Medicine, Jondishapur University of Medical Sciences

2. Dept of anatomy, Faculty of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences

3. Dept of anatomy, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences

* (corresponding author)