

## Molecular epidemiology of *Candida* species isolated from clinical specimens and evaluation of their antifungal susceptibility testing to ketoconazole and nystatin with a review of studies

Niusha Kaveh <sup>1</sup> , Ayatollah Nasrolahi Omran <sup>1\*</sup> , Mohammad Taghi Hedatyati <sup>2,4\*</sup> , Mojtaba Taghizadeh-Armaki <sup>3</sup> , Mahdi Abastabara <sup>2,4</sup> , Saeed Mahdavi Omran <sup>3</sup> 

<sup>1</sup> Dept of mycology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

<sup>2</sup> Invasive Fungi Research Center, Communicable Diseases Institute, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>3</sup> Dept of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

<sup>4</sup> Dept of Medical mycology, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

---

### Article Info

### ABSTRACT

---

**Article type:**  
Research article

**Introduction:** Candidiasis is a fungal infection caused by *Candida* yeasts in immunocompromised patients. This study aimed to assess antifungal susceptibility of clinical isolates of *Candida* species to ketoconazole and nystatin by broth microdilution.

**Article History:**  
Received: Dec. 04, 2023  
Revised: Jan. 21, 2024  
Accepted: Jan. 27, 2024  
Published Online: Jun. 22, 2024

**Material & Methods:** In this descriptive-analytical study, 377 clinical isolates of *Candida* species were collected from different regions of Iran. The species were identified using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. The antifungal susceptibility testing of clinical isolates of *Candida* species to ketoconazole and nystatin was performed using broth microdilution according to standard protocol CLSI (M27-A3 and M27-S4). The standard strain of *Candida parapsilosis* was used as the quality of control. The minimum inhibitory of concentrations was determined after 24h at 37 °C.

**Results:** Based on molecular identification, *Candida albicans* 266 (70.7%), *C. krusei* 64 (17%), *C. parapsilosis* 40 (10.7%), and *C. tropicalis* 6 (1.6%) were identified. The MIC<sub>90</sub> and MIC<sub>50</sub> values of ketoconazole and nystatin for all isolates were 0.063 µg/ml, 0.031 µg/ml, 2 µg/ml, and 4 µg/ml, respectively.

**Discussion & Conclusion:** As evidenced by the results of this study, antifungal susceptibility testing along with the identification of fungi at the species level would certainly be very useful in selecting primary antifungal agents for treatment, especially in invasive fungal infections. According to our findings, ketoconazole was much more effective on *Candida* spp. than nystatin.

**Keywords:** Antifungal susceptibility testing, *Candida*, Molecular identification

Email:  
ayat51@yahoo.co.in  
hedayatimt@gmail.com

---

### How to cite this paper

Kaveh N, Nasrolahi Omran A, Hedatyati MT, Taghizadeh-Armaki M, Abastabara M, Mahdavi Omran S. Molecular epidemiology of *Candida* species isolated from clinical specimens and evaluation of their antifungal susceptibility testing to ketoconazole and nystatin with a review of studies. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2024;32(2): 105-115.

---



© The Author(s)

Publisher: Ilam University of Medical Sciences

## اپیدمیولوژی مولکولی گونه‌های کاندیدای جدا شده از نمونه‌های بالینی و ارزیابی حساسیت دارویی آن‌ها نسبت به کتوکونازول و نیستاتین با مروری بر مطالعات اپیدمیولوژی مولکولی و ارزیابی حساسیت دارویی گونه‌های کاندیدا جدا شده از نمونه‌های بالینی

نیوشاد کاوه<sup>۱</sup>, آیت‌الله نصراللهی عمران<sup>۱\*</sup>, محمدتقی هدایتی<sup>۲و۴</sup>, مجتبی تقی‌زاده ارمکی<sup>۲</sup>, مهدی عباس‌تبار<sup>۲و۴</sup>, سعید مهدوی عمران<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> گروه فارج شناسی، دانشکده علوم پزشکی، واحد تکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تکابن، ایران  
<sup>۲</sup> مرکز تحقیقات فارج‌های تهاجمی، پژوهشکده بیماریهای واگیر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران  
<sup>۳</sup> گروه انگل شناسی و فارج شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران  
<sup>۴</sup> گروه فارج شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

### اطلاعات مقاله

نوع مقاله: پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

#### نویسنده مسئول:

آیت‌الله نصراللهی عمران

گروه فارج شناسی، دانشکده

علوم پزشکی، واحد تکابن،

دانشگاه آزاد اسلامی، تکابن،

ایران

محمدتقی هدایتی

مرکز تحقیقات فارج‌های

تهاجمی، پژوهشکده بیماریهای

واگیر، دانشگاه علوم پزشکی

مازندران، ساری، ایران

Email:  
ayat51@yahoo.co.in  
edayatimt@gmail.com

**مقدمه:** کاندیدیازیس عفونتی فارجی است که توسط مخمرهای از جنس کاندیدا در شرایط ضعف دستگاه ایمنی ایجاد می‌شود. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت دارویی ایزووله‌های کلینیکی کاندیدا نسبت به داروهای کتوکونازول و نیستاتین به روش براث میکرودایلوشن انجام شد.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تعداد ۳۷۷ ایزووله بالینی کاندیدای جدا شده از شهرهای مختلف ایران با استفاده از روش PCR-RFLP شناسایی مولکولی گردید. آزمایش حساسیت دارویی ایزووله بالینی کاندیدا به روش براث میکرودایلوشن بر اساس دستورالعمل استاندارد (CLSI M27-S4 and M27-A3) برای داروهای کتوکونازول و نیستاتین صورت گرفت. برای ارزیابی صحت کار از سویهای استاندارد *Candida parapsilosis* استفاده شد. حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) Minimum Inhibitory Concentration: MIC پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون در دمای ۳۷°C تعیین گردید.

**یافته‌های پژوهش:** بر اساس شناسایی مولکولی، گونه‌های کاندیدا آلبیکتس ۲۶۶ (۷۰/۷ درصد)، کاندیدا کروزئی ۶۴ (۱۷ درصد)، کاندیدا پاراپسلوزیس ۴۰ (۱۰/۷ درصد) و کاندیدا تروپیکالیس ۶ (۱/۶ درصد) شناسایی شدند. میزان MIC<sub>۹۰</sub> و MIC<sub>۵۰</sub> کتوکونازول و نیستاتین برای همه این ایزووله‌ها به ترتیب ۴ µg/mL ۰/۰۳۱ و ۰/۰۶۲ µg/mL بود.

**بحث و نتیجه‌گیری:** استفاده از آزمایش ارزیابی حساسیت دارویی همراه با شناسایی فارج تا سطح گونه قطعاً در انتخاب عوامل ضدقارچی اولیه برای درمان، بهویزه در عفونت‌های فارجی تهاجمی، بسیار مفید خواهد بود. بر اساس نتایج مطالعه‌ما، داروی کتوکونازول روی ایزووله‌های کاندیدا بسیار مؤثرتر از نیستاتین بوده است.

**واژه‌های کلیدی:** شناسایی مولکولی، کاندیدا، حساسیت دارویی

**استناد:** کاوه نیوشاد، نصراللهی عمران آیت‌الله، هدایتی محمدتقی، تقی‌زاده ارمکی، مجتبی عباس‌تبار مهدی، مهدوی عمران سعید. اپیدمیولوژی مولکولی گونه‌های کاندیدای جدا شده از نمونه‌های بالینی و ارزیابی حساسیت دارویی آن‌ها نسبت به کتوکونازول و نیستاتین با مروری بر مطالعات اپیدمیولوژی مولکولی و ارزیابی حساسیت دارویی گونه‌های کاندیدا جدا شده از نمونه‌های بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، خرداد ۱۴۰۳؛ ۲۳۲: ۱۱۵-۱۰۵.



میزان مقاومت به آزول ارتباط وجود دارد (۶). نیستاتین یک داروی ضدقارچی است که اولین بار از استرپتومایسین نورسینی به دست آمده است و به فور به صورت پماد جلدی و یا خوراکی مصرف می‌گردد. این دارو فونثیسید است و به علت پیوستن به استرولهای غشا (استرول)، بر روی نفوذپذیری غشای قارچ اثر می‌گذارد. این آنتیبیوتیک پلی ان به سبب فعالیت ضدقارچی بالا در برابر پاتوژن‌های قارچی نظیر کاندیدا، به صورت گستردۀ در کاندیدیازیس استفاده می‌شود. البته افزایش استفاده از آن در سال‌های اخیر به افزایش چشمگیر مقاومت به این منجر دارو شده است؛ بنابراین، شناسایی زودهنگام و دقیق گونه‌های کاندیدا و توجه به الگوهای حساسیت ضدقارچی آن‌ها برای ایجاد راهبردهای مناسب برای کنترل، پیشگیری و درمان کاندیدیازیس بسیار مهم است. نیستاتین رایج‌ترین عامل درمان عفونت‌های قارچی دهانی و واژینیت قارچی ایجاد شده به وسیله کاندیدا آلیکنس است. بسته به غلظت‌های تجوییز شده، این دارو می‌تواند هم خواص کشنده‌گی و هم مهارکننده‌گی قارچ را داشته باشد. به دلیل نبود اطلاعات زمینه‌ای درباره مطالعات آزمایشگاهی در ارتباط با آزول‌های بسیار جدید و نبود اطلاعات کمتری در مقایسه با مقاومت به آزول‌ها، کار با نیستاتین بر روی گونه‌های کاندیدایی مقاوم به آزول‌ها، کار با نیستاتین بر روی نمونه‌های جمع‌آوری شده در این تحقیق به عنوان یک عامل سنجش انجام گرفت تا تهیه گزارش مناسبی از این بخش صورت گیرد؛ همچنین از سویی، نمونه‌های کاندیدا آلیکنس نسبت به داروهای کتوکونازول و نیستاتین از حساسیت خوبی برخوردارند، در حالی که دیگر داروها ظاهرًا حساسیت مناسبی ندارند (۹، ۸). با عنایت به گزارش‌های بررسی‌های مختلف انجام گرفته و ارائه شده در اطلاعات جدول شماره ۱، درباره نتایج جدادسازی نمونه‌های کاندیدایی از شهرهای مختلف و حساسیت دارویی آن‌ها، می‌توان اطلاعات اپیدمیولوژی مناسبی برای پیشگیری در اختیار سیاست‌مداران بهداشتی مناطق مختلف قرار داد تا اقدامات پیشگیری مناسب‌تری انجام گیرد؛ از این‌رو، این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی گونه‌های کاندیدای جداشده از نمونه‌های بالینی مختلف

الگوی حساسیت دارویی ضدقارچی عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای در نتیجه درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های قارچی است. در چند دهه اخیر، شیوع عفونت‌های ناشی از کاندیدا در حال افزایش است. از سوی دیگر، انتخاب عوامل ضدقارچی مناسب به علت مقاومت برخی از گونه‌های به چندین عامل ضدقارچ، بسیار محدود شده است (۱، ۲). گونه‌های کاندیدا می‌توانند باعث عفونت‌های سطحی تا کاندیدیمی تهدید کننده زندگی شوند. این قارچ همچنین از عوامل اصلی عفونت‌های بیمارستانی در افراد با نقص سیستم ایمنی است. کاندیدا آلیکنس عامل اصلی عفونت کاندیدیازیس است؛ اما انتشار گونه‌های غیر آلیکنس کاندیدا در حال افزایش است (۳، ۴). این گونه‌ها باعث ایجاد عفونت در بیماران بهویژه مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای می‌شوند. روش‌های مختلف در شناسایی کاندیداها شامل روش‌های بیوشیمیایی، کشت و روش‌های مولکولی است. در سال‌های اخیر، روش‌های مولکولی به علت داشتن سرعت و دقت بیشتر در تشخیص کاندیداها متداول‌تر شده و استفاده از این روش‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است. فعالیت‌های عوامل ضدقارچی گزینه‌های درمانی مهمی برای کنترل عفونت‌های ناشی از این مخرمرها هستند. درمان مناسب به وضعیت ایمنی و بیماری‌های زمینه‌ای بیماران، گونه‌های خاص کاندیدای درگیر و الگوی حساسیت آن به عوامل ضدقارچی بستگی دارد (۵). مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) نقاط شکست (breakpoints) بالینی ویژه گونه‌های کاندیدا را برای برخی از عوامل ضدقارچی مانند آزول‌ها، پلیانها و اکینوکاندینها توصیف کرده است. استفاده از چنین معیار تعريف شده از الگوهای تأثیر حساسیت گونه‌های کاندیدا نسب به داروهای ضدقارچ مختلف، به مدیریت درمانی بهتر بیماران منجر می‌گردد. داروی کتوکونازول هم نخستین آزول خوراکی بود که کمتر کاربرد سیستمیک دارد. از جمله عوارض این دارو مشکلات گوارشی، تهوع، خارش، راش پوستی و ژنیکوماستی است. گزارش‌های اخیر از کشورها و بیمارستان‌های مختلف نشان داده‌اند که میان غیرآلیکنس‌ها و

جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران و ارزیابی حساسیت

دارویی آنها نسبت به دو داروی کتوکونازول و نیستاتین انجام

نمایه ایزوله های کاندیدا در ایران

#### جدول شماره ۱. منابع ۴۸۱ گونه از کاندیدای جدادشده از نمونه های بالینی در ایران

نوع نمونه	خصوصیت منابع عفونت	تعداد نمونه بر حسب درصد
نمونه های بال	کلینیزاسیون	(۸۳/۲) ۴۰۰
خلط	کلینیزاسیون	(۶/۲) ۳۰
پوسته های ناخن	انیکومایکوزیس	(۶/۲) ۳۰
خون	کاندیدیمی	(۰/۴) ۲
پوست	کاندیدیوژیس کشاله ران	(۰/۴) ۲
دهان	برفک دهانی	(۰/۴) ۲
مایع مغزی نخاعی	عفونت دستگاه اعصاب مغزی	(۰/۲) ۱
ادرار	کلینیزاسیون	(۲/۱) ۱۰
واژن	کاندیدیوژیس واژنال	(۰/۸) ۴
کل		(۱۰۰) ۴۸۱

#### مواد و روش ها

در تأمین بیشتر هزینه های این تحقیق، همه نمونه های جمع آوری شده شناسایی مولکولی شدند که نظر به چندین کار عملی، به ویژه در انجام آزمایش دارویی، گزارش بخشی از انجام پژوهش در این مقاله ارائه گردیده است. اطلاعات دمو گرافیک بیماران در جدول شماره ۲ ذکر شده است.

جمع آوری ایزوله ها: در مطالعه حاضر، جامعه آماری تعداد ۳۷۷ ایزوله کاندیدای جدادشده از نمونه های بالینی گوناگون از نقاط مختلف ایران است که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران جمع آوری و کارهای عملی آن انجام گردید. با توجه به همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

#### جدول شماره ۲. خلاصه ای از نتایج آزمایش های حساسیت ایزوله های بالینی کاندیدا نسبت به دو داروی نیستاتین و کتوکونازول در مطالعات مختلف از ایران در سالهای اخیر

P-value	GM	MIC <sub>90</sub> (µg/ml)	MIC <sub>50</sub> (µg/ml)	MIC rang(µg/ml)	داروهای قارچی	تعداد گونه های کاندیدا
< 0.05	0.036	0.031	0.031	0.031 - 16	کتوکونازول	کاندیدا آلبیکنس (۲۶۶)
	2.03	۴	۲	۰.۵ - ۸	نیستاتین	
	0.046	0.125	0.031	0.031 - ۲	کتوکونازول	کاندیدا کروزی (۶۴)
	2.06	۴	۲	۱ - ۱۶	نیستاتین	
0.033	0.031	0.031	0.031 - 0.063	کتوکونازول	کاندیدا پارپیسلیوزیس (۴۰)	
	1.56	۲	۲	۰.۵ - ۴	نیستاتین	
	0.031	0.031	0.031	0.031 - 0.031	کتوکونازول	کاندیدا تروفیکالیس (۶)
	1.78	۲	۲	۱ - ۲	نیستاتین	
0.037	0.063	0.031	0.06 - 0.31	کتوکونازول	کل ایزوله های کاندیدا (۳۷۷)	
	1.98	۴	۲	۰.۱۶ - ۵	نیستاتین	

ارزیابی حساسیت دارویی نسبت به کتوکونازول و نیستاتین: آزمایش حساسیت دارویی با توجه به دستورالعمل استاندارد M27-A3 (M27-S4) و CLSI M27-A3 (CLSI M27-S4) برای قارچ‌های مخمری انجام شد (۱۲، ۱۳). ابتدا حجم اولیه داروی نیستاتین Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA (USA) برای هریک از داروهای ضدقارچی تهیه گردید. به علت غیر محلول بودن این دارو در آب، پودر خالص این داروها در ۱ میلی لیتر از محلول دی‌متیل سولفوکساید (DMSO) Sigma, Germany حل شد و غلظت نهایی ۳۲۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر تهیه گردید. در مرحله بعد، هر دارو با محیط RPMI1640 حاوی گلوتامین و بدون بی‌کربنات (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) با مورفولینوپروپان سولفونیک اسید (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) میکروگرم بر میلی لیتر (µg/mL) به دست آمد. محدوده رقت‌های دارویی استفاده شده برای نیستاتین ۶۴-۰/۲۵ میکروگرم در میلی لیتر بود که برای تهیه آن، حدود ۶۴ میکیگرم از دارو را در ۵ میلی لیتری متیل سولفوکساید حل کردیم تا غلظتی معادل ۱۲۸۰ میکروگرم در میلی لیتر به دست آید. رقت‌های دارویی استفاده شده برای کتوکونازول در محدوده ۰/۰۳۱-۰/۴۵ میکروگرم در میلی لیتر بود که برای تهیه آن، ۱/۱۴ میلی گرم از پودر این دارو در ۱ میلی لیتری متیل سولفوکساید حل گردید تا غلظت استوک معادل ۱/۱۴ گرم در میلی لیتر به دست آید. بر اساس دستورالعمل استاندارد، با استفاده از لوب استریل با اندازه مشخص، مقداری از کلونی تازه (۲۴ ساعته) مخمری رشدیافته بر روی محیط سابورو و دکستروز آگار حاوی کلارام芬یکل (مرک، آلمان) برداشته شد و در یک لوله استریل حاوی ۵ میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل حل گردید؛ سپس جذب نوری سوسپانسیون قارچی به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتری و در طول موج ۵۳۰ خوانده و غلظت نهایی سوسپانسیون قارچی در کووت با ترازنیشن ۷۷-۷۵ درصد خوانده شد. درنهایت، ۱۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون قارچی تهیه شده با محیط RPMI به همه

شناسایی فتوتیپی: برای کشت اولیه از محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلارام芬یکل (مرک، آلمان) استفاده شد. شناسایی اولیه گونه‌های کاندیدا بر روی محیط کروم آگار (کروم آگار، فرانسه) صورت گرفت. پس از رشد کلونی‌های مخمری، با استفاده از لوب استریل، مقدار مشخصی از کلونی مخمری برداشت شد و به لوله‌های اپندورف حاوی آب مقطر استریل منتقل و تا موقع لازم در فریز -۸۰- نگهداری گردید (۸، ۹).

شناسایی مولکولی با روش polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP): برای استخراج DNA ایزووله‌های مخمری از روش فنل-کلروفورم و پرل شیشه‌ای استفاده شد. در این مطالعه، برای شناسایی مولکولی گونه‌های کاندیدا از پرایمرهای ۵'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-۳' (۵) و ۵'-TCCTCCGCTTATTGATAT-۳' (ITS45) و ITS1 به کاررفته در مطالعات پیشین استفاده گردید. PCR در یک حجم نهایی ۵۰ µl صورت گرفت که شامل ۲ µl از DNA الگو، ۵ µl از buffer PCR $\times$ ۱۰ ۵ µl از گلیسرول ۵۰ درصد، ۱ µl داکسی نوکلئوزید تری فسفات (5 mM) محصول شرکت BIRON، ۵/۰ µl از هر پرایمر (با غلظت ۲۵ µM، شرکت سیناکلون، ایران) و ۴/۰ µl از polymerase DNA PCR (Roche) بود. واکنش در PCR ۲۵۰ U، محصول Taq دستگاه ترموسایکلر مدل (BioRAD) انجام گردید. سیکل‌های گرمایی بدین شرح بود: دناتوره ابتدایی C ۹۰ به مدت ۵ دقیقه که با ۳۶ سیکل به صورت زیر دنبال می‌شد: دناتوره: C ۹۰ به مدت ۱ دقیقه، اتصال C ۵۲ به مدت ۱ دقیقه و تکثیر C ۷۲ به مدت ۱ دقیقه؛ و یک مرحله تکثیر انتهایی C ۷۲ به مدت ۵ دقیقه (۲۲). به طور خلاصه، ۵ µl محصول PCR با ۵/۰ µl آنزیم ۵/۱ µl بافر آنزیم و ۸ µl آب مقطر در میکروتیوب‌های ۲۰۰ µl مخلوط و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای C ۳۷ درباره شد. محصول PCR روی ۷۱ درصد و محصول RFLP روی ۷۲ درصد الکتروفورز گردید. ژل‌ها پس از رنگ‌آمیزی با محلول اتیدیوم بروماید، با ژل داک مشاهده شد. باندهای ایجادشده توسط ایزوله با استاندارد مقایسه و تعیین گونه گردیدند (۱۰، ۱۱).

و  $\mu\text{g}/\text{mL}$  /۶۲ بود. ۸ مورد (۲/۱۲) از زولهها MIC بالاتری نسبت به کاتاف اپیدمیولوژیکی تعیین شده برای کاندیداها داشتند که نشاندهنده مقاومت این ایزولهها به کتوکونازول است ( $\text{MIC} > 1\mu\text{g}/\text{mL}$ ). سایر ایزولهها حساسیت قابلقبولی را در برابر این دارو نشان دادند (MIC  $< 1\mu\text{g}/\text{mL}$ ). میزان MIC<sub>50</sub> و نیستاتین برای همه این ایزولهها  $2\mu\text{g}/\text{mL}$  و  $4\mu\text{g}/\text{mL}$  بود؛ همچنین همه ایزولهها حساسیت خوبی نسبت به داروی نیستاتین از خود نشان دادند ( $\text{MIC} < 8\mu\text{g}/\text{mL}$ ), بهجز یک ایزوله که MIC=۱۶ $\mu\text{g}/\text{mL}$  داشت و در برابر نیستاتین از خود مقاومت نشان داد. بر اساس جدول شماره ۳، دامنه MIC داروی کتوکونازول نسبت به ایزولههای کاندیدا آلیکتس آ، کاندیدا کروزئی، کاندیدا پاراپسلیوزیس و کاندیدا تروپیکالیس به ترتیب  $0.031-16\text{ ml}$ ،  $0.031-2\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$ ،  $0.031-0.062\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$  و  $0.031-0.031\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$  بود، در حالی که این میزان برای داروی نیستاتین به ترتیب  $0.05-8\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$ ،  $0.05-16\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$ ،  $0.05-4\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$  و  $0.05-2\text{ }\mu\text{g}/\text{ml}$  بود. بر اساس یافته‌های ژئومتریک مین (GM)، نتایج نشان داد که داروی کتوکونازول تأثیر به مراتب بهتری نسبت به داروی نیستاتین علیه گونه‌های کاندیدا داشته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباط معنی‌داری میان گونه‌های کاندیدا با داروهای ضدقارچ وجود نداشته است. ( $P<0.05$ )

چاهک‌ها به غیر از کنترل منفی اضافه گردید. میکروپلیت‌های ۹۶ خانه‌ای در دمای  $35^\circ\text{C}$  به مدت ۲۴ ساعت انکوبه و کمترین غلظت مهاری (MIC) به صورت چشمی و با آینه مخصوص تعیین شد (۹، ۱۳، ۱۴). در مطالعه حاضر از نمونه‌های استاندارد *paecilomyces variotii* (ATCC22319) و *candida parapsilosis* (ATCC22019) برای کنترل کیفی آزمایش حساسیت استفاده گردید.

تجزیه و تحلیل آماری: داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS vol.23 تجزیه و تحلیل شد. محدوده MIC<sub>50</sub>، MIC و ژئومتریک مین (GM) برای داروهای کتوکونازول و نیستاتین مشخص گردید. ارتباط میان میزان حساسیت به ضدقارچ و توزیع گونه‌های کاندیدا با استفاده از آزمون دقیق فیشر و منویتنی تعیین و سطح معنی‌داری در آزمون‌های آماری  $P<0.05$  در نظر گرفته شد. IR.IAU.TON.REC.1401.009 کد اخلاق مقاالت می‌باشد.

### یافته‌های پژوهش

از ۳۷۷ ایزوله مخمری که به روش مولکولی-PCR RFLP شناسایی گردیدند، ۲۶۶ مورد کاندیدا آلیکتس (۱۰/۷) درصد، ۴۰ مورد کاندیدا پاراپسلیوزیس (۱/۶) درصد، ۶ مورد کاندیدا تروپیکالیس (۱/۶) درصد و ۶۴ مورد کاندیدا کروزی (۱/۷) درصد بودند. با توجه به نتایج ارزیابی حساسیت دارویی ایزوله‌های کاندیدا، میزان MIC<sub>90</sub> و MIC<sub>50</sub> کتوکونازول برای همه این ایزوله‌ها  $0.031\text{ }\mu\text{g}/\text{mL}$

**جدول شماره ۳.** الگوی پروفایل حساسیت دارویی ایزوله‌های کاندیدایی مطالعه شده نسبت به دو داروی ضدقارچی کتوکونازول و نیستاتین.

نام محقق (سال)	محل نمونه برداری	تعداد ایزوله‌ها	نام دارو	میزان (g/ml) MIC-rang	ارجاع
رزاقي و همکاران (۲۰۱۴)	ناخن	۱۷۳	نیستاتین	۱۶-۲	۲۳
			کتوکونازول	۰/۸-۰۳۱	
سمیعی و همکاران (۲۰۱۴)	واژن	۵۸	نیستاتین	۴-۱	۲۷
کتیرایی و همکاران (۲۰۱۵)	اوروفارنژیال	۱۰۰	نیستاتین	۰/۱-۰۶	۲۴
			کتوکونازول	۰/۸-۰۶	
امیررجب و همکاران (۲۰۱۶)	سوختگی، تنفسی، دیابت و ...	۴۰	کتوکونازول	۰/۱۶-۲۵	۲۸
بدیعی و همکاران (۲۰۱۶)	خون، ادرار، BAL و خلط	۳۹۷	کتوکونازول	۰/۱۶-۰۱	۲۲
دهقان و همکاران (۲۰۱۷)	دهان (سرطان)	۱۲	نیستاتین	۰/۰۶۴->۱۶	۳۱

هدایتی و همکاران (۲۰۱۸)	مخاط دهان، زیر بغل و واژن	۱۱۱	کتوکونازول	۰/۸-۰۳۲	۲۸
مهدوی و همکاران (۲۰۱۸)	دهان	۱۳۴	کتوکونازول	۰/۴-۰۱۶	۳
هاشمی و همکاران (۲۰۱۹)	واژن	۹۵	نیستاتین	۰/۱۶-۲۵	۳۲
موسوی و همکاران (۲۰۱۹)	ناخن، پوست، واژن و ...	۲۱	نیستاتین	۰/۱۶-۰۳	۱۹
آقایی و همکاران (۲۰۲۰)	ناخن، پوست، واژن و ...	۱۵	نیستاتین	۰/۲-۰۳۱	۵
	ناخن، پوست، واژن و ...	۲۳	کتوکونازول	۰/۲-۰۰۸	
شکوهی و همکاران (۲۰۲۰)	واژن	۱۴۹	نیستاتین	۰/۴-۰۰۶	۱۷
			کتوکونازول	۰/۲-۰۳۱	
کرمانی و همکاران (۲۰۲۱)	دهان	۵۵	نیستاتین	۰/۸-۵	۳
			کتوکونازول	۰/۱۶-۰۱۶	
			کتوکونازول	۰/۲-۰۳۱	
جعفریان و همکاران (۲۰۲۱)	دهان و مری	۲۳	نیستاتین	۸-۲	۲۵
مطالعه حاضر	بالینی مختلف	۳۷۷	نیستاتین	۰/۱۶-۵	--
			کتوکونازول	۰/۱۶-۰۳۱	

## بحث و نتیجه‌گیری

آلیکانس، توجه محققان به ارزیابی حساسیت ضدقارچی جلب شده است. کتوکونازول معمولاً برای عفونت‌های قارچی پوست و غشاء‌های مخاطی (به شکل‌های دارویی متنوع) تجویز می‌شود و مصرف خوراکی آن به سبب خطر آسیب کبدی محدود است. داروی نیستاتین متعلق به کلاس پلی‌بن از عوامل ضدقارچی و داروی مؤثری برای برخی از عفونت‌های قارچی نظیر کاندیدیازیس است (۲۰). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان MIC<sub>50</sub>، MIC<sub>90</sub>، GM و دامنه MIC کتوکونازول برای همه این ایزوله‌های کاندیدا به ترتیب  $\mu\text{g}/\text{mL}$  ۰/۰۳۱،  $\mu\text{g}/\text{mL}$  ۰/۰۶۲،  $\mu\text{g}/\text{mL}$  ۰/۷ و  $\mu\text{g}/\text{mL}$  ۰/۱۶-۰۳۱ بود، درحالیکه این میزان برای نیستاتین به ترتیب  $\mu\text{g}/\text{mL}$  ۰/۵ بود. میزان مقاومت نسبت به داروی کتوکونازول در شیراز، ایلام و ترکیه به ترتیب ۷ درصد (۱۶)، ۳۴/۹ درصد (۴) و ۳۲ درصد (۲۱) گزارش شده است (که دو نرخ اول متعلق به شیراز است). در مطالعه حاضر، میزان MIC<sub>50</sub> کتوکونازول برای همه این ایزوله‌ها  $\mu\text{g}/\text{mL}$  ۰/۰۳۱ بود. میزان مقاومت به داروی کتوکونازول در مطالعه رزاقی و همکاران ۳۴ درصد (۲۳)، مطالعه کتیرایی و همکاران (۱۵) (۲۰۱۵)

در مطالعه حاضر، سویه‌های مخمر جدادشده از کشت نمونه‌های بالینی بیماران مبتلا به کاندیدیازیس در سطح گونه با روش‌های مرسوم و مولکولی PCR-RFLP شناسایی شدند. PCR-RFLP روش قابل اعتمادی برای تعیین گونه‌های کاندیدا نظیر کاندیدا آلیکننس، کاندیدا گلابراتا، کاندیدا پارپیلوزیس و کاندیدا تروپیکالیس است (۱۵). در این مطالعه، از مجموع ۳۷۷ ایزوله، ۷۰/۷ درصد ایزوله‌ها مربوط به کاندیدا آلیکننس و ۲۹/۳ درصد ایزوله‌ها غیر آلیکننس بودند که نشان‌دهنده شیوع بالای کاندیدا آلیکننس در نمونه‌های بالینی مختلف از ایران بود. مطالعات مختلفی از ایران میزان شیوع کاندیدا آلیکننس را به ترتیب با نرخ‌های ۱۷/۵ درصد، ۴۸ درصد، ۵۵ درصد، ۵۶/۸ درصد و ۸۲/۲ درصد از شیراز (۱۶)، مازندران (۱۷)، تهران (۱۸) و کرمان (۱۹) گزارش کردند. این میزان در مطالعه حاضر ۷۰/۵۵ درصد بود. به علت افزایش بیماری‌های ناشی از کاندیدا در افراد مستعد مانند مبتلایان به ایدز، افراد دیابتی، افرادی که از آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف و شیمی‌درمانی استفاده می‌کنند و همچنین افزایش مقاومت دارویی در انواع کاندیدا به ویژه گونه‌های غیر

ایزوله‌های کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا تروپیکالیس گزارش کردند (۳۰)؛ درحالی که این میزان برای داروی نیستاتین  $\mu\text{g}/\text{mL}$   $\text{MIC}_{50}=2$  گزارش گردید که با نتایج مطالعه حاضر تقریباً مطابقت دارد. در مطالعه حاضر، میان گونه‌های کاندیدا و ارزیابی حساسیت دارویی آن‌ها نسبت به داروهای کتوکونازول و نیستاتین ارتباط معنی‌داری وجود داشت ( $P<0.05$ ) که با نتایج سایر مطالعات مطابقت دارد (۳۰، ۲۹). خلاصه‌ای از حساسیت ایزوله‌های بالینی کاندیدا نسبت به دو داروی نیستاتین و کتوکونازول در مطالعات مختلف انجام شده از ایران در جدول شماره ۲ ارائه گردید. میزان دامنه MIC به دست‌آمده در مطالعه حاضر با بیشتر مطالعات انجام شده در ایران (جدول شماره ۲) مطابقت دارد و اختلافات گزارش شده بسیار جزئی است. این تفاوت به‌سبب توزیع و فراوانی گونه‌های مختلف کاندیدا، بروز منطقه‌ای کاندیدیازیس، دموگرافیک بیماران، شرایط بیماری زمینه‌ای بهویژه بیماران با نقص سیستم ایمنی و مقاومت به داروهای ضدقارچ است..

در مطالعه‌ما، بیشترین فراوانی گونه‌های ایزوله شده مربوط به کاندیدا آلبیکنس و سپس کاندیدا کروزی بود. بر اساس نتایج مطالعه‌ما، برای ایزوله‌های کاندیدا داروی کتوکونازول بسیار مؤثرتر از نیستاتین است. الگوی مقاومت دارویی بیانگر تأثیر بهتر کتوکونازول نسبت به نیستاتین است.

### سپاس گزاری

این مقاله مستخرج از پایان‌نامه مقطع دکترای تخصصی قارچ‌شناسی دانشکده علوم پزشکی مربوط به خانم نیوشاد کاوه به راهنمایی آقایان دکتر محمد تقی هدایتی و دکتر آیت‌الله نصرالهی عمران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکابن است..

### تعارض منافع

بدین‌وسیله نویسنده‌گان اعلام می‌کنند که نتایج این تحقیق با منافع هیچ سازمان یا فردی تعارض ندارد.

### کد اخلاق

این مطالعه در دانشگاه آزاد واحد تکابن و با کد اخلاق IR.IAU.TON.REC.1401.009 به تصویب رسیده

۴۷ درصد (۲۴) و جعفریان و همکاران (۲۵)  $47/5$  درصد گزارش گردید، درحالی که میزان مقاومت به داروی کتوکونازول در مطالعه حاضر  $2/12$  درصد است. تفاوت در منشأ ایزوله‌های جمع‌آوری شده از اصلی‌ترین علل تفاوت در نتایج مطالعه‌ما با مطالعات اشاره شده است. در مطالعه رزاقی و همکاران ایزوله‌های کاندیدا بیشتر از ضایعات ناخن و در مطالعه کتیرایی و همکاران از ضایعات مری افراد مبتلا به ایدز تحت درمان با داروی فلوکونازول جمع‌آوری شده بود (۲۴، ۲۳).

میزان دامنه MIC برای داروی نیستاتین در مطالعه رزاقی و همکاران (۲۰۱۴)  $20-16 \mu\text{g}/\text{mL}$  (۲۳)، سمعی و همکاران (۲۰۱۴)  $2 \mu\text{g}/\text{mL}$  (۲۷) گزارش گردید. نتایج مطالعه حاضر برای نیستاتین برای همه ایزوله‌های آزمایش شده،  $\text{MIC}=2 \mu\text{g}/\text{mL}$  و تنها یک ایزوله از کاندیدا واجد  $\text{MIC}\geq 16 \mu\text{g}/\text{mL}$  بود. نتایج مطالعه کتیرایی و همکاران (۲۰۱۵) نشان داد که همه ایزوله‌ها نسبت به نیستاتین ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )  $\text{MIC}_{50}=0.125$  حساس بودند که نتایج آنان با مطالعه حاضر تقریباً مطابقت دارد (۲۴). میزان مقاومت به داروی نیستاتین در مطالعه موسوی و همکاران (۲۰۱۹)  $14/28$  درصد گزارش شد (۱۹). جعفریان و همکاران (۲۰۲۰) دامنه  $\text{MIC}=8-2 \mu\text{g}/\text{mL}$  را برای داروی نیستاتین علیه گونه‌های کاندیدای جداده از مری تعیین کردند (۲۵) که نتایج مطالعه آنان با مطالعه حاضر مطابقت دارد. امیررجب و همکاران (۲۰۱۶) ژئومتریک مین داروی کتوکونازول علیه گونه کاندیدا را  $1.85 \mu\text{g}/\text{mL}$  گزارش نمودند (۲۸)، درحالیکه در مطالعه حاضر این میزان  $0.37 \mu\text{g}/\text{mL}$  است. در مطالعه امیررجب و همکاران (۲۰۱۶)، همه ایزوله‌های بررسی شده از نوع کاندیدا گلابراتا بود. ژئومتریک مین داروی کتوکونازول و نیستاتین برای همه ایزوله‌های کاندیدا در مطالعه شکوهی و همکاران (۲۰۲۰) به ترتیب  $0.28 \mu\text{g}/\text{mL}$  و  $0.08 \mu\text{g}/\text{mL}$  گزارش شد (۲۹)، درحالی که ژئومتریک مین این دو دارو در مطالعه حاضر به ترتیب  $0.37 \mu\text{g}/\text{mL}$  و  $0.037 \mu\text{g}/\text{mL}$  است. کرمانی و همکاران (۲۰۲۱) کمترین مقدار  $\text{MIC}_{50}=0.032$  را برای داروی کتوکونازول در برابر

### سهم نویسنده‌گان

دکتر محمد تقی هدایتی طرح اولیه مطالعه را مطرح و راهنمایی آن را با دکتر آیت الله نصراللهی عمران بر عهده داشتند، اجرای مطالعه و نوشتمن متن اولیه مقاله توسط خانم نیوشما کاوه، آنالیزهای آماری و سازماندهی مطالب توسط دکتر مجتبی تقی زاده و مشاوران علمی و کمک به انجام بهتر تحقیق توسط آقایان دکتر سعید مهدوی عمران و دکتر مهدی عباس تبار انجام شد. متن نهایی با همکاری همه محققین صورت گرفت.

## References

- Arastehfar A, Khodavaisy S, Daneshnia F, Najafzadeh MJ, Mahmoudi S, Charsizadeh A, et al. Molecular identification, genotypic diversity, antifungal susceptibility, and clinical outcomes of infections caused by clinically underrated yeasts, *Candida orthopsis*, and *Candida metapsilosis*: an Iranian multicenter study (2014–2019). *Front Cell Infect Microbiol* 2019; 9:264-75. doi: 10.3389/fcimb.2019.00264.
- Hedayati MT, Armaki MT, Charati JY, Hedayati N, Seyedmousavi S, Denning DW. Burden of fungal infections in Iran. *J Infect Dev Ctries* 2018;12:910-18. doi: 10.3855/jidc.10476.
- Mahdavi Omran S, Rezaei Dastjerdi M, Zuashkiani M, Moqarabzadeh V, Taghizadeh-Armaki M. In vitro antifungal susceptibility of *Candida* species isolated from Iranian patients with denture stomatitis. *Biomed Res Int* 2018; 2018:3086586. doi: 10.1155/2018/3086586.
- Fazeli A, Kordbacheh P, Nazari A, Ghazvini RD, Mirhendi H, Safara M, et al. Candiduria in hospitalized patients and identification of isolated *Candida* species by morphological and molecular methods in Ilam, Iran. *Iran J Public Health* 2019;48:156-61.
- Aghili S R , Abastabar M , Soleimani A , Haghani I , Azizi S. High prevalence of asymptomatic nosocomial candiduria due to *Candida glabrata* among hospitalized patients with heart failure: a matter of some concern? *Curr Med Mycol* 2020;6:1-8.doi: 10.18502/cmm.6.4.5327.
- Sinh CT, Loi CB, Minh NTN, Lam NN, Quang DX, Quyet D, et al. Species Distribution and Antifungal Susceptibility Pattern of *Candida* Recovered from Intensive Care Unit Patients, Vietnam National Hospital of Burn (2017–2019). *Mycopathologia* 2021;186: 543-51.doi: 10.1007/s11046-021-00569-7.
- Khadka S, Sherchand JB, Pokhrel BM, Parajuli K, Mishra SK, Sharma S, et al. Isolation, speciation and antifungal susceptibility testing of *Candida* isolates from various clinical specimens at a tertiary care hospital, Nepal. *BMC Res Notes* 2017;10:1-5. doi: 10.1186/s13104-017-2547-3.
- Khan M, Ahmed J, Gul A, Ikram A, Lalani FK. Antifungal susceptibility testing of vulvovaginal *Candida* species among women attending antenatal clinic in tertiary care hospitals of Peshawar. *Infect Drug Resist* 2018;11:447-56. doi: 10.2147/IDR.S153116.
- Nenoff , P Krüger C, Neumeister C, Schwantes U, Koch D. In vitro susceptibility testing of yeasts to nystatin-low minimum inhibitory concentrations suggest no indication of in vitro resistance of *Candida albicans*, *Candida* species or non-*Candida* yeast species to nystatin. *Clin and Med Invest* 2016;1:71-6. doi: 10.15761/CMI.1000116.
- Rezaei-Matehkolaie A, Shafiei S, Zarei-Mahmoudabadi A. Isolation, molecular identification, and antifungal susceptibility profiles of vaginal isolates of *Candida* species. *Iran J Microbiol* 2016;8:410-17.
- Abastabar M, Mirhendi H, Rezaei-Matehkolaie A, Shidfar MR, Kordbacheh P, Makimura K. Restriction analysis of β-tubulin gene for differentiation of the common pathogenic dermatophytes. *J Clin Lab Anal* 2014;28:91-6. doi 10.1002/jcla.21649.
- Clinical and Laboratory Standards Institute. Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts; Approved Standard-3Th Ed: M27-A3. CLSI, Wayne, PA, USA, 2012.
- Clinical and Laboratory Standards Institute Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts, 4th Ed. M27-S4. CLSI, Wayne, PA, USA, 2017
- Berkow E L, Lockhart SH R, Ostrosky-Zeichner L. Antifungal Susceptibility Testing: Current Approaches. *Clin Microbiol Rev* 2020; 33: e00069-19. doi: 10.1128/CMR.00069-19.
- Mohammadi F, Hemmat N, Bajalan Z, Javadi A. Analysis of Biofilm-Related Genes and Antifungal Susceptibility Pattern of Vaginal *Candida albicans* and Non-*Candida albicans* Species. *Biomed Res Int* 2021; 28:2021:5598907 . doi: 10.1155/2021/5598907.
- Badiee P, Alborzi A. Susceptibility of clinical *Candida* species isolates to antifungal agents by E-test, Southern Iran: A five year study. *Iran J Microbiol* 2011;3:183- 8.
- Shokouhi T, Bandalizdeh Z, Hedayati MT, Mayahi S. In vitro antifungal susceptibility of *Candida* species isolated from oropharyngeal lesions of patients with cancer to some antifungal agents. *Jundishapur J Microbiol* 2011; 4: S19-S26.
- Mohammadi R, Mirhendi H, Rezaei-Matehkolaie A, Ghahri M, Shidfar MR, Jalalizand N, et al. Molecular identification and distribution profile of *Candida* species isolated from Iranian patients. *Med Mycol* 2013;51:657-63. doi: 10.3109/13693786.2013.770603.
- Hamzehee S, Kalantar-Neyestanaki D, Afshari SAK, Mousavi SAA. Molecular identification of *Candida* species, assessment of the antifungal susceptibility and the genetic relationship of *Candida albicans* isolated from immunocompromised patients in Kerman,

- Iran. Gene Rep 2019;17:100484 .doi: 10.1016/j.genrep.2019.100484.
20. Mohamadi J, Motaghi M. Anti-fungal resistance in candida isolated from oral and diaper rash candidiasis in neonates. Bioinformation 2014;10:667-70. doi: 10.6026/97320630010667.
  21. Yenisehirli G, Bulut N, Yenisehirli A, Bulut Y. In vitro susceptibilities of *Candida albicans* isolates to antifungal agents in Tokat, Turkey. Jundishapur J Microbiol 2015;8:e28057. doi: 10.5812/ijm.28057.
  22. Badiee P, Badali H, Boekhout T, Diba K, Moghadam AG, Nasab AH, et al. Antifungal susceptibility testing of *Candida* species isolated from the immunocompromised patients admitted to ten university hospitals in Iran: comparison of colonizing and infecting isolates. BMC Infect Dis 2017;17:727. doi: 10.1186/s12879-017-2825-7.
  23. Razzaghi-Abyaneh M, Sadeghi G, Zeinali E, Alirezaee M, Shams-Ghahfarokhi M, Amani A, et al. Species distribution and antifungal susceptibility of *Candida* spp. isolated from superficial candidiasis in outpatients in Iran. J Mycol Med 2014;24:e43-e50. doi: 10.1016/j.mycmed.2014.01.004.
  24. Katiraei F, Teifoori F, Soltani M. Emergence of azole-resistant *Candida* species in AIDS patients with oropharyngeal Candidiasis in Iran. Curr Med Mycol 2015;1:11-16. doi: 10.18869/acadpub.cmm.1.3.11
  25. Jafarian H, Gharaghani M, Seyedian SS, Mahmoudabadi AZ. Genotyping, antifungal susceptibility, enzymatic activity, and phenotypic variation in *Candida albicans* from esophageal candidiasis. J Clin Lab Anal 2021;35:e23826. doi: 10.1002/jcla.23826.
  26. Lotfali E, Cheraghi Z, Farzaneh Y, Dehbashi Z, Dorrian M, Keymaram M, et al. Antifungal susceptibility to azoles drugs in *Candida* species isolated from patients with onychomycosis. J Cosmet Dermatol Cosmet 2021;12:91-100.
  27. Samiei F, Ajudani Far H, Moazeni M. Molecular identification and antifungal susceptibility of *Candida albicans* isolated from Vulvovaginitis Candidiasis. Int J Mol Clin Microbiol 2014;4:383-8.
  28. Amirrajab N, Badali H, Didehdar M, Afsarian MH, Mohammadi R, Lotfi N, et al. In vitro activities of six antifungal drugs against *Candida glabrata* isolates: an emerging pathogen. Jundishapur J Microbiol 2016;9: e36638. doi: 10.5812/ijm.36638.
  29. Shokoohi G, Rasekh-Jahromi A, Solhjoo K, Hasannezhad A, Nouripour-Sisakht S, Ahmadi B, et al. Molecular characterization and antifungal susceptibility of *Candida* species isolated from vulvovaginitis in Jahrom City, south of Iran. Jundishapur J Microbiol 2020;13:e106825. doi:10.5812/ijm.106825.
  30. Kermani F, Sadeghian M, Shokohi T, Hashemi S, Moslemi D, Davodian S, et al. Molecular identification and antifungal susceptibility testing of *Candida* species isolated from oral lesions in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy. Curr Med Mycol 2021;7:44-50. doi: 10.18502/cmm.7.1.6242. 10.18502/CMM.7.1.6242
  31. Mohammadi F, Javaheri MR, Nekoeian S, Dehghan P. Identification of *Candida* species in the oral cavity of diabetic patients. Curr Med Mycol 2016;2:1.7 .doi: 10.18869/acadpub.cmm.2.2.4.
  32. Hashemi SE, Shokohi T, Abastabar M, Aslani N, Ghadamzadeh M, Haghani I. Species distribution and susceptibility profiles of *Candida* species isolated from vulvovaginal candidiasis, emergence of *C. lusitaniae*. Curr Med Mycol 2019;5:26-34. doi: 10.18502/cmm.5.4.2062.