

◆ آنالیز بیوانفورماتیکی تأثیر Linalool (Scrophularia striata) تشنهداری

بر پروتئین VacA هلیکوباکتر پیلوری

* بهمن فاضلی نسب^۱

(۱) گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۸/۱۷

چکیده

مقدمه: برخی گیاهان از جمله تشنهداری، به طور سنتی در میان مردم زاگرس نشین، به عنوان التیام بخش عفونت و زخم استفاده می‌شده است. در تحقیقات پیشین، اثر التیام بخشی عصاره آبی و هیدروکلری آن بر استرس اکسیداتیو و درمان زخم معدہ ناشی از اتانول در موش صحرایی تأیید شده است. بر اساس این، هدف از تحقیق حاضر، آنالیز بیوانفورماتیکی تأثیر Linalool (یکی از بیشترین اجزای تشنهداری) بر مهار پروتئین VacA هلیکوباکتر پیلوری است.

مواد و روش‌ها: توالی‌های DNA و پروتئینی Linalool گیاه آرایدوبیسیس و توالی ژن VacA هلیکوباکتر پیلوری از سراچه NCBI تهیه شد. میزان هم‌ردهی توالی‌های DNA و پروتئین VacA و Linalool با Clustalw vol.2 توسط نرم‌افزار MEGA vol.5 ترسیم شد. برای تعیین ساختار سوم و همچنین داکینگ مولکولی بر اساس همولوژی، توسط نرم‌افزار Galaxy Web ESYPred3D، Swiss-Model و همچنین صورت گرفت.

یافته‌های پژوهش: پروتئین‌های لینالول گزارش شده در سراچه NCBI، در بیشتر گیاهان، سه موتیف حفاظت شده (در محدوده ۱۰۰ تا ۳۰۰ اسید آمینه) دارد. پروتئین VacA هر سه نوع دومین سیتوپلاسمی، غشایی و کیتازی را دارد. بهترین الگوی داکینگ مولکولی بر اساس بیشترین اثر متقابل میان پروتئین لینالول و پروتئین VacA (۲۱/۰) و بیشترین دقت (۱۳۳/۰) انتخاب شد. نتایج نشان داد که در ساختار هر دو پروتئین لینالول و VacA، گروه‌های گوناگونی از جمله گروه‌های آیفاتیک (چربی)، قطبی و آبدوست داشت. حضور چربی و آبدوست بودن در پروتئین VacA این قابلیت را می‌دهد که بتواند در صورت تجزیه نشدن، توسط سلولی‌های لنفوцитی، به راحتی از غشای سلول‌ها عبور کند و سبب بیماری‌زایی شود. از سویی، حضور همین گروه‌ها در لینالول نیز عاملی است که توانسته است پروتئین VacA را مهار کند.

بحث و نتیجه‌گیری: آنالیز بیوانفورماتیکی نشان داد که لینالول سبب از میان بردن آثار هلیکوباکتر پیلوری می‌شود؛ همچنین نتایج پژوهش حاضر می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای تحقیقات آینده، برای ارزیابی تأثیر تک‌تک مواد مؤثر تشنهداری بهوژه لینالول، بر باکتری هلیکوباکتر پیلوری استفاده شوند.

واژه‌های کلیدی: داکینگ مولکولی، گل میمون سازویی، پروتئین VacA، سرطان معده

* نویسنده مسئول: گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

Email:Bfazeli@uoz.ac.ir

مقدمه

هليکوباكتر پيلوري باكتري گرم منفي، كند رشد، مارپيچي شكل و ميكروآئروفيل است که به ايجاد طيف متنوعی از بيماريها چون گاستريت ساده، زخم معده، التهاب معده، التهاب و زخم دوازده، لنفوماى MALT و سرطان معده منجر مى شود(۱). ميزان عفونت ايجادشده توسيط هليکوباكتر پيلوري در جهان، به طور ميانگين در حدود ۵۰ درصد است. باين حال، ميزان شبيوه عفونت با اين باكتري در كشورهای آسيوي، بالاتر و در حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد است(۲). در ايران نيز عفونت ناشی از هليکوباكتر پيلوري، تقريباً ۸۲-۹۲ درصد گزارش شده است(۲).

هليکوباكتر پيلوري در ميان باكتريهای انتريک، بيشترین ناهمگونی ژنتيكي را نشان می دهد؛ علاوه بر اين، بسياری از سويههای اين باكتري، از لحاظ محتوای ژنتيكي و توالی ژن های حفاظت شده، متنوع هستند؛ بنابراین، ابتلا به هليکوباكتر پيلوري به عوامل گوناگونی از قبيل شرایط محيطی، سطح بهداشت اجتماعی و نژاد افراد مبتلا و همچنین ويژگی های خود اين ارگانيسم مانند حضور ژن های بيماري زاي گوناگون از جمله babA، homB، cagA، vacA، iceA، dupA و CagA بستگی دارد (۳). در ميان عوامل بيماري زاي (A) و VacA (يک سيتووكسين مرتبط با ژن (A) در ۶۰-۷۰ درصد از سويههای هليکوباكتر پيلوري دیده شده است (۴). ژن VacA عامل مهم بيماري زاي ديگري را كد می كند که سبب ايجاد واکوئل در سطح سلول های هسته دار (يوکاريوت) در شرایط آزمایشگاهی می گردد (۵).

سه ژن VacA، dupA و cagA هليکوباكتر پيلوري، در بيشتر بيماري های معده گزارش شده؛ اما ژن VacA به طور معناداري ($P < 0.036$) در بيماري زخم معده نسبت به ساير ژن ها، بيشتر موجود بوده و نقش اصلی نيز در پيشرفت بيماري گاستروودونال داشته، در حالی که dupA با زخم اثناشری در ارتباط بوده است (۶)؛ همچنین در پژوهشی، ژن های VacA، dupA و babA، homB، hrgA، cagE، cagT، cagA هليکوباكتر پيلوري، به عنوان عامل گاستريت مزمن فعال، با بيماري زخم معده مرتبط دانسته اند (۷).

بر اساس تحقیقات گذشته، سویههای تولید کننده ژن های بیماری زای vacA و ureAB، cagA، در بیماران با علائم کلینیکی مختلف مانند گاستریت، زخم معده، زخم دئودنوم و التهاب مری همراه با رفلکس، شیوه بیشتری دارند (۸).

در بعضی از تحقیقات نشان داده شده است که ژن های VacA و CagA، عوامل بیماری زای اصلی در پاتولوژی معده در افراد مبتلا به سرطان معده هستند (۸) و برخی ديگر، ميان سرطان معده و هليکوباكتر پيلوري ارتباطی پيدا نکرده اند (۶)؛ اما در مجموع، هليکوباكتر پيلوري توسيط انجمن بين المللی تحقیقات سرطان International agency for research on (IARC)، يکی از زيرمجموعه های سازمان جهانی بهداشت (WHO)، به عنوان عامل باكتريائي سرطان زای تيپ يك شناسايی شده است (۹). در ميان عوامل بيماري زاي، VacA و CagA در ۶۰-۷۰ درصد از سويههای هليکوباكتر پيلوري دیده شده اند (۴). چون VacA پروتئين بزرگتری نسبت به cagA است؛ پس احتمالاً دومین های بيشتر و کارکرد بيشتری نيز دارد؛ اما چون پروتئين cagA کوچک است؛ پس سلول باكتري زحمت کمتری برای ترشح متحمل می شود و اين پروتئين به راحتی از غشا عبور می کند و توانايی حمله بيشتری دارد (۱۰). از سوبي، در اشخاص بيمار، هر دو نوع پروتئين یافت شده اند. به نظر مي رسد که پروتئين cagA که پروتئين کوچکتری است، در ابتدای آلدگي وارد عمل می شود و سپس پروتئين VacA عمل می کند و بيماري را گسترش می دهد و به سوي سرطاني شدن سوق خواهد داد و چون ژن VacA به طور معناداري در بيماري زخم معده، بيشتر از ساير ژن ها موجود است و نقش اصلی نيز در پيشرفت بيماري گاستروودونال، زخم و همچنین سرطان معده دارد (۷)؛ در نتيجه، ژن VacA برای اين تحقيق انتخاب و در تحقيق بعدی نيز cagA بررسی خواهد شد.

درمان زخم معده با داروهای شيميائي نظير امپرازول، مترونيدازول، رانيتيدين و همراه با عوارض جانبی و بروز مشكلاتي نظير پديده خودايمنی است و احتمال بازگشت ضایعات پس از قطع درمان، با آنها وجود دارد؛

دی (۴/۷ درصد) مهم‌ترین ترکیب‌های عطرمايه را تشکيل مي‌دهند(۱۸).

استفاده از تشندهداری به صور گوناگونی از قبيل جوشانده خواراکی، بخور و ضماد، در درمان بیماری‌های متفاوت از جمله التهاب و عفونت چشم و گوش، سوختگی‌های پوستی، زخم‌های عفونی، اپیزیاتومی، درد و اختلالات گوارشی، سرماخوردگی، هموروئید، کورک، ضدعفونی مجاری اداری و گوارشی مؤثر است (۲۰، ۲۱)؛ همچنین عصارة آبی و هیدروالکلی گیاه تشندهداری بر ترمیم زخم باز پوستی در خرگوش (۱۹)، بر روی رفتارهای اضطرابی و افسردگی در موش‌های سوری نر بالغ (۲۰)، استرس‌های اکسیدانتیو ناشی از رفتارهای عصبی (۲۱)، ترمیم زخم سوختگی درجه ۲ موش صحراي (۲۲)، کاندیدا البيكنس (Candida albicans) در شرایط آزمایشگاهی (۲۳) و بر استرس اکسیدانتیو و درمان زخم معده ناشی از اتانول در موش صحراي (۱۵)، اثر التیام‌بخشی دارد. با توجه به اينکه تاکتون در هیچ پژوهشی، اثر تک‌تک مواد تشکيل‌دهنده تشندهداری بر باكتري‌ها، بهويژه هليکوباکتر پيلوري و نقش آن بر زخم و حتى سلطان معده ببرسي نشده است؛ درنتيجه، در اين تحقيق تلاش گردید با ببرسي مهم‌ترین مواد تشکيل‌دهنده عطرمايه تشندهداری (۱۸)، ماده فيتوشيمياي Linalool با ميزان ۱۸/۳ درصد، انتخاب و سپس آناليز بيونافورماتيكي آن را بر پروتئين VacA، مهم‌ترین عامل ايجادکننده زخم معده (هليکوباکتر پيلوري) بررسی شود.

مواد و روش‌ها

التیام‌بخشی عصارة آبی و هیدروالکلی گیاه تشندهداری بر استرس اکسیدانتیو و درمان زخم معده ناشی از اتانول در موش صحراي: ابتدا تحقيقي در سال ۲۰۱۷، مبني بر ارزیابي تأثير عصارة آبی (۱۰۰ و ۴۰۰ ميلي‌گرم به ازاي کيلوگرم وزن بدن) و هیدروالکلی (۱۰۰ و ۴۰۰ ميلي‌گرم به ازاي کيلوگرم وزن بدن) گیاه تشندهداری (جمع‌آوری شده از دامنه رشته کوه زاگرس در استان ايلام) بر زخم معده (ايجادشده با ۴ ميلي‌لิتر اتانول ۷۵ درصد بهصورت خواراکی و خورانده شده با استفاده از شمارگر(۲۴))، بر ۶۰ سر موش نر صحراي

به همین علت، تلاش گسترهای برای یافتن ترکیبات مؤثر طبیعی و گیاهی در درمان زخم معده وجود دارد (۱۱).

گیاهان دارویی منابع طبیعی ارزشمندی هستند که امروزه مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته‌اند و به عنوان مواد اوایله برای تبدیل به داروهای بی‌خطر برای انسان تلقی می‌شوند. در این زمینه، ایران یکی از غنی‌ترین منابع گیاهان دارویی جهان به شمار می‌رود که تنوع بالای شرایط زیستگاهی برای انواع این گیاهان را دارد (۱۴-۱۲).

گل میمون سازویی (*Scrophularia striata*) با نام محلی تشندهداری، گیاهی خودرو، چندساله و از تیره گل میمون است که در بیشتر مناطق معتدل و گرمسیری ایران از جمله ايلام و مناطقی از استان خوزستان، كرمانشاه، كردستان، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، چهارمحال بختیاری و كهکيلويه و بويراحمد يافت می‌شود (۱۵). با آنکه ترکیبات شيميائي اين گیاه، پيشتر شناسايی نشده بود؛ اما مردم ساكن استان ايلام سال‌هاست که به صورت تجربی، از اين گیاه به صور گوناگونی از قبيل جوشانده خواراکی، بخور و ضماد، در درمان بیماری‌های متفاوتی از جمله التهاب و عفونت چشم و گوش، سوختگی‌های پوستی، زخم‌های عفونی، اپیزیاتومی، درد و اختلالات گوارشی، سرماخوردگی، هموروئید، کورک و... استفاده می‌کنند(۱۵، ۱۶)؛ همچنین اين گیاه، نه تنها اثر نيرومendi برای ضدعفونی مجاری اداری و گوارشی دارد، بلکه آثار متعددی از جمله تنظيم و کم کردن فشارخون و درمان افسردگی دارد. از سرشاخه‌های اين

گیاه، به عنوان تقویت‌کننده معده استفاده می‌شود. در تیره گل میمون، ترکیباتی نظیر آلكالوئید، رزین گلیکوزید، ایریدوئید، کرپیتوفیلیک‌اسید و فلاونوئیدها شناسايی شد (۱۷). در پژوهشی، از مواد تشکيل‌دهنده *Scrophularia* موجود در عطرمايه تشندهداری (striata) درمجموع، ۳۴ ترکيب شناسايی شد که ۹۰/۳ درصد کل عطرمايه را شامل می‌شوند. لينالول (۱۸/۳ درصد)، ع ۱۰، ۱۴ ترى‌متيل پنتا دكان-۲-اون (۸/۴ درصد)، دى‌بوتيل فتالات (۶/۹ درصد)، بتا-داماکسون (۵/۹ درصد)، آلفا-تریپينثول (۴/۹ درصد) و جرمакرن

vol.5 از توالی الین (همتراز) شده در Clustalw و روشن Neighbor Joining ترسیم گردید. برای تعیین ساختار سوم و همچنین داکینگ مولکولی بر اساس همولوژی، از نرم‌افزار Swiss-Galaxy Web Model و ESYPred3D و همچنین Weblab استفاده شد. برای تجسم این مدل از نرم‌افزار RASmol (<http://rasmol.org>) و ViewerLite vol.4 استفاده گردید. ارزیابی کیفیت استروکیمیکال ساختار سه‌بعدی پروتئین‌ها، به وسیله آنالیز PROCHECK (<http://www.ebi.ac.uk/pdbsum/procheck>) صورت گرفت و نمودار راماچاندران مربوط به ساختار سه‌بعدی پروتئین‌ها رسم شد. در تحقیق حاضر هیچ نوع نمونه انسانی و حیوانی استفاده نشده است و همچنین کد اخلاق IR.UOZ.REC.1399.002 از دانشگاه زابل دارد.

یافته‌های پژوهش


نتایج التیام‌بخشی عصاره آبی و هیدروالکلی گیاه تشنه‌داری بر استرس اکسیداتیو و درمان زخم معدة ناشی از اتانول در موش صحرایی نشان داد که SOD و MAD با افزایش سطوح تیمارهای مختلف عصاره، کمتر؛ اما TAC بیشتر شده است همچنین نتایج تشریح معده نیز نشان داد که عصاره آبی و هیدروالکلی، بر کاهش میزان و ابعاد زخم معده تأثیر مثبت داشته و سبب ترمیم زخم معده شده‌اند؛ اما میان آن‌ها اختلاف معناداری وجود نداشته است. هرچند، عصاره آبی توانسته است ابعاد زخم معده را نسبت به شاهد منفی ۶۶/۶۹ درصد و نسبت به شاهد مثبت ۶۶/۹۰ درصد کاهش دهد، عصاره هیدروالکلی نسبت به شاهد منفی ۴۰/۸۶ درصد و نسبت به شاهد مثبت ۵۰ درصد کاهش داده است؛ همچنین با افزایش میزان عصاره، تعداد و ابعاد زخم معده کمتر شده است (۱۵).

با توجه به اینکه حضور لینالول (۱۸/۳ درصد) در عطرمایه تشنه‌داری (*Scrophularia striata*) تأیید شده (۱۸)؛ اما هنوز توالی ژن و پروتئین آن مشخص نگردیده است؛ بنابراین، ابتدا سعی شد همه توالی‌های ارائه‌شده برای DNA و پروتئین این ژن از سراچه NCBI تهیه و سپس از لحاظ شاخص dN/dS، مناطق


بالغ با محدوده وزنی ۲۰۰-۲۵۰ گرم (تنهه شده از مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان) انجام گردید (۱۵)؛ سپس خون‌گیری و آنالیز بیوشیمیابی TAC (ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام)، با استفاده از کیت TAC شرکت ZellBio آلمان (Zellbio GmbH, Deutschland) (سوپراکسید دیسموتاز) و MDA (مالون دی‌آلدید)، با استفاده از کیت TAC شرکت ZellBio آلمان (Zellbio GmbH, Deutschland)، بر روی موش‌های نر صحرایی بالغ صورت گرفت؛ سپس تشریح معده از لحاظ زخم و بهبودی بررسی شد (۲۵). شناسایی توالی‌های ژن Linalool و پروتئینی VacA: توالی‌های DNA و پروتئینی VacA (فرمت Fasta) گیاه آراییدوپسیس (رشادی گوش‌موشی) (کد دسترسی: AF497485) و توالی ژن VacA (Vacuolating cytotoxin) VacA (AAB53868) Helicobacter pylori (کد دسترسی: NCBI از وبسایت (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) تهیه گردید. آنالیز و بررسی بیوانفورماتیکی: از چندین نرم‌افزار آنلاین برای آنالیز توالی‌های DNA و پروتئینی VacA رشدی گوش‌موشی و باکتری Linalool Helicobacter pylori بیوانفورماتیکی و مقایسه‌ای DNA و پروتئین Expasy و NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) (انالیز (<http://expasy.org/tools>) میزان هم‌دیفی توالی‌های DNA و پروتئینی توسط Clustalw نرم‌افزار (<http://www.ebi.edu.au/tools/clustalw>) بررسی شد. موتیف‌های حفاظت‌شده با استفاده از Multiple Em for Motif Elicitation برنامه MEME (MEME) vol.4.8 (در سایت (<http://meme.nbcr.net/meme/meme.html>) جستجو گردید (۲۶). پارامترهایی که در آنالیز MEME به کار گرفته شدند، عبارتند از: کمترین و بیشترین اندازه برای هر موتیف به ترتیب ۱۰۰ و ۳۰۰، بیشترین تعداد موتیف‌های جستجو شده ۳ و تعداد تکرار برای هر توالی ۱. درخت فیلوجنی به وسیله نرم‌افزار MEGA

دیگر، بیانگر نزدیکی توالی این ژن در میان سایر گونه‌هاست و بر اساس آنچه از dN/dS به دست آمد، می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات، در میان مناطق حفاظت‌شده یا همان موتیف‌ها و دومین‌ها اتفاق افتاده است؛ همچنین پروتئین‌های لینالول گزارش شده در سراچه NCBI در بیشتر گیاهان سه موتیف حفاظت‌شده (در محدوده ۱۰۰ تا ۳۰۰ اسید آمینه) دارد؛ بر اساس این، از پروتئین لینالول گیاه مدل یعنی رشدی گوش‌موشی، به عنوان مدلی از تشنه‌داری، برای این تحقیق استفاده شد.


حفظت شده، موتیف‌ها و دومین‌ها بررسی شود (شکل‌های شماره ۱، ۲، ۳). سرانجام مشخص شد که مقدار عددی (dN/dS) برابر ۰/۷۸ است و چون این عدد کمتر از یک بود؛ درنتیجه نشان‌دهنده این است که انتخاب خالص بر ژن بررسی شده اتفاق افتاده و سبب تغییرات کلیدی نشده است. در نتایج تجزیه خوش‌های (شکل شماره ۴)، توالی‌های بیشتر گونه‌های گیاهی یکسان، در گروه‌های جداگانه قرار گرفتند که نشان‌دهنده حفاظت توالی ژن لینالول در درون هر گونه است؛ همچنین قرار گرفتن برخی گیاهان در خوش‌های




شکل شماره ۱. منطقه حفاظت‌شده در توالی DNA ژن لینالول در رشدی گوش‌موشی



شکل شماره ۲. تعداد، توالی، E-Value، تعداد اسید آمینه و ماتریکس شباهت موتیف‌های موجود در پروتئین linalool




شکل شماره ۳. تعداد و موقعیت موتیف‌های موجود در پروتئین linalool




شکل شماره ۴. درخت فیلوزنی به دست آمده از همهٔ توالی‌های DNA زن لینالول گزارش شده در NCBI

داشته‌اند؛ درنتیجه، یکی از زن VacA با کد دسترسی AAB53868، برای داکینگ مولکولی انتخاب گردید؛ همچنین بر اساس اینکه زن‌های بیماری‌زا باکتریایی ترشحی هستند؛ پس بایستی دومین غشایی (شکل شماره ۹) و احتمالاً دومین‌های سیتوپلاسمی و کینازی نیز داشته باشند؛ بنابراین، برای صحت مراحل آزمایش و اطمینان بیشتر، این دومین‌ها، ارزیابی و مشخص شد که زن VacA، هر سه نوع دومین مدنظر را دارد (شکل‌های شماره ۸، ۹، ۱۰).

با توجه به اینکه زن VacA به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین زن‌های بیماری‌زایی در باکتری هلیکوباتر پیلوری شناخته شده است؛ بنابراین برای استفاده، ابتدا همهٔ توالی‌های گزارش شده در NCBI تهیه و سپس باهم ارزیابی گردید و مناطق حفاظت شده، موتیف‌ها و دومین‌های آن بررسی و بر اساس موتیف‌های ۶ تا ۱۰۰ اسید آمینه‌ای مشخص شد که ۶ موتیف داشت (شکل‌های شماره ۵، ۶، ۷) و با توجه به اینکه همهٔ توالی‌های موتیف‌های یکسان و حفاظت شده‌ای




شکل شماره ۵. منطقهٔ حفاظت شده در توالی پروتئین زن VacA در باکتری هلیکوباتر پیلوری




شکل شماره ۶. توالی و E-Value موتیف‌های موجود در توالی‌های ژن VacA هلیکوباکتر پیلوئی گزارش شده در NCBI




شکل شماره ۷. موقعیت موتیف‌های موجود در توالی‌های ژن VacA هلیکوباکتر پیلوئی گزارش شده در NCBI



شکل شماره ۸. دومین غشایی، کینازی و سیتوپلاسمی موجود در پروتئین VacA (کد دسترسی: AAA86834)




شکل شماره ۹. انواع دومین‌های غشایی موجود در پروتئین VacA (کد دسترسی: AAA86834)




شکل شماره ۱۰. انواع دومین‌های کینازی موجود در پروتئین VacA (کد دسترسی: AAA86834)

گردید (جدول شماره ۱؛ شکل شماره ۱۳). گفتنی است که در ساختار هر دو پروتئین لینالول و VacA گروه‌های مختلفی از جمله گروه‌های آیفاتیک (چربی)، قطبی و آبدوست موجود بود (شکل شماره ۱۴) که حضور چربی و آبدوست بودن در پروتئین VacA، به آن این قابلیت را داده است که بتواند در صورت تجزیه نشدن توسط سلولی‌های لنفویتی، به راحتی از غشای سلول‌ها عبور کند و سبب بیماری زایی شود؛ به همین علت است که مهم‌ترین زن بیماری زایی هلیکوبتاکتر پیلوری است و علاوه بر زخم معده، باعث سرطان معده نیز خواهد شد.


برای تأثیر احتمالی پروتئین لینالول بر پروتئین VacA، ابتدا ساختار سوم پروتئین لینالول (شکل شماره ۱۱A) و VacA (شکل شماره ۱۱B)، به همراه کیفیت ساختار سوم پیش‌بینی (شکل شماره ۱۲) و سپس مناطق حفاظت‌شده و موتیف‌ها، شناسایی و در نهایت، بخشی از منطقه حفاظت‌شده پروتئین لینالول بر بخشی کلیدی از پروتئین VacA داکینگ مولکولی شد و بر اساس اینکه لینالول بر VacA واکنش نشان خواهد داد و به آن پیوند و مانع فعالیت آن خواهد شد؛ الگوهایی پیش‌بینی شده بود که سرانجام، بهترین الگو بر اساس بیشترین اثر متقابل میان پروتئین لینالول و پروتئین VacA (۲۱/۰) و بیشترین دقیقت (۱۳۳/۰) انتخاب




شکل شماره ۱۱. ساختار سوم پروتئین لینالول رشادی گوش‌موسی (A) و VacA هلیکوباتر پیلوئی (B)



شکل شماره ۱۲. نمودارهای کیفیت الگوی ساخته شده ساختار سوم پروتئین لینالول (A) و پروتئین VacA (B)



شکل شماره ۱۳. نتیجه داکینگ مولکولی پروتئین لینالول رشدادی گوش‌موشی (سمت چپ قسمت A) بر پروتئین VacA هلیکوباتر پیلوری (سمت چپ قسمت B) و ساختار سه بعدی پروتئین نهایی (سمت راست)



شکل شماره ۱۴. موقعیت گروههای مختلف آبیفایک (A)، قطبی (B)، آب‌دوسست (D) و ساختار آلفا هلیکس (C) در الگوی نهایی به دست آمده از ترکیب لینالول و VacA

جدول شماره ۱. انواع الگوهای پیش‌بینی شده برای داکینگ مولکولی میان لینالول و ژن VacA

Model	Protein template	Peptide template	Protein structure similarity (TM-score)	Interaction similarity score	Estimated accuracy
1	3A79_A	3A79_C	0.450	21.0	0.133
2	3TWR_D	3TWR_E	0.446	7.0	0.098
3	3TWT_B	3TWT_E	0.458	-9.0	0.075
4	3AX3_G	3AX3_B	0.453	-3.0	0.083
5	3A79_B	3A79_C	0.448	3.0	0.091
6	3Twx_B	3Twx_C	0.444	7.0	0.096
7	3TWW_A	3TWW_C	0.458	-13.0	0.066
8	3TWS_D	3TWS_E	0.441	6.0	0.091
9	3TWW_B	3TWW_C	0.437	7.0	0.090
10	3TWS_A	3TWS_E	0.447	-7.0	0.067

به تسریع ترمیم زخم و کاهش عوارض ناشی از آن منجر شود. از سویی، مؤثر بودن تشنه‌داری در روند ترمیم می‌تواند به علت وجود ترکیبات گلیکوزیدی ایریدوئیدی در بخش‌های مختلف این گیاه باشد که با مهار تولید پروستاگلاندین E2، ایترلوکین‌های (interleukin) مختلف (IL-1 α , IL2, IL-4)، فاکتور نکروزدهنده تومورگاما و ایترتفرون سبب کاهش ادم و ارتashاج سلولی و کاهش تکثیر لنفوسيت‌های T شوند(۳۲، ۳۳)؛ همچنین با افزایش رشد فیبروبلاست‌ها، زمینه را برای ترشح بیشتر کلائزن و درنتیجه ترمیم سریع تر زخم فراهم می‌کند(۳۰). علاوه بر این، وجود گلیکوتربنوتئیدهای متفاوت در دیگر گونه‌های خانواده تشنه‌داری، سبب کاهش ادم و توقف ارتashاج سلولی می‌شوند و خاصیت ضد التهابی دارند(۳۴). البته وجود گلیکوزیدهای فیل پروپانوئید که مهارکننده فعالیت ماکروفاز و درنتیجه، مهار تولید واسطه‌های شیمیایی التهابی و کاهش التهاب است(۳۲) و وجود اسیدهای فنولیک با خاصیت ضدباکتریانی در برخی گونه‌های دیگر تشنه‌داری (۳۳)، دلیل دیگری برای مؤثر بودن تشنه‌داری در التیام زخم معده است.

با توجه به تأثیر مثبت تشنه‌داری بر درمان زخم معده و حضور فراوان لینالول در تشنه‌داری و از سویی، حضور گروههای چربی و آبدوست بودن لینالول نیز عاملی بوده که توانسته است پروتئین VacA را مهار کند. این پژوهش، علاوه بر اینکه می‌تواند صحتی بر پژوهش‌های انجام‌شده پیشین باشد(۱۵، ۲۴)؛ همچنین می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای پژوهش‌های آینده برای ارزیابی تأثیر تک‌تک مواد مؤثرة تشنه‌داری، بهویژه

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از تغییرات نوکلئوتیدی که سبب تغییر اسید آمینه شده‌اند (dN)، نسبت به تغییرات نوکلئوتیدی که تأثیری در اسید آمینه حاصل نداشته‌اند (dS)، یک روش کارآمد برای تشخیص روند انتخاب طبیعی در طول تکامل برای ژن‌ها است (۲۷). اگر این نسبت از یک بیشتر باشد، انتخاب مثبت، اگر کمتر از یک باشد، انتخاب خالص و اگر برابر یک باشد، انتخاب خنثی را در طی تکامل این ژن‌ها نشان می‌دهد (۲۸). در این پژوهش، مقدار عددی این نسبت (dN/dS) برای پروتئین‌های لینالول گزارش شده در همه گیاهان، کمتر از یک (۰/۷۸) بود و نشان داد که انتخاب خالص بر ژن بررسی‌شده اتفاق افتاده و سبب تغییرات کلیدی نشده است. نتایج حاصل از بررسی موتیفها و مناطق حفاظت‌شده و همچنین جداسازی نکردن ژنوتیپ‌ها بر اساس موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن بیشتر ژنوتیپ‌ها در یک گروه، بیانگر شباهت چشمگیر و تنوع پایین میان ژنوتیپ‌ها است که می‌تواند مربوط به حفاظت‌شده‌گی بالای ناحیه rbcI و تغییرپذیری اندک این ناحیه باشد؛ همچنین مقایسه توالي rbcI در دو رده سیانوباکتری و چند جنس گیاهان، تشابه بسیاری میان توالي آن‌ها نشان داد(۳۰) که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

ترمیم زخم مراحل گوناگونی از التهاب، تکثیر و بازسازی دارد که هر کدام از این‌ها، خود از مراحل متعدد دیگری تشکیل شده‌اند که پاره‌ای از آن‌ها باهم تداخل دارند و به راحتی از هم تفکیک شدنی نیستند (۳۱)؛ بنابراین، بهبود کمی و کیفی هر کدام از مراحل می‌تواند

با توجه به آمار بالای آلودگی توسط هلیکوباکتر پیلوری، محققان کشورهای مختلف جهان تلاش برای شناسایی دقیق همهٔ فاکتورهای ویرولانس هلیکوباکتر پیلوری و مهار آلودگی و یافتن راهکار دقیق شناسایی سویه‌های با خطر بالا را در دستور کار خود قرار داده‌اند (۳۹)؛ همچنین بر اساس تحقیقات انجام‌شده که نشان دادند ژن‌های cagA و VacA بیشترین نقش را در زخم، عفونت و سرطان معده داشته‌اند و بر اساس نتایج In Silico مطالعهٔ حاضر مشخص شد مادهٔ فیتوشیمیایی لینالول که بیشترین بخش عطرماهیّهٔ تشنه‌داری را تشکیل می‌دهد، توانایی مهار پروتئین VacA را دارد.

سپاسگزاری

تحقیق حاضر در کمیتهٔ اخلاق دانشگاه زابل با کد اخلاق IR.UOZ.REC.1399.002 تایید شده است.

لينالول، بر باکتری هلیکوباکتر پیلوری باشد و در نهایت، برای کم کردن و یا از بین بردن آثار هلیکوباکتر پیلوری استفاده شوند.

Verbascum که گیاه ماهور (*speciocum*) با افزایش قطر عروق خونی (۳۵)، *Elaeagnus angustifolia* با عصارهٔ میوهٔ سبجد (۳۶)، گیاه غاریاقی خاصیت ضدالتهابی و ضددردی (۳۷) با افزایش کشش پوست (*Falcaria vulgaris*) (۳۸) و *Actinidia Deliciosa* (کیوی) با خواص پروتئولیتیک (۳۸) می‌تواند بهبود زخم را تسريع کنند. با توجه به خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی تشنه‌داری و محرك تولید فیبروبلاست بودن آن (۱۵) و نتایج In Silico مهار پروتئین VacA توسط لینالول در این مطالعه می‌تواند تأثیری بر تأثیر انواع عصاره‌های گیاه تشنه‌داری در ترمیم زخم و عفونت‌ها باشد.

References

1. Signal V, Gurney J, Inns S, McLeod M, Sika-Paotonu D, Sowerbutts S, et al. *Helicobacter pylori*, stomach cancer and its prevention in New Zealand. Journal of the Royal Society of New Zealand. 2020; 50(3):397-417. <https://doi.org/10.1080/03036758.2019.1650081>
2. Ahmadi E, Amini K, Sadeh M. Prevalence of cagA, cagT, cagE, vacA and hrgA genes in *Helicobacter pylori* strains isolated from patients with gastric cancer in Karaj city, 2016. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2018; 21(6):562-8.
3. De Bruyne E, Ducatelle R, Foss D, Sanchez M, Joosten M, Zhang G, et al. Oral glutathione supplementation drastically reduces *Helicobacter*-induced gastric pathologies. Sci Rep. 2016; 6(1):1-13. <https://doi.org/10.1038/srep20169>
4. Hammond CE, Beeson C, Suarez G, Peek Jr RM, Backert S, Smolka AJ. *Helicobacter pylori* virulence factors affecting gastric proton pump expression and acid secretion. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology. 2015; 309(3):G193-G201. <https://doi.org/10.1152/ajpgi.00099.2015>
5. Gaddy JA, Radin JN, Cullen TW, Chazin WJ, Skaar EP, Trent MS, et al. Chemodetection and destruction of host urea allows *Helicobacter pylori* to locate *Helicobacter pylori* resists the antimicrobial activity of calprotectin via lipid A modification and associated biofilm formation. mBio. 2015; 6(6):e01349-15. <https://doi.org/10.1128/mBio.01349-15>
6. Idowu A, Mzukwa A, Harrison U, Palamides P, Haas R, Mbao M, et al. Detection of *Helicobacter pylori* and its virulence genes (cag A, dup A, and vac A) among patients with gastroduodenal diseases in Chris Hani Baragwanath Academic Hospital, South Africa. BMC gastroenterology. 2019; 19(1):73. <https://doi.org/10.1186/s12876-019-0986-0>
7. Essawi T, Hammoudeh W, Sabri I, Sweidan W, Farraj MA. Determination of *Helicobacter pylori* virulence genes in gastric biopsies by PCR. ISRN gastroenterology. 2013; 2013:Article ID 606258. <http://dx.doi.org/10.1155/2013/606258>
8. Obayashi N, Ohtsuka Y, Hosoi K, Ikuse T, Jimbo K, Aoyagi Y, et al. Comparison of gene expression between pediatric and adult gastric mucosa with *Helicobacter pylori* infection. Helicobacter. 2016; 21(2):114-23. <https://doi.org/10.1111/hel.12245>
9. Huang JY, Sweeney EG, Sigal M, Zhang HC, Remington SJ, Cantrell MA, et al. Chemodetection and destruction of host urea allows *Helicobacter pylori* to locate

- the epithelium. *Cell host & microbe.* 2015; 18(2):147-56.
<https://doi.org/10.1016/j.chom.2015.07.002>
10. Butt J, Blot WJ, Shrubsole MJ, Waterboer T, Pawlita M, Epplein M. Differences in antibody levels to *H. pylori* virulence factors VacA and CagA among African Americans and whites in the Southeast USA. *Cancer Causes & Control.* 2020;1-6. <https://doi.org/10.1007/s10552-020-01295-z>
 11. De M, Krishna De A, Banerjee A. Antimicrobial screening of some Indian spices. *Phytotherapy research.* 1999; 13(7):616-8.
 12. Mehrabi A-A, Fazeli-Nasab B. In vitro culture of Allium scorodoprasum spp. Rotundum: callus induction, somatic embryogenesis and direct bulblet formation. *Intl J Agri Crop Sci.* 2012; 4(1):1-7.
 13. Fazeli-Nasab B. The effect of explant, BAP and 2,4-D on callus induction of *trachyspermum ammi*. *Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences.* 2018; 12(1):578-86. <https://doi.org/10.5219/953>
 14. Fazeli-Nasab B, Sorousmehr A, Mirzaei N, Solimani M. Evaluation of total phenolic, flavenoide content and antioxidant activity of Leaf and Fruit in 14 different genotypes of *Ziziphus mauritiana* L. in south of Iran. *Eco-Phytochemical Journal of Medicinal Plants.* 2017; 4(4):1-14.
 15. Rezaei-Nasab M, Komeili G, Fazeli-Nasab B. Gastroprotective effects of aqueous and hydroalcoholic extract of *Scrophularia striata* on ethanol-induced gastric ulcers in rats. *Der Pharmacia Lettre.* 2017; 9(5):84-93.
 16. Fazeli-Nasab B. Biological Evaluation of Coronaviruses and the Study of Molecular Docking, Linalool, and Thymol as orf1ab Protein Inhibitors and the Role of SARS-CoV-2 Virus in Bioterrorism. *journal of ilam university of medical sciences.* 2021; 28(6):77-96. <https://doi.org/10.29252/sjimu.28.6.77>
 17. Nasri S, Cheraghi J, Soltanbaygi S. Antinociceptive and anti-inflammatory effect of alcoholic extract of root and stem of *Scrophularia striata* Boiss. in male mice. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants.* 2013; 29(1):74-84.
 18. Amiri H, H. L-Y, Esmaeili A, Samsamnia F, Eghbali D, Viskarami G, et al. Essential oil composition and anatomical study of *Scrophularia striata* Boiss. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants.* 2011; 27(2):271-8.
 19. Shoohani B, Hemati AA, Taheri Moghadam M. Effects of *Scrophularia striata* Extract on Wound Healing in Rabbit. *Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences.* 2009; 17(8):9-16.
 20. Babri S, Doosti MH, Fatehi L, Salari AA. The effects of *Scrophularia striata* extract on anxiety and depression behaviors in adult male mice. *Pharmaceutical Sciences.* 2012; 18(2):133-40.
 21. Azadmehr A, Alizadeh-Oghyanous K, Hajiaghaei R, Amirghofran Z, Azadbakht M. Antioxidant and Neuroprotective Effects of *Scrophularia striata* Extract Against Oxidative Stress-Induced Neurotoxicity. *Cell Molecular Neurobiology.* 2013; 33:1135-41.
 22. Azhdari-Zarmehri H, Nazemi S, Ghasemi E, Musavi Z, Tahmasebi Z, Farsad F, et al. Assessment of Effect of Hydro-Alcoholic Extract of *Scrophularia Striata* on Burn Healing in Rat. *Journal of Babol University Of Medical Sciences.* 2014; 16(5):42-8.
 23. Havasyan M, Panahi J, Pakzad A, Davoudian A, Jalilian A, Zamani-Azdi M. Evaluation of inhibitory effect of extract *Scrophularia* (*Scrophularia striata*) on *Candida albicans* in vitro. *Medical Journal.* 2012; 36(1):19-23.
 24. Tandon M, Srivastava R, Nagpal R, Khosla P, Singh J. Differential modulation of nociceptive responses to mu and kappa opioid receptor directed drugs by blood glucose in experimentally induced diabetes rats. *Indian Journal of Experimental Biology (IJEB).* 2000; 38(3):242-8.
 25. Samini M, Dehpour A, Babazadeh K. Study of effect of melatonin on water immersion stress-induced gastric lesion. *Tehran University Medical Journal (Tumj).* 2003; 61(3):178-81.
 26. Bailey TL, Gribkoff M. Combining evidence using p-values: application to sequence homology searches. *Bioinformatics (Oxford, England).* 1998; 14(1):48-54. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/14.1.48>
 27. Nei M, Kumar S. Molecular evolution

- and phylogenetics: Oxford university press; 2000. 329 Pages, ISBN: 0-19-513584-9
28. LI WH. Molecular evolution. Sinauer, Sunder-land, Massachusetts, ISBN : 0878934634 , 487 Pages1997.
29. Bas E, Recio MC, Máñez S, Giner RM, Escandell JM, López-Ginés C, et al. New insight into the inhibition of the inflammatory response to experimental delayed-type hypersensitivity reactions in mice by scropolioside A. Eur J Pharmacol. 2007; 555(2):199-210.
30. Stevenson PC, Simmonds MS, Sampson J, Houghton PJ, Grice P. Wound healing activity of acylated iridoid glycosides from *Scrophularia nodosa*. Phytotherapy research. 2002; 16(1):33-5.
31. Mortimer P, Burnand K, Champion R, Burton J, Burns D, Breathnach S. Rook's textbook of dermatology. Rook Textbook of Dermatology. 2004.
32. Diaz AMA, Abad MaJ, Fernández L, Silván AM, De Santos J, Bermejo P. Phenylpropanoid glycosides from *Scrophularia scorodonia*: in vitro anti-inflammatory activity. Life sciences. 2004; 74(20):2515-26.
33. Fernández MA, Garcia M, Saenz M. Antibacterial activity of the phenolic acids fractions of *Scrophularia frutescens* and *Scrophularia sambucifolia*. J Ethnopharmacol. 1996; 53(1):11-4.
34. Giner R-Ma, Villalba Ma-L, Recio Ma-C, Máñez S, Cerdá-Nicolás M, Ríos J-L. Anti-inflammatory glycosides from *Scrophularia auriculata*. European journal of pharmacology. 2000; 389(2-3):243-52. [https://doi.org/10.1016/S0014-2999\(99\)00846-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2999(99)00846-8)
35. Nabiuni M, Oryan S, Ayyobipor M, Bagheri M. Histochemical study of *Verbascum speciocum* extract's effects on the wound healing in rats. Journal of Cell & Tissue. 2011; 2(1):67-75.
36. Moezzi N, Varzi H, Shirali S. Comparing the effect of *Elaeagnus angustifolia* L. extract and *Lowsonia intermis* L. paste, with silver sulfadiazine ointment on wound healing in rat. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 2009; 25(2):253-60.
37. Shakibaie D, Pasharavesh L, Khoshboo S, Kaboodi B. The Effect of the " Falcaria vulgaris" on deep skin wound remodeling time and skin tension power in rats. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci). 2006; 10(3):187-94.
38. Hafezi F, Elmira H, Pedram MS. Determination of the Macroscopic Effect of Kiwi Fruit on Wound Healing in Rats (A New Effective Drug for the Treatment of Deep Chronic Wounds). Iranian Journal of Surgery. 2009; 17(1):1-9.
39. Pakbaz Z, Shirazi MH, Pourman MR, Ranjbar R, Hoseini M, Vaise Malekshahi Z, et al. Frequency of sialic acid binding adhesin gene in *Helicobacter pylori* isolated from patient with gastroduodenal diseases. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2013; 18(2):114-20.



In Silico Analysis of the Effect of *Scrophularia striata* Linalool on VacA Protein of *Helicobacter pylori*

Fazeli-Nasab B^{1*}

(Received: November 7, 2020)

Accepted: January 24, 2021)

Abstract

Introduction: Some plants, such as *Scrophularia striata*, has been traditionally used for the treatment of infection and ulcer among people living in Zagros District. Previous studies revealed the beneficial effect of hydroalcoholic and water extract of *Scrophularia striata* on ethanolic induced oxidative stress and stomach ulcer in rats. This study aimed to conduct a bioinformatics analysis to investigate the effect of linalool on the prevention of *Helicobacter pylori* VacA protein activity.

Materials & Methods: DNA and protein sequences of linalool of *Arabidopsis thaliana* and VacA gene sequence of *Helicobacter pylori* were obtained from the NCBI. The alignment of DNA and protein sequence of VacA and linalool was achieved by Clustalw 2 software. Furthermore, all conserved motif and domains were searched using the MEME online software. The phylogenetic tree was drawn by Mega 5 software. The ExpasyPred3D Swiss-Model, and Galaxy Web software were used to predict the third structure and molecular docking based on homology.

Ethics code: IR.UOZ.REC.1399.002

Findings: Linalool protein sequences in all plants have three motifs (100-300 amino

acids) based on the NCBI. The VacA protein has three types of the second cytoplasm, membrane, and kinase domain. The best molecular docking model was obtained based on the highest level of interaction (21.0) and accuracy (0.133) between linalool and VacA protein. The results showed that some molecular groups, such as aliphatic, polar, and hydrophilic, were found in both VacA and linalool protein structure. The presence of aliphatic and hydrophilic groups in VacA protein could give it the ability to pass through the cells by lymphocyte cells and caused pathogenesis if they could escape from degradation. On the other hand, the presence of these groups in linalool could block the VacA protein effect.

Discussions & Conclusions: Bioinformatics analysis showed that linalool eliminated the effects of *Helicobacter pylori*. Furthermore, the results of this study could be used as a scientific basis for future studies to evaluate the effect of each ingredient of *Scrophularia striata*, especially linalool, on *Helicobacter pylori*.

Keywords: Gastric cancer, Molecular docking, *Scrophularia striata*, VacA protein

1. Research Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Agricultural Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran

* Corresponding author: Email: Bfazeli@uoz.ac.ir