

Investigation of the Number of Root Canals in Mandibular Molars and Premolars Teeth in Ilam in 2020

Khadijeh Abdal¹ , Parisa Bakhtizad¹, Amin Kheiri^{2*} 

¹ Dept of Oral and Maxillofacial pathology, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences. Ilam, Iran

² Dept of Endodontics, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences. Ilam, Iran

Article Info

Article type:
Research article

Article History:

Received: 07 November 2021

Revised: 25 November 2021

Accepted: 29 August 2021

*** Correspondence to:**

Amin Kheiri
Dept of Endodontics, Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences. Ilam, Iran
Email: kheiri-a@medilam.ac.ir

ABSTRACT

Introduction: Teeth may need root canal treatment for various reasons. The anatomy of the root canal varies not only between different types of teeth but also between similar teeth. Although there must be at least one canal in the root, some roots have multiple canal of different length. The goal of this study was investigation of the number of root canals in mandibular molars and premolars teeth in Ilam in 2020.

Material & Methods: This study was descriptive-analytic study that performed on 60 mandibular premolars and molars (first premolars 15, second premolars 15, first molars 15, second molars 15) randomly with considering of the sex of patients. Data were analyzed by SPSS22.

(Ethic code: IR.MEDILAM.REC.1399.064)

Findings: In the first and second premolars, the highest frequency of single canal as 86.7% and 93.3%, respectively. In the first and second molars, the highest frequencies related to the three channels were 53.3% and 86.7%, respectively. The prevalence of 4-channel molars was higher in women and 3-channel in men. This difference was not statistically significant. Between two radiologists and endodontists to determine the number of root canals in the first and second premolars and the first and second molars, a good agreement was reported with kappa agreement coefficient of 0.92 and ($P = 0.000$).

Discussion & Conclusion: According to the results of the present study, the first and second mandibular premolars had mostly single root and one canal, and the first and second mandibular molars had often two roots and three channels.

Keywords: Mandible, Molars, Premolars, Root canals

➤ How to cite this paper

Abdal KH, Bakhtizad P, Kheiri A. Investigation of the Number of Root Canals in Mandibular Molars and Premolars Teeth in Ilam in 2020. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2022;29(5): 56-62.



© The Author(s)

Publisher: Ilam University of Medical Sciences

بررسی تعداد کاتال های ریشه در دندان های مولر و پره مولر مندیبل در شهر ایلام در

سال ۱۳۹۹

خديجه ابدال^۱، پريسا بختي زاد^۱، امين خيري^{۲*}

^۱ گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ایلام، ایران

^۲ گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ایلام، ایران

چكیده

اطلاعات مقاله

نوع مقاله: پژوهش

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

تاریخ داوری: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

نويسنده مسئول:

امين خيري

گروه اندودنتیکس، دانشکده
دانشگاه علوم پزشکی
ایلام، ایلام، ایران

Email: kheiri-a@medilam.ac.ir

مقدمه: دندانها به دلایل مختلفی، نیاز به درمان ریشه دارند. آنatomی کاتال ریشه دندان، نه تنها بین انواع دندانها بلکه بین دندان های مشابه نیز متفاوت است. اگر چه حداقل یک کاتال باید در ریشه وجود داشته باشد بعضی از ریشه ها، کاتال های متعدد با طولهای متفاوت دارند. بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی تعداد کاتال های ریشه در دندان های مولر و پره مولر مندیبل در شهر ایلام در سال ۱۳۹۹ بود.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۶۰ دندان پره مولر و مولر مندیبل (پره مولر اول ۱۵. مولر دوم ۱۵. مولر ثالث ۱۵) بطور تصادفی و با در نظر گرفتن جنسیت بیماران، انجام شد. داده های به دست آمده از این تحقیق توسط نرم افزار SPSS22 مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: در پره مولر اول و دوم بیشترین فراوانی مربوط به تک کاتال به ترتیب ۸۶.۷٪ و ۹۳.۳٪ گزارش شد. در مولر اول و دوم بیشترین فراوانی مربوط به ۳ کاتال بترتیب ۵۳.۳٪ و ۸۶.۷٪ بود. شیوع تعداد کاتال ها در برمولرهای اول و دوم مندیبل در زنان و مردان، از نظر آماری معنی دار نبود. شیوع مولرهای ۴ کاتال در زنان و ۳ کاتال در مردان بیشتر بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار گزارش نشد. بین دو مخصوص رادیولوژیست و اندودنتیست جهت تشخیص تعداد کاتال های ریشه در پره مولر اول و دوم و مولر اول و دوم مندیبل، توافق مناسبی با ضریب توافقی کاپا .۹۲ و (P<۰.۰۰۰) گزارش شد.

بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، پره مولر های اول و دوم مندیبل اکثرا تک ریشه بودند و یک کاتال داشتند و مولر های اول و دوم مندیبل نیز در اغلب موارد دو ریشه بودند و سه کاتال داشتند. تعداد ریشه و کاتال بین مرد و زن، تفاوتی نشان نداد.

واژه های کلیدی: پره مولر، دندان مولر، کاتال های ریشه، مندیبل

استناد: ابدال، خديجه؛ بختي زاده، پريسا؛ خيري، امين. بررسی تعداد کاتال های ریشه در دندان های مولر و پره مولر مندیبل در شهر ایلام در سال ۱۳۹۹.

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دی (۲۹۶۱۴۰۰)، (۵): ۵۶-۶۲



مقدمه

کانال‌ها در بعضی از دندانها موجب درمان ناقص و اشتباه می‌گردد، زیرا ارتباط مستقیم پالپ و لیگامنهای پریودنتال و پریودنسیوم (PDL) از طریق این کانال‌ها ایجاد می‌شود و عدم آگاهی دندانپزشک از وجود آنها و ناتوانی در پیدا کردن این کانال‌ها موجب عدم پاکسازی این کانال‌ها شده، در نتیجه این کانال‌ها مسیری برای انتشار بیماریهای پالپ به بافت‌های پری رادیکولار فراهم می‌کنند که موجب شکست درمان ریشه می‌شود (۱۱). در صورتی که اگر دندانپزشک پیش از درمان ریشه، آگاهی کاملی از مورفولوژی کانال داشته باشد می‌تواند راحت‌تر تصمیم بگیرد که آیا انجام این کار در توانمندیهای او می‌گنجد یا خیر و در صورت عدم توانایی در انجام درمان ریشه بیمار را به متخصص درمان ریشه ارجاع دهد (۱۲). رادیوگرافی‌های مستقیم و زاویه دار (زاویه مزیالی و دیستالی با تکنیک پارالل) قبل از کار، راهنمای خوبی در تعیین تعداد کانال‌ها می‌باشد. به طور کلی در دندانهای پره مولر مندیبل با ۳ کانال، نیمه‌ی سرویکالی ریشه نسبت به حالت معمول عریض‌تر است و بدون تقارب یا دارای تقارب اندکی می‌باشد، ممکن است کانال‌های فرعی و طرفی در رادیوگرافی واضح نباشند اما تغییر ناگهانی در دانسیته رادیوگرافی و باریک شدن ناگهانی کانال می‌تواند دلالت بر وجود کانال‌های دیگر داشته باشد (۱۳ و ۱۴).

بررسی تنواعات آناتومیکی کانال از جمله وجود بیش از یک کانال یا اشکال متنوع کانال در قومیت‌های مختلف و مناطق جغرافیایی مختلف نتایج کاملاً متفاوتی را به دنبال داشته است و مطالعات فراوانی در جمعیت‌های مختلف ارایه شده است که مسلم‌آز اهمیت زیادی برای اندودنتیستها و دندانپزشکان عمومی که خواهان انجام درمان ریشه هستند برخوردار است (۱۵).

با توجه به اینکه پیش نیاز یک درمان موفق ریشه در کش و تشخیص تمام تنواعات داخلی ریشه ای دندان توسط کلینیسن می‌باشد، نیاز است مطالعات بررسی شیوع کانال‌های ریشه در هر منطقه‌ی جغرافیایی انجام گردد و از

دندانها به دلایل مختلفی، نیاز به درمان ریشه دارد. هدف از درمان ریشه، دبیردمان کامل کانال ریشه ای و حذف کامل میکروارگانیسمها و محصولات جانبی آنها از سیستم کانال ریشه و سیل موثر سیستم کانال می‌باشد. این هدف بدون آگاهی کامل از مورفولوژی کانال ریشه به دست نخواهد آمد (۱). آنatomی کانال ریشه ای دندان، نه تنها بین انواع دندانها بلکه بین دندانهای مشابه نیز متفاوت است. اگر چه انتظار می‌رود که حداقل یک کانال در ریشه وجود داشته باشد، بعضی از ریشه‌ها کانال‌های متعدد با طول‌های مختلف دارند (۲ و ۳). درک و تشخیص تمام جنبه‌های آنatomی کانال ریشه، پیش نیاز درمان کانال ریشه می‌باشد. درمان موفق ریشه، نیازمند شناخت دقیق آنatomی و مورفولوژی کانال ریشه می‌باشد که این امر با یافتن محل دقیق کانال‌ها، شکل دهی و پاکسازی آنها و در نهایت پرکردن سیستم کانال ریشه بصورت سه بعدی تکمیل می‌گردد (۴ و ۵). عدم موفقیت در پیدا نمودن این کانال‌ها ممکن است باعث شکست درمان و احتمالاً بروز درد و تورم بعد از درمان گردد. آنatomی داخلی کانال‌ها ممکن است به اشکال مختلف از جمله فین، دلتا، لوپ، ایسموس، کانال‌های فرعی ولترال، دیده شود که کار پاکسازی و شکل دهی را سخت و پیچیده و با اشکال مواجه می‌سازد (۶ و ۷). در میان آنatomی بافت‌های بدن، شکل حفره‌ی پالپ دندان اگر پیوستگی غلاف هرتویگ قبل از تشکیل تکامل دندان ایجاد شود و موجب تشکیل کانال‌های فرعی و عاج از بین برود، ادنتوبلاستها تمایز نیافته و در این قسمت عاج تشکیل نمی‌شود و موجب تشکیل کانال‌های فرعی و یا اضافی منجر می‌گردد (۸). کانال‌های فرعی به موازات کانال اصلی قرار دارد و شیوع آن در ناحیه‌ی انشعاب ریشه ها ۲۸ تا ۷۶ درصد گزارش شده است. کانال‌های طرفی عمود بر کانال اصلی قرار دارد و شیوع آن در یک سوم ایکالی ۱۷ درصد، دریک سوم میانی ۸/۸ درصد و در یک سوم کرونالی ۱/۶ درصد تخمین زده شده است (۹ و ۱۰). عدم اطلاع دقیق دندانپزشک از احتمال وجود این

آنچه در این مطالعه بررسی شد

(N SK panaair FX) جهت ورود به مینای دندان از سطح اکلوزال دندان اقدام به تهیه ی حفره ی دسترسی کرده و بعد از اینکه حفره ی دسترسی مورد قبول تهیه شد ، با استفاده از فایلهای دستی Mani - (ژاپن شماره ۱۰۱۵) (کanalها را پیدا کرده و پس از قرار دادن فایلهای در دندان رادیوگرافی ها) فیلم رادیوگرافی SKYDENT - اسلواکی (در نمای مزیو دیستالی و باکو لینگوالی برای هر دندان) (توسط دستگاه رادیولوژی Planmeca مدل Prox کشور فنلاند) در یک وسیله ی ثابت کننده به طوری که موقعیت تیوب و دندان در هر اکسپوز ثابت باشد، انجام شد. با شرایط ولتاژ KVP₆₀ ، جریان mA₈ ، و زمان اکسپوز ۸۰.۸ رادیوگرافی با تکنیک موازی به عمل آمد. جهت ارزیابی رادیوگرافی ها به هر رادیوگرافی یک کد داده و یک متخصص رادیولوژی فک ، دهان و صورت و یک متخصص درمان ریشه به عنوان مشاهده گر ، تصاویر را با هم در یک جلسه بررسی کرده و نظرات خود را اعلام نمودند. با توجه به وجود اختلاف نظر در بین دو متخصص از ضریب اطمینان استفاده کردیم . برای تحلیل داده ها از ضریب توافقی کاپا استفاده کردیم و سطح معنی داری ۰.۰۵ در نظر گرفته شد. داده های به دست آمده از این مطالعه توسط spss نسخه ۲۲ و سطح معنی داری ۰.۰۵ مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها

یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که کلیه ی دندان های پره مولر اول و دوم در جمعیت زنان و مردان تک ریشه بودند. شیوع مولر اول ۲ ریشه در مردان ۱۰۰ درصد و در زنان ۸۵.۷۱ درصد و مولر اول ۴ ریشه در مردان ۰ و در زنان یک مورد گزارش شد که این تفاوت از نظر اماری معنادار نبود ($P > 0.05$). در پره مولر اول و دوم بیشترین فراوانی مربوط به تک کanal به ترتیب ۷۶.۷٪ و ۹۳.۳٪ گزارش شد. در مولر اول و دوم بیشترین فراوانی مربوط به ۳ کanal ترتیب ۵۳.۳٪ و ۸۶.۷٪ بدست آمد. شیوع تعداد کanal ها در پرمولرهای اول مندیبل در جمعیت مردان به ترتیب تک کanal ۸۵.۷٪ ، دو کanal ۱۴.۳٪

آنچه در این مطالعه مندیبل به دلیل تنوع در آناتومی داخلی ، کanalهای جانبی و دلتاهای اپیکال جزو مشکلترین دندانها جهت درمان اندومی باشند، (۱۶) لذا هدف از انجام این تحقیق ، بررسی تعداد کanalها در ریشه ی دندانها مولر و پره مولر مندیبل در شهر ایلام در سال ۱۳۹۹ بود که تا کنون انجام نشده بود .

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعي است که بر روی ۶۰ دندان پره مولر و مولر مندیبل) پره مولر اول مندیبل ۱۵، پره مولر دوم مندیبل ۱۵، مولر اول مندیبل ۱۵، مولر دوم مندیبل ۱۵ (از بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی داشکده دندانپزشکی ایلام و درمانگاههای سطح شهر انجام شد. انتخاب نمونه ها ، بطور تصادفي و با در نظر گرفتن فاکتور جنسیت انجام گرفت .

معیارهای ورود به این مطالعه شامل جمع آوری دندان هایی بود که متعلق به افراد با اصالت اسلامی باشد (مسافر و دانشجوی غیر بومی نباشد) . دندانهایی که ریشه کلسفیه داشتند از مطالعه خارج شدند.

روش انجام کار

بعد از جمع آوری نمونه ها (دندانهای کشیده شده) ، تمامی بقایای بافتی و جرم پوشاننده سطح ریشه از دندانها جدا شد. دندانها در درون محلول سدیم هیپوکلریت ۵.۲۵ درصد Morvabon (Hypo-Endox) شرکت تولیدی pidgin (تهران) و سپس در محلول نرمال سالین TebTehran (قرار داده شد. با استفاده از قلم های جرمگیری Falcon) شرکت کوشافرین درمان (جرمها موجود در سطح دندان برداشته شد، سپس با استفاده از مشاهده ی بصری، تعداد ریشه دندان را مورد بررسی قرار دادیم .

در مرحله ی بعد دندانها در بلوک گچی مانت شد و به منظور تقلید بافت نرم برای ایجاد اشعه پراکنده و تضعیف اشعه بین بلوک و منبع اشعه، از موم poly wax (ترکیه) در اپکس دندانها استفاده شد ، سپس با استفاده از فرز فیشور الماسی (Teeskavan - کرج) و هندپیس با سرعت بالا

جدول ۱: تعیین ارتباط بین تعداد کانالهای ریشه در پره مولر اول و دوم بر حسب جنس

P	کل تعداد(درصد)	مونث تعداد(درصد)	مذکور تعداد(درصد)	تک کanal دو کanal	پره مولر اول پره مولر دوم
۰.۷۳	۱۳(۸۶.۷)	۷(۸۷.۵)	۶(۸۵.۷)	تک کanal	پره مولر اول
	۲(۱۳.۳)	۱(۱۲.۵)	۱(۱۴.۳)	دو کanal	
۰.۴۶	۱۴(۹۳.۳)	۶(۸۵.۷)	۸(۱۰۰)	تک کanal	پره مولر دوم
	۱(۶.۷)	۱(۱۴.۳)	.	دو کanal	

۱۰۰ درصد و در زنان بترتیب ۲۵ درصد و ۷۵ درصد گزارش شد. شیوع مولرهای ۴ کanal در زنان و ۳ کanal در مردان بیشتر بود این تفاوت از نظر آماری معنی دار گزارش نشد (جدول ۲).
 بین دو متخصص رادیولوژیست و اندودنتیست جهت تشخیص تعداد کanal های ریشه در پره مولر اول و دوم و مولر اول و دوم توافق مناسبی با ضریب توافقی کاپا $= 0.92$ و ($P = 0.000$) گزارش شد (جدول ۳).
 علت تفاوت ها در نتایج مطالعات مختلف را میتوان به حجم نمونه و روش های بررسی و تنوع نژادی نسبت داد.

و در جمعیت زنان تک کanal 87.5% و دو کanal 12.5% بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. شیوع پره مولرهای دوم مندیبل در مردان تک کanal 100% و دو کanal صفر بود و در زنان شیوع پره مولرهای تک کanal 85.7% و دو کanal 14.3% بود. در اینجا نیز این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (جدول ۱).

شیوع تعداد کانالها در مولراول مندیبل در مردان سه کanal 75 درصد و چهار کanal 25 درصد و در زنان بترتیب 28.6 درصد و 71.4 درصد و شیوع تعداد کانالها در مولر دوم در مردان 2 کanal صفر و 3 کanal

جدول ۲: تعیین ارتباط بین تعداد کانالهای ریشه در مولر اول و دوم بر حسب جنس

P	کل تعداد(درصد)	مونث تعداد(درصد)	مذکور تعداد(درصد)	تک کanal دو کanal	مولر اول مولر دوم
۰.۱	۸(۵۳.۳)	۲(۲۸.۶)	۶(۷۵)	۳ کanal	مولر اول
	۷(۴۶.۷)	۵(۷۱.۴)	۲(۲۵)	۴ کanal	
۰.۲۶	۲(۱۳.۳)	۲(۲۵)	.	۲ کanal	مولر دوم
	۱۳(۸۶.۷)	۶(۷۵)	۷(۱۰۰)	۳ کanal	

جدول ۳: درصد توافق مشاهده شده اندودنتیست و رادیولوژیست بر حسب ضریب KAPPA

P	Kappa	ضریب	Radio				Endo
			چهار کanal	سه کanal	دو کanal	تک کanal	
۰.۰۰۰	۰.۹۲	۲۷(۱۰۰)	تک کanal
			.	.	۴(۸۰)	۱(۲۰)	دو کanal
			.	۲۰(۹۵.۲)	۱(۴۸)	.	سه کanal
			۶(۸۵.۷)	۱(۱۴.۳)	.	.	چهار کanal

کanal های اضافه، کanal های جانی و دلتهای اپیکال، جزو مشکل ترین دندان ها از جهت درمان ریشه محسوب

بحث و نتیجه گیری
 پره مولرهای مندیبل به دلیل تنوع در آنatomی داخلی،

طبق مطالعه‌ی محمدزاده‌ی اخلاقی و همکاران، ۹۶٪ دندانها‌ی مولر اول دوریشه بودند که با یافته‌های تحقیق حاضر که بیش از ۹۳٪ از دندانهای مولر اول را در ریشه نشان دادبیش از ۹۰٪ موارد، تک ریشه هستند که با یافته‌های مطالعه‌ی همسو است (۲۳و۲۲و۲۴). در اینجا عدم شیوع کمتر پرمولرهای ۳ کانال را نسبت به مطالعات قبلی مشاهده می‌کنیم.

در این تحقیق شیوع تعداد ریشه و کانال بر اساس جنسیت هم مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد تعداد مولرهای ۴ کانال در زنان و مولرهای ۳ کانال در مردان بیشتر است اما از نظر آماری معنادار نبود. طبق مطالعه‌ی دکتر نوروزی و همکاران، هیچگونه ارتباط معنی داری بین تعداد ریشه و جنسیت مشاهده نشد که با نتایج مطالعه‌ی حاضر هم سو می‌پاسد (۲۵).

پیش‌بینی می‌شود که نتایج این مطالعه موجب افزایش دانش کلینیسیتها در مورد تنوع تعداد کانالهای ریشه می‌گردد که در نتیجه‌ی آن عدم نیاز به تکرار درمان و درمانهای کمکی، صرفه جویی در وقت و هزینه، رضایت‌بیمار و راحتی دندانپزشک را در پی خواهد داشت و همچنین پیش‌آگهی درمان را بهبود می‌بخشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله منتج از پایان نامه دکترای عمومی دندانپزشکی با کد اخلاق IR.MEDILAM.REC.1399.064 می‌باشد. بدین وسیله از دانشگاه علوم پزشکی ایلام که ما را در انجام این مطالعه حمایت کردند، کمال تقدیر و تشکر را داریم.

تعارض منافع

نویسنده‌گان اعلام می‌کنند که تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.

کد اخلاق: IR.MEDILAM.REC.1399.064

References

- Weine FS. Endodontic therapy .5th ed. Louis CV Mosby Co Publication. 2015; P.123-46.
- Enone LL, OyaperoA. Preliminary assessment of endodontic difficulty encountered at a tertiary health

می‌شود (۹). به صورت کلی در دندان‌های مندیل با سه کانال، نیمه سرویکالی ریشه نسبت به حالت معمول عریض تر است و بدون تقارب یا دارای تقارب اندکی می‌باشد. ممکن است کانال‌ها در رادیوگرافی واضح نباشند. تغییر ناگهانی در دانسیته رادیوگرافی و باریک شدن ناگهانی کانال می‌تواند دلالت بر وجود کانال‌های اضافه داشته باشد (۱۱و۱۰). در مطالعه‌ی حاضر اکثریت مولرهای اول ۳ کاناله هستند که با مطالعه‌ی هاشمی نیا و همکاران و Chourasia مطالعه‌ی هاشمی نیا و همکاران همسو می‌باشد (۱۴و۱۵). در مقاله‌ی هاشمی نیا و همکاران، مولرهای دوم در بیشتر موارد، سه کاناله بودند که با یافته‌های حاصل از مطالعه حاضر مشابهت دارد (۱۴).

در این مطالعه، تمام پرمولرهای اول مندیل تک ریشه بودند که با مطالعه Shrestha و همکاران و مطالعه Blaine و همکاران همخوانی دارد و هیچ پره مولری ۲ و ۳ ریشه گزارش نشد (۱۶و۱۷)، در حالی که در مطالعه دندانهای پره مولر اول دو ریشه بودند ۴٪، Sherestha در مطالعه‌ی Burklein و همکاران (۰.۷۶٪) پره مولرهای اول تک ریشه و (۱۶٪) پره مولرهای دوم نیز تک ریشه بودند (۱۸). مطالعه حاضر با مطالعه زارع جهرمی و همکاران همسو نیست (۱۹).

طبق مطالعه‌ی رحیمی و همکاران، ۹۸٪ دندان پره مولر اول مندیل، تک ریشه هستند که با نتایج مطالعه‌ی حاضر همسو می‌باشد، اما در دندانهای پره مولر دوم مندیل تنوع تعداد ریشه وجود داشت که با مطالعه‌ی حاضر همسو نمی‌باشد (۲۰).

طبق مطالعه Chourasia و همکاران، ۸۰٪ دندان پره مولر اول، تک ریشه و مابقی دو و سه ریشه بودند که با مطالعه‌ی حاضر هم سو نمی‌باشد (۱۵). نتایج مطالعات Dou و Shrestha نشان داد که بیش از ۹۶٪ از پره مولر اول، تک ریشه هستند که با نتایج تحقیق حاضر هم سو می‌باشد (۲۱و۲۰).

- center in lagos Nigeria. *J Int Oral Health.* 2018;10:303-10. doi.10.4103/jioh.jioh_200_18
3. Arora R, Gupta T, Mirdha N, Omer M. A case report on aberrant root canal morphology of mandibular first premolar. *Dental Sci* 2019; 5:1-17.
 4. Anaraki M, Jafarzadeh H, Zarrabi M. Root canal therapy of first and second mandibular premolars with three root canals. *J Mash Dent Sch* 2016;40:187-92. doi.10.7508/iej.2016.02.012
 5. Baroudi K, Kazkaz M, Sakas S, Tarakji B. Morphology of root canals in lower human premolars. *Niger Med J* 2012; 53:206-9. doi.10.4103/0300-1652.107554
 6. Fathi Z, Rahimi S, Tavakoli R, Amini M. A three rooted mandibular second premolar a case report. *J Dent Res Dent Clin Dent Pros* 2014; 8: 184-6. doi.10.5681/joddd.2014.034
 7. Paul B, Dube K. Endodontic treatment of a mandibular second premolar with three roots and three canals. *Case Rep Dent* 2014; 20: 97-102. doi.10.1155/2014/973410.
 8. Kakkar P, Singh A. Mandibular first premolar with three root a case report. *Iranian Endod J* 2012; 7:207-210.
 9. Shehadat S. Cone beam computed tomography of mandibular first permanent molar in a Middle East population. *J Int Soc Preve Commun Dentistr* 2019; 9:458-63. doi.10.4103/jispcd.JISPCD_41_19
 10. Saber AM, Altoukhi DH. Consequence of early extraction of compromised first permanent Molar. *BMC Oral Health* 2018;3:18:59. doi.10.1186/s12903-018-0516-4
 11. Chourasia HR, Boreak N, Tarrosh MY, Mashyakhy M. Root canal morphology of mandibular first premolars in Saudi Arabian southern region subpopulation. *Saudi Endod J* 2017; 7:77-81. doi.10.4103/1658-5984.205130
 12. Bhardwaj A, Kottoor J, Albequerque DV, Velmurugan N. Morphologic variation in mandibular premolars a report of three cases. *J Con Dent Pract* 2015; 16:243-7. doi. 10.5005/jp-journals-10024-1593
 13. Poorni S, Karumaran CS, Indira R. Mandibular first premolar with two root and three canals. *Aust Endod J* 2010; 36:32-34. doi.10.1111/j.1747-4477.2009.00170.x
 14. Hasheminia SM, Asjhatabar H. An invitro evaluation of morphologic variation in mandibular first and second molars. *Shiraz Uni Dent J* 2009; 10:60-5.
 15. Chourasia H, Ganesh K, Meshram, Root canal morphology of mandibular first permanent molars in an Indian population. *Int J Dentistr* 2012; 21:74-81. doi.10.1155/2012/745152
 16. Shrestha R, SriiR. Diversity of root canal morphology in mandibular first premolar. *Kathmandu Uni Med J* 2020; 11:66-71.
 17. Blaine M, William H. The root and root canal morphology of the human mandibular second premolar a literature review. *J Endod* 2007; 33:54-60. doi.10.1016/j.joen.2007.03.020
 18. Burklein S, Heck R, Schafer E. Evaluation of the root canal anatomy of maxillary and mandibular premolars in a selected German population using cone beam computed tomographic data. *J Endod* 2017; 43:1448-52. doi.10.1016/j.joen.2017.03.044
 19. Zarejahromi M, Jafari F, Sarami M. Root and canal morphology of mandibular second molar in an Iranian population by clearing method. *Shiraz Uni Med Sci* 2013; 14:78-81.
 20. Rahimi S, Shahi S, Yavari HR, Manafi H, Eskandarzadeh N. Root canal configuration of mandibular first and second premolars in an Iranian population. *J Dent Res Dent Pros* 2007; 1:59-64.
 21. Dou L, Li D, XuT, TangY, Yang D. Root anatomy and canal morphology of mandibular first premolars in a Chinese population. *Sci Rep* 2017; 7:21-28.
 22. Mohammadzadehakhlagh N, Khalilak Z. Root canal anatomy and morphology of mandibular first molar in selected Iranian population an invitrostudy. *Iranian Endod J* 2017; 12:87-91. doi.10.22037/iej.2017.18
 23. Singh S, Pawar M. Root canal morphology of South Asian Indian mandibular premolar teeth. *J Endod* 2014; 40:1338-41. doi.10.1016/j.joen.2014.03.021
 24. Islam MA, Wakia T, Alam MS. Root canal morphology of mandibular first premolars of Bangladeshi population. *Update Dent Coll J* 2013; 2:3-7.
 25. Norouzi N, Kavousi A, Moosazade M, Esahmi E. [Investigation root canal number and morphology of mandibular anterior teeth using cone beam computed tomography]. *J Mazandaran Uni Med Sci* 020; 29:119-23. (Persian)